Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 358/2005

ze dne 2. března 2005

o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 3)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2013 ze dne 4. července 2013	L 186	7	5.7.2013
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/429 ze dne 10. března 2017	L 66	4	11.3.2017

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 358/2005

ze dne 2. března 2005

o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Přípravky náležející do skupiny „enzymů“ uvedené v příloze I se bez časového omezení povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze I.

Článek 2

Přípravky náležející do skupiny „barviv včetně pigmentů, ostatních barviv“ uvedené v příloze II se bez časového omezení povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze II.

Článek 3

Přípravky náležející do skupiny „enzymů“ uvedené v příloze III se dočasně na dobu čtyř let povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze III.

Článek 4

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismů“ uvedené v příloze IV se dočasně na dobu čtyř let povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze IV.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1619	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek alfa-amylázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity pro: potahovanou formu: alfa-amyláza: 200 KNU ([1])/g endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 350 FBG ([2])/g kapalnou formu: alfa-amyláza: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 225 FBG/ml	výkrm kuřat	—	alfa-amyláza: 10 KNU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: alfa-amyláza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 35–70 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrob a beta-glukany, např. obsahujících více než 40 % obilovin (např. ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale či kukuřice).	Bez časového omezení
					endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylázy z *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacillolyzinu z *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy z *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity pro: endo-1,3(4)-beta-glukanázu: 2 350 U ([3])/g endo-1,4-beta-glukanázu: 4 000 U ([4])/g alfa-amylázu: 400 U ([5])/g bacillolyzin: 450 U ([6])/g endo-1,4-beta-xylanázu: 20 000 U ([7])/g	výkrm kuřat	—	endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 587 U	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000–4 000 U alfa-amyláza: 200–400 U bacillolyzin: 225–450 U endo-1,4-beta-xylanáza: 10 000–20 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 45 % pšenice.	Bez časového omezení
					endo-1,4-beta-glukanáza: 1 000 U	—		
					alfa-amyláza: 100 U	—		
					bacillolyzin: 112 U	—		
					endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U	—		

▼B

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
▼M2 ———								
▼B								
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) s minimem aktivity pro: granulovanou formu: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g kapalnou formu: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	výkrm kuřat	—	endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita.	Bez časového omezení
					endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 672 mikromolů redukujících cukrů (ekvivalenty glukosy) za minutu z rozpustného škrobu při pH 5,6 a teplotě 37 °C.
([2]) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukosy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.
([3]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukosy) za 1 minutu z beta-glukanu ječmene při pH 7,5 a teplotě 30 °C.
([4]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukosy) za 1 minutu z karboxymethylcelulosy při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
([5]) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného křížově vázaného škrobového polymeru při pH 7,5 a teplotě 37 °C.
([6]) 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azokaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za minutu při pH 7,5 a teplotě 37 °C.
([7]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylosy) za 1 minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
([8]) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukosy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 3,5 a teplotě 40 °C.
([9]) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylosy) za minutu z arabinoxylanu pšenice při pH 3,5 a teplotě 55 °C.

▼B

PŘÍLOHA II

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Barviva včetně pigmentů								
2. **Ostatní barviva**								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	okrasné ptactvo živící se zrním	—	—	150	—	Bez časového omezení
			malí hlodavci	—	—	150	—	Bez časového omezení
E 110	Žluť SY (sunset yellow FCF)	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	okrasné ptactvo živící se zrním	—	—	150	—	Bez časového omezení
			malí hlodavci	—	—	150	—	Bez časového omezení
▼M1 _____								
▼B E 141	Měďnaté komplexy chlorofylů	—	okrasné ptactvo živící se zrním	—	—	150	—	Bez časového omezení
			malí hlodavci	—	—	150	—	Bez časového omezení

▼B

PŘÍLOHA III

Č. ES nebo č.	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
51	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) s minimem aktivity pro: pevnou a kapalnou formu: 100 IU ([1])/g nebo ml	nosnice	—	10 IU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 IU. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na arabinoxylan, např. obsahujících nejméně 40 % pšenice či ječmene.	6. březen 2009
28	3-fytáza EC 3.1.3.8	Přípravek 3-fytázy z *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) s minimem aktivity pro: pevnou formu: 5 000 PPU ([2])/g kapalnou formu: 1 000 PPU/g	výkrm krůt	—	250 PPU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 250–1 000 PPU. 3. Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,22 % fosforu vázaného na fytin.	6. březen 2009
			prasnice	—	250 PPU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500–1 000 PPU. 3. Pro použití do krmných směsí s obsahem více než 0,22 % fosforu vázaného na fytin.	6. březen 2009

([1]) 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylosy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 4,5 a teplotě 30 °C.
([2]) 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5 a teplotě 37 °C.

▼B

PŘÍLOHA IV

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Přípravek *Enterococcus faecium* obsahující ve formě mikrokapslí minimálně: 5×10^9 CFU/g	psi	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování	6. březen 2009
			kočky	—	5×10^6	8×10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování	6. březen 2009