Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 358/2005

z dnia 2 marca 2005 r.

dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 57 z 3.3.2005, s. 3)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 643/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.	L 186	7	5.7.2013
►M2	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/429 z dnia 10 marca 2017 r.	L 66	4	11.3.2017

▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 358/2005

z dnia 2 marca 2005 r.

dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Artykuł 1

Preparaty należące do grupy „Enzymów” określone w załączniku I są dopuszczone do bezterminowego użytkowania jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku I.

Artykuł 2

Substancje należące do grupy „Barwników wraz z pigmentami, inne barwniki” określone w załączniku II są dopuszczone do bezterminowego użytkowania jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku II.

Artykuł 3

Preparaty należące do grupy „Enzymów” określone w załączniku III są dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku III.

Artykuł 4

Preparaty należące do grupy „Mikroorganizmów” określone w załączniku IV są dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym załączniku IV.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼B

ZAŁĄCZNIK I

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunki lub kategorie zwierząt	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
					Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Enzymy								
E 1619	Alfa-amylaza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Preparat alfa-amylazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) posiadający minimalną aktywność: Forma powlekana: Alfa-amylaza: 200 KNU ([1])/g endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG ([2])/g Forma płynna: alfa-amylaza 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml	Kurczęta przeznaczone do tuczu	—	alfa-amylaza: 10 KNU	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: alfa-amylaza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35–70 FBG. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w skrobię i beta-glukany np. zawierające ponad 40 % zbóż (np. jęczmień, owies, pszenica, żyto, pszenżyto lub kukurydza).	beztерminowo
					endo-1,3(4)-beta –glukanaza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Alfa-amylaza EC 3.2.1.1 Bacylolizyna EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacylolizyny wytwarzanej przez *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) i endo-1,4-beta-ksylazyny wytwarzanej przez *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) posiadający minimalną aktywność: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U ([4])/g Alfa-amylaza: 400 U ([5])/g Bacylolizyna: 450 U ([6])/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 20 000 U ([7])/g	Kurczęta przeznaczone do tuczu	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000–4 000 U alfa-amylaza: 200–400 U bacylolizyna: 225–450 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 10 000–20 000 U 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 45 % pszenicy.	beztерminowo
					Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U	—		
					Alfa-amylaza: 100 U	—		
					Bacylolizyna: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-ksylanaza: 5 000 U	—		

▼B

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunki lub kategorie zwierząt	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
					Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
▼M2 ———								
▼B E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8	Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) posiadający minimalną aktywność: Forma granulatu 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Forma płynna: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Kurczęta przeznaczone do tuczu	—	endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU endo-1,4-beta-ksylanaza: 680 EXU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia lub 20 % żyta.	beztermi-nowo
					endo-1,4-beta-ksylanaza: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU to ilość enzymu, która uwalnia 672 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z rozpuszczalnej skrobi na minutę przy pH 5,6 i temperaturze 37 °C.
([2]) 1 FBG to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C.
([3]) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 30 °C.
([4]) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C.
([5]) 1 U to ilość enzymu, która hydrolizuje 1 mikromol wiązań glikozydowych z nierozpuszczalnych w wodzie usieciowionych polimerów skrobiowych w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C.
([6]) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikrogram azokazeiny rozpuszczalnej w kwasie trójchlorooctowym w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C.
([7]) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0067 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C.
([8]) 1 BGU to ilość enzymu, która uwalnia 0,278 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 40 °C.
([9]) 1 EXU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.

▼B

ZAŁĄCZNIK II

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunki lub kategorie zwierząt	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Barwniki wraz z pigmentami								
2. **Inne barwniki**								
E 102	Tartrazyna	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem	—	—	150	—	bezterminowo
			Małe gryzonie	—	—	150	—	bezterminowo
E 110	Żółcień pomarańczowa FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem	—	—	150	—	bezterminowo
			Małe gryzonie	—	—	150	—	bezterminowo

▼M1

———

▼B

E 141	Chlorofil miedziany złożony	—	Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem	—	—	150	—	bezterminowo
			Małe gryzonie	—	—	150	—	bezterminowo

ZAŁĄCZNIK III

Numer WE lub numer	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunki lub kategorie zwierząt	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
					Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Enzymy								
51	Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8	Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) posiadający minimalną aktywność: Forma stała i płynna: 100 IU ([1])/g lub ml	Kury nioski	—	10 IU	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylan np. zawierających minimum 40 % pszenicy lub jęczmienia.	6 marca 2009 r.
28	3-fitaza EC 3.1.3.8	Preparat 3-fitazy wytwarzanej przez *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) posiadający minimalną aktywność: Forma stała: 5 000 PPU ([2])/g Forma płynna: 1 000 PPU/g	Indyki przeznaczone do tuczu	—	250 PPU	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 PPU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających ponad 0,22 % fityny związanej z fosforem.	6 marca 2009 r.
			Maciory	—	250 PPU	—	1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 PPU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających ponad 0,22 % fityny związanej z fosforem.	6 marca 2009 r.

([1]) 1 IU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 30 °C.
([2]) 1 PPU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol fosforanu nieorganicznego z fitynianu sodu w ciągu minuty przy pH 5 i temperaturze 37 °C.

▼B

ZAŁĄCZNIK IV

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunki lub kategorie zwierząt	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne przepisy	Data ważności zezwolenia
					CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Mikroorganizmy								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparat *Enterococcus faecium* zawierający minimalną postać mikrokapsułkową: 5×10^9 CFU/g	Psy	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji	6 marca 2009 r.
			Koty	—	5×10^6	8×10^9	W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji	6 marca 2009 r.