Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2005 НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2005 година

относно разрешенията за употребата на някои добавки без ограничение във времето и разрешенията за нови видове употреба на добавки, които са вече разрешени за употреба при храненето на животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 3)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 643/2013 на Комисията от 4 юли 2013 година	L 186	7	5.7.2013 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/429 на Комисията от 10 март 2017 година	L 66	4	11.3.2017 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2005 НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2005 година

относно разрешенията за употребата на някои добавки без ограничение във времето и разрешенията за нови видове употреба на добавки, които са вече разрешени за употреба при храненето на животни

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими“, посочени в приложение I, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 2

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на веществата от групата „Оцветители, включително пигменти“ („Други оцветители“), посочени в приложение II, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 3

Разрешава се употребата като добавка за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими“, посочени в приложение III, временно за срок от четири години и при условията, определени в това приложение.

Член 4

Разрешава се употребата като добавка за храненето на животни на препарата от групата „Микроорганизми“, посочен в приложение IV, временно за срок от четири години и при условията, определени в това приложение.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
Ензими								
E 1619	Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1 Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6	Препарат от алфа-амилаза и ендо-l,3(4)-бета-глюканаза, получен от *Bacillus amylolique-faciens* (DSM 9553) с минимално действие от: Във вид на филм-таблетки: алфа-амилаза: 200 KNU ([1])/g Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 350 FBG ([2])/g В течна форма: алфа-амилаза: 130 KNU/ml ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 225 FBG/ml	Пилета за угояване	—	Алфа амилаза 10 KNU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: алфа-амилаза: 20—40 KNU ендо-1l,3(4)-бета-глюканаза: 35—70 FBG 3. За употреба в хранителни смески, богати на скорбяла и бета глюкани, например съдържащи над 40 % зърнени храни (например овес, ечемик, пшеница, ръж, тритикале или царевица).	Без ограничение във времето
					Ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 17 FBG	—		
E 1620	Ендо-l,3(4)- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-l,4- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.4 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1 Бацилолизин ЕС 3.4.24.28 Ендо-l,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-l,3(4)-бета-глюканаза получен от *Aspergilius aculeatus* (CBS 589.94), ендо-l,4-бета-глюканаза получен от *Tricbodenna longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), бацилолизин,получен от *Bacillus amiloliqne-faciens* (DSM 9554) и ендо-l,4-бета-ксиланаза, получена от *Trichoderma viride* (NIBH PERM BP 4842) с минимално действие от: Ендо-l,3(4)- бета-глюканаза: 2 350 U ([3]) /g Ендо-l,4- бета-глюканаза: 4 000 U ([4])/g Алфа-амилаза: 400 U ([5])/g Бацилолизин: 450 U ([6])/g Ендо-l,4-бета-ксиланаза: 20 000 U ([7])/g	Пилета за угояване	—	Ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 587U	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 1 175—2 350 U ендо-l,4-бета-глюканаза: 2 000—4 000 U алфа-амилаза: 200—400 U бацилолизин: 225—450 U ендо-l,4-бета-ксиланаза: 10 000—20 000 U 3. За употреба в хранителни смески от полизахариди без съдържание на скорбяла (предимно бета-глюкани и араби-ноксилани), например съдържащи над 45 % пшеница.	Без ограничение във времето
					Ендо-l,4-бета-глюканаза: 1 000 U	—		
					Алфа-амилаза: 100U	—		
					Бацило-лизин: 112U	—		
					Ендо-l,4-бета-ксиланаза: 5 000 U	—		

02005R0358 — BG — 31.03.2017 — 002.001 — 3

▼B

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
▼M2 ———								
▼B								
E 1622	Ендо-l,3(4)- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-l,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-l,3(4)-бета-глюканаза и ендо-l,4-бета-ксиланаза, получена от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) с минимално действие от: Гранулат: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Течна форма: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Пилета за угояване	—	Ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 500 BGU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-l,3(4)-бета-глюканаза: 500 BGU ендо l,4-бета-ксиланаза: 680 EXU 3. За употреба в хранителни смески от полизахариди без съдържание на скорбяла (предимно бета-глюкани и араби-ноксилани), например съдържащи над 30 % пшеница и 30 % ечемик или 20 % ръж.	Без ограничение във времето
					Ендо-l,4-бета-ксиланаза: 680 EXU	—		

([1]) 1 KNU е количеството ензим, което освобождава 672 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от разтворима скорбяла на минута при pH 5.6 и при 37 °C.
([2]) 1 FBG е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 5.0 и при 30 °C.
([3]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0056 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 7.5 и при 30 °C.
([4]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0056 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от карбоксиметилцелулоза на минута при pH 4.8 и при 50 °C.
([5]) 1 U е количеството ензим, което хидролизира 1 микромол на минута глюкозидни връзки от неразтворим във вода полимер от скорбяла с напречни връзки, при pH 7.5 и при 37 °C.
([6]) 1 U е количеството ензим, което прави 1 микрограм азо-казеин разтворим в трихлоро-оцетна киселина на минута, при pH 7.5 и при 37 °C.
([7]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0067 микромола редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от ксилан от брезово дърво на минута при pH 5.3 и при 50 °C.
([8]) 1 BGU е количеството ензим, което освобождава 0,278 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 3.5 и при 40 °C.
([9]) 1 EXU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 3.5 и при 55 °C.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					mg/kg от цялата храна за животни			
Оцветители, включително пигменти								
2. **Други оцветители**								
E 102	Тартразин	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Декоративни птички, хранещи се със семена	—	—	150	—	Без ограничение
			Дребни гризачи	—	—	150	—	Без ограничение
E 110	Залезно жълто FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Декоративни птички, хранещи се със семена	—	—	150	—	Без ограничение
			Дребни гризачи	—	—	150	—	Без ограничение
▼M1 _____								
▼B E 141	Хлорофилен меден комплекс	—	Декоративни птички, хранещи се със семена	—	—	150	—	Без ограничение
			Дребни гризачи	—	—	150	—	Без ограничение

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					mg/kg от цялата храна за животни			
Ензими								
51	Ендо-l,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8	Препарат от ендо-l,4-бета-ксиланаза получен от *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) с минимално действие: Твърдо и течно състояние: 100 IU ([1])/g или ml	Кокошки носачки	—	10 IU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: 10 IU 3. За употреба в хранителни смески богати на арабиноксилан, например съдържащи минимум 40 % пшеница или ечемик.	6 март 2009 г.
28	3-фитаза EC 3.1.3.8	Препарат от 3-фитаза получен от *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) с минимално действие: Твърдо състояние: 5 000 PPU ([2])/g Течно състояние: 1 000 PPU/g	Пуйки за угояване	—	250 PPU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за 250—1 000 PPU животни: 3. За употреба в хранителни смески съдържащи над 0,22 % фосфор в химична връзка с фитин.	6 март 2009 г.
			Свине за разплод	—	250 PPU	—	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за 500—1 000 PPU животни: 3. За употреба в хранителни смески съдържащи над 0,22 % фосфор в химична връзка с фитин.	6 март 2009 г.

([1]) 1 IU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от ксилан от брезово дърво на минута при pH 4.5 и при 30 °C.
([2]) 1 PPU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при pH 5 и при 37 °C.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание / Максимално съдържание	Други условия / Край на	срока на разрешителното	mg/kg от цялата храна за животни
Микроорганизми								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Препарат от *Enterococcus faecium* със съдържание на минимум в капсулована форма 5×10^9 CFU/g	Кучета	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.	6 март 2009 г.
			Котки	—	5×10^6	8×10^9	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране	6 март 2009 г.