VERORDENING (EEG) Nr. 1462/82 VAN DE RAAD

van 18 mei 1982

tot vaststelling van de voor de oogst 1982 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak en referentiekwaliteiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1461/82 [2], inzonderheid op artikel 2, lid 5, artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 8,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement [3],

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [4],

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden zowel met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die de Gemeenschap voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel wil leveren; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen voor tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde criteria, ten einde de produktie een bepaalde oriëntatie te geven en met name de overschakeling te bevorderen op soorten die het meest worden gevraagd en het best kunnen concurreren;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1535/81 van de Raad van 19 mei 1981 houdende vaststelling van bijzondere maatregelen voor bepaalde soorten ruwe tabak van de oogsten 1981, 1982 en 1983 [5] voorziet in een verlaging van de interventieprijs voor deze tabakssoorten;

Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1982 afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten waarvan vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening, of wat de in Griekenland geteelde soorten betreft, vóór de toetreding, een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond, alsmede voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat land; dat te dien einde enerzijds de stijging van de kosten en anderzijds de toeneming van de produktiviteit in aanmerking dienen te worden genomen;

Overwegende dat de premie die wordt toegekend aan de kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak, ten doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van de streefprijs, met inachtneming van de ontwikkeling van de prijzen op de wereldmarkt, en het uit vraag en aanbod op de markt van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebedrag voor elke soort moeten worden vastgesteld voor een referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoordeeld; dat voor de oogst 1982 de definities van de referentiekwaliteiten moeten worden aangehouden die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1534/81 van de Raad van 19 mei 1981 tot vaststelling van de voor de oogst 1981 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak en referentiekwaliteiten [6];

Overwegende dat in artikel 87, lid 3, van de Akte van Toetreding van 1979 is bepaald dat de streefprijzen voor Griekenland worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 2, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 727/70 genoemde criteria, en dat zij in vier

---

[1] PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.
[2] Zie blz. 27 van dit Publikatieblad.
[3] PB nr. C 104 van 26. 4. 1982, blz. 25.
[4] PB nr. C 114 van 6. 5. 1982, blz. 1.
[5] PB nr. L 156 van 15. 6. 1981, blz. 19.
[6] PB nr. L 156 van 15. 6. 1981, blz. 1.

etappen worden verhoogd naarmate de nationale steun voor tabak door de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 69 wordt verlaagd; dat de eerste verhoging plaatsvindt voor de tweede oogst na de toetreding;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1207/82 [1] is bepaald dat in de sector tabak vanaf 20 mei 1982 voor de munteenheid van sommige Lid-Staten een nieuwe representatieve koers geldt; dat deze bepaling vanaf die datum zou leiden tot een daling in nationale munteenheid van de in rekeneenheden vastgestelde premies voor een aanzienlijk deel van de oogst in de Lid-Staten waarvan de representatieve koers is gerevalueerd; dat het evenwel meer aan de kenmerken van de sector beantwoordt de gehele oogst van een jaar op dezelfde wijze te behandelen; dat dit doel kan worden bereikt indien in de betrokken Lid-Staten de oude wisselkoers van toepassing wordt verklaard op de voor de oogst 1981 uitbetaalde premies,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de oogst 1982 zijn de in artikel 2, lid 3, sub c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

Voor de oogst 1982 zijn de in artikel 6, lid 3, sub c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elke soort verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld, vastgesteld in bijlage II.

Artikel 3

Voor de oogst 1982 zijn de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde streefprijzen, interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van die verordening bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak vastgesteld in bijlage III.

Artikel 4

De omrekeningskoers die in de Bondsrepubliek Duitsland moet worden toegepast op de premies voor de tabaksoogst 1981 is de vóór 20 mei 1982 voor de betrokken munteenheid geldende representatieve koers.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. de KEERSMAEKER

[1] PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 51.

BIJLAGE I

Tabaksbladeren: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1982

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid: 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde en stevige goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur, gelijke bladgrootte Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid: 25 %
3	Virgin D	Bladeren van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleuring zijn tot $^1/_3$ van de bladoppervlakte toegestaan Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid: 19 %
4	a) Paraguay en hybriden daarvan b) Dragon vert en hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Middenblad (Leaves) van de klasse 2 Klasse 2: gezonde bladeren met lichte gebreken wat betreft kleur, aard van het weefsel of rijpheid, maar van bevredigende brandbaarheid Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %
5	Nijkerk	Topblad (Tips) van de klasse 2 Klasse 2: — hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan 45 cm), sterk gomhoudend, vol, gaaf, sterk en elastisch, met verzonken nerven, van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine kleur, warm van tint — hetzij bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), nog gomhoudend, vol, nog gaaf, sterk, met min of meer gepronon-ceerde nerven, van elke kleur behalve flessengroen Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
6	a) Misionero en hybriden daarvan b) Rio Grande en hybriden daarvan	Bladeren van de 2e kwaliteit 2e kwaliteit: ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm, met niet grof weefsel, met een lichte, iets geelachtige kleur, van warme of vrij warme toon, voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %
7	Bright	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg Vochtigheid: 16 %
8	Burley I	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 19 %
9	Maryland	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 19 %
10	a) Kentucky en hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van de categorie B Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 23 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
11	a) Forchheimer Havanna IIc b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft droging, gedeeltelijke fermentatie en gaafheid Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 24 %
13	Xanti-Yakà	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf, waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van de categorie B Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen: 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren Presentatie: met een ander middel dan tabak samengebundeld (fascicoli) Vochtigheid: 22 %
17	Basmas	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken; afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang, goudgele, oranjegele tot roodgele kleur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en fijne weefselstructuur; typisch en sterk aroma, goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken; weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde; tot 20 cm lang; lichtgele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur en goede weefselstructuur; middelmatige soepelheid en glans, gemiddelde substantie; typisch en sterk aroma, zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 25 kg die bestaan uit op de traditionele wijze in twee rijen gelegde „pastali" (in gestrekt losblad). (Opgemerkt dient te worden dat in de streek van Astakos en Chryssoupolis de tabak op „armathodema"-wijze wordt verpakt.) Vochtigheid: 17 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
18	Katerini en vergelijkbare soorten	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele, of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: De guirlandes worden gewoonlijk op de „Baski"-wijze opgestapeld voordat ze worden verpakt. Op de traditionele „Kaloupi"-wijze verpakt in balen van 25 tot 35 kg Vochtigheid: 16 %
19	Kabakoulak (klassieke)	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken; van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm voor Karatzova en Kontoula, middelmatig gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula, gele, geelgroene, roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg bestaande uit op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen gelegde bladeren Vochtigheid: 17 %
20	a) Kabakoulak (andere dan klassieke) b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere pluk uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Elassona en Phi 1, en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit	
20 *(vervolg)*	a) Kabakoulak (andere dan klassieke) b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1		rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Elassona en Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele, geelgroene tot lichtbruine kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren
		Presentatie:	In planterbalen van 25 tot 35 kg die op de traditionele „armathodema"-wijze zijn gemaakt of van 35 tot 50 kg in de vorm van „kaloupi"
		Vochtigheid:	17 %
21	Myrodata Agrinion	Bladeren van de kwaliteit I/III	
		Kwaliteit I/III:	rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren
		Presentatie:	In planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd
		Vochtigheid:	15 %
22	Zichnomyrodata	Bladeren van de kwaliteit I/III	
		Kwaliteit I/III:	rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren
		Presentatie:	In planterbalen van 15 tot 30 kg waarvan de bladeren op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd
		Vochtigheid:	17 %
23	Tsebelia	Bladeren van de kwaliteit I/III	
		Kwaliteit I/III:	rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste, tot 35 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit	
23 *(vervolg)*	Tsebelia		rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele, groengele, roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren
		Presentatie:	In planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd
		Vochtigheid:	14 %
24	Mavra	Bladeren van de kwaliteit I/III	
		Kwaliteit I/III:	rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, van geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige, geelgroene (citroengele), roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren
		Presentatie:	In planterbalen van 30 tot 50 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd
		Vochtigheid:	14 %
25	Burley GR	Bladeren van de kwaliteit A	
		Kwaliteit A:	volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gaaf, gezond, zonder drogingsgebreken, afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand
		Presentatie:	In planterbalen van 40 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad)
		Vochtigheid:	22 %
26	Virginia GR	Bladeren van de kwaliteit A	
		Kwaliteit A:	volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gezond, gaaf, zonder drogingsgebreken, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede substantie, goede weefselstructuur en goede brand, hoofdzakelijk afkomstig van het middenblad
		Presentatie:	In planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad)
		Vochtigheid:	19 %

BIJLAGE II

Verpakte tabak: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1982

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur, van gelijke grootte, normale fermentatie Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 16 %
2	Badischer Burley F	Hauptgut (Leaves) van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur, gelijke bladgrootte, normale fermentatie Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 15 %
3	Virgin D	Bladeren van de klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot geelbruine kleur, normale fermentatie Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 13 %
7	Bright	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %
8	Burley I	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
9	Maryland	Bladeren van de categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken, ook met zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een min of meer warme roodbruine kleur Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van de categorie B Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie: In vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in balen van ongeveer 170 tot 200 kg Vochtigheid: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) van de klasse I Klasse I: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur, van gelijke grootte, normale fermentatie Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en gaafheid Presentatie: in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg Vochtigheid: 16 %
13	Xanti-Yakà	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van de categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van de categorie B Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen: 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren Presentatie: in balen van ongeveer 70 tot 90 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 180 tot 210 kg Vochtigheid: 16 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
17	Basmas	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang, goudgele, oranjegele tot roodgele kleur; goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en goede weefselstructuur; typisch en sterk aroma, goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 40 % uit de hierboven omschreven bladeren (I en II) rijpe en voldoende gave bladeren; met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, tot 20 cm lang, lichtgele, roodachtige of lichtbruine kleur, voldoende open textuur en goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans; gemiddelde substantie; typisch en sterk aroma, zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
18	Katerini en vergelijkbare soorten	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang; gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur, en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven beschreven bladeren Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
19	Kabakoulak (klassieke)	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, goed behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Karatzova en Kontoula, gele tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
20	a) Kabakoulak (andere dan klassieke) b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Elassona en Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, vrij open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren, met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kabakoulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Elassona en Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde; tot 30 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede soepelheid en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 14 %
22	Zichnomyrodata	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren van iedere plukronde, uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, uitstekende brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
23	Tsebelia	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, behalve de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde bladsubstantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
24	Mavra	Bladeren van de kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde, uitgezonderd de eerste („protomana") tot 30 cm lang van geelrood of oranjegeel tot roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand. De kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen. De kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: In zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
25	Burley GR	Bladeren van de kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Presentatie: In balen van ongeveer 100 kg of in kisten van ongeveer 200 kg of in vaten van ongeveer 240 tot 280 kg Vochtigheid: 13 %
26	Virginia GR	Bladeren van de kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde bladeren, afkomstig van het middenblad, gezond, gaaf, zorgvuldig behandeld, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede weefselstructuur en goede brand Presentatie: In balen van ongeveer 100 kg Vochtigheid: 13 %

BIJLAGE III

Streefprijzen, interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1982

Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1982

(in Ecu/kg)

Volg-nummer	Soort	Streefprijs	Interventie-prijs	Premie	Afgeleide interven-tieprijs
1	Badischer Geudertheimer	3,513	2,986	2,419	4,430
2	Badischer Burley E	4,199	3,569	2,599	5,031
3	Virgin D	4,096	3,482	2,445	4,606
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,262	2,773	2,236	–
5	Nijkerk	3,236	2,751	2,036	–
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	3,016	2,564	2,062	–
7	Bright	3,604	3,063	2,055	4,239
8	Burley I	2,650	2,253	1,451	3,300
9	Maryland	3,021	2,568	1,612	3,658
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	2,550	2,040	1,579	2,905
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,386	2,878	2,351	4,245
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	1,828	1,554	1,328	2,310
13	Xanti-Yakà	3,439	2,751 (1)	2,509	4,380 (1)
14	a) Perustitza	3,257	2,606 (1)	2,389	3,824 (1)
	b) Samsun	3,257	2,768	2,325	4,032
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	2,925	2,340 (1)	2,151	3,447 (1)
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,336	13,036	9,178	19,747
17	Basmas	4,944	4,202	2,567	5,727
18	Katerini en vergelijkbare soorten	4,254	3,616	2,283	5,281
19	Kabakoulak (klassieke)	3,776	3,210	2,018	4,592

(1) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1535/81 houdende vaststelling van bijzondere maatregelen voor bepaalde soorten ruwe tabak van de oogsten 1982 en 1983.

(in Ecu/kg)

Volg-nummer	Soort	Streefprijs	Interventie-prijs	Premie	Afgeleide interven-tieprijs
20	a) Kabakoulak (andere dan klassieke) b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	2,968	2,523	1,489	3,820
21	Myrodata Agrinion	3,818	3,245	2,108	4,572
22	Zichnomyrodata	3,906	3,320	2,149	4,715
23	Tsebelia	3,956	3,363	3,161	4,763
24	Mavra	3,861	3,282	2,584	4,672
25	Burley GR	1,974	1,678	0,869	2,680
26	Virginia GR	3,089	2,626	1,549	3,706