2025/1878

2025.9.17.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/1878 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2025. szeptember 16.)

a „BPF Propanol” biocid termékcsalád 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2019. március 29-én a Bode Chemie GmbH az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) egy, a rendelet V. melléklete szerinti 1., 2. és 4. terméktípusba tartozó, „BPF Propanol” elnevezésű biocid termékcsalád uniós engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes német hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-NE050445-47 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) A „BPF Propanol” hatóanyaga a propán-1-ol és a propán-2-ol, amelyek az 1., 2., 4. terméktípus tekintetében szerepelnek az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében.

(3) 2024. augusztus 14-én az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Ügynökséghez.

(4) 2025. március 21-én az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz véleményét ([2]), a „BPF Propanol” biocid termék jellemzői összefoglalójának (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) tervezetét és a biocid termékcsaládra vonatkozó végleges értékelési jelentést.

(5) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a „BPF Propanol” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontja szerinti biocid termékcsalád, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és amelyre vonatkozóan – feltéve, hogy megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesülnek a rendelet 19. cikkének (6) bekezdésében meghatározott feltételek.

(6) 2025. április 8-án az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(7) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, ezért úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a „BPF Propanol” biocid termékcsaládra.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Az ECHA 2025. február 27-i véleménye a „BPF Propanol” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/462/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bode Chemie GmbH EU-0034602-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „BPF Propanol” biocid termékcsaládnak a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalóval összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2025. október 7-től 2035. szeptember 30-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

BPF Propanol

Terméktípus(ok)

PT1: Humán-egészségügy

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

Az engedély száma EU-0034602-0000

R4BP eszközszám EU-0034602-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. fejezet - **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	BPF Propanol

1.2. **Terméktípusa(ok)**

Terméktípus(ok)	PT1: Humán-egészségügy PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

1.3. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	BODE Chemie GmbH
	Cím	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Az engedély száma	EU-0034602-0000	
R4BP eszközszám	EU-0034602-0000	
Az engedély megadásának dátuma	2025. október 7.	
Az engedély lejáratának dátuma	2035. szeptember 30.	

1.4. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Bode Chemie GmbH
A gyártó címe	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Németország
Gyártási helyek	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Németország

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Propán-1-ol
A gyártó neve	BASF SE
A gyártó címe	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Németország
Gyártási helyek	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Németország

Hatóanyag	Propán-2-ol
A gyártó neve	INEOS Solvents Germany GmbH
A gyártó címe	Römerstr. 733 47443 Moers Németország
Gyártási helyek	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Németország

2. fejezet - **A TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **A termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 - 45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Nem hatóanyag	112-72-1	204-000-3	0 - 1 % (w/w)

2.2. **A formuláció típusa(i)**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék XX Impregnált törlőkendő(k)

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

1. fejezet - **META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT1: Humán-egészségügy

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 1**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 1**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Nem hatóanyag	112-72-1	204-000-3	0,25 - 1 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 1**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 1**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz.

	P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 1

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 25-ször) Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 30 másodperc Korlátozott spektrumú virucid hatás – 60 másodperc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező.

Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, lakossági felhasználás – meta SPC 1

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml (kb. egy nagyobb érményi folyadék) A kezelések száma és időzítése: Szükség szerint: felnőttek és 2 évesnél idősebb gyermekek naponta legfeljebb 10 alkalommal, kisgyermekek naponta legfeljebb 8 alkalommal használhatják. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 30 másodperc Korlátozott spektrumú virucid hatás – 60 másodperc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Ne használja többször, mint az egy napra megadott alkalmazásszám.

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Először vigye fel a saját kezére a (kis)gyermeknek szánt mennyiséget, majd dörzsölje át vele a (kis)gyermek kezét. Ügyeljen arra, hogy a (kis)gyermek ne érjen a szeméhez vagy a szájához, mielőtt a termék megszáradna.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Sebészeti kézfertőtlenítés/rezidens bakteriális bőrflóra, PT1, foglalkozásszerű felhasználók – meta SPC 1

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás)
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Sebészeti kézfertőtlenítés / rezidens bakteriális bőrflóra. A termék használatra kész, alkoholos fertőtlenítőszer, amelyet egészségügyi területeken / kórházakban használnak.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Sebészeti kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 2-szer 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 4-szer). Behatási idő: 90 másodperc
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön 2-szer 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre és alkarra 1,5 percig, úgy, hogy az alkalmazás ideje alatt a bőr nedvesen maradjon.

Dekantálás vagy újratöltés csak aszeptikus körülmények között végezhető.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321-1 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 1**

5.1. **Felhasználási útmutató**

lásd a felhasználásra vonatkozó specifikus előírásokat

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használat során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott termék teljesen megszáradt, mielőtt belép a helyiségbe vagy egy olyan területre, ahol hosszabb ideig tartózkodnak majd emberek.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Ha irritáció lép fel, mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Nem szándékos bőrexpozíció esetén: mossa le vízzel.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap.

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

Közvetlen fénytől védendő.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m^3-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány- Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 1**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Sterillium pure	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0001 1-1			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Nem hatóanyag	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Sterillium classic blue	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0002 1-1			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Nem hatóanyag	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT1: Humán-egészségügy

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 2**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 2**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 2**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 2**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező.

	P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi tanácsot kell kérni. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 2

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 25-ször). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 30 másodperc Korlátozott spektrumú virucid hatás – 60 másodperc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező.

Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, lakossági felhasználás – meta SPC 2

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml (kb. egy nagyobb érményi folyadék) A kezelések száma és időzítése: Szükség szerint: felnőttek és 2 évesnél idősebb gyermekek naponta legfeljebb 10 alkalommal, kisgyermekek naponta legfeljebb 8 alkalommal használhatják. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 30 másodperc Korlátozott spektrumú virucid hatás – 60 másodperc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Ne használja többször, mint az egy napra megadott alkalmazásszám.

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Először vigye fel a saját kezére a (kis)gyermeknek szánt mennyiséget, majd dörzsölje át vele a (kis)gyermek kezét. Ügyeljen arra, hogy a (kis)gyermek ne érjen a szeméhez vagy a szájához, mielőtt a termék megszáradna.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Sebészeti kézfertőtlenítés / rezidens bakteriális bőrflóra, PT1, foglalkozásszerű felhasználók

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás)
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Sebészeti kézfertőtlenítés / rezidens bakteriális bőrflóra. A termék használatra kész, alkoholos fertőtlenítőszer, amelyet egészségügyi területeken / kórházakban használnak.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: sebészeti kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 2-szer 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 4-szer). Behatási idő: 90 másodperc
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön 2-szer 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre és alkarra 1,5 percig, úgy, hogy az alkalmazás ideje alatt a bőr nedvesen maradjon.

Dekantálás vagy újratöltés csak aszeptikus körülmények között végezhető.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 2**

5.1. **Felhasználási útmutató**

lásd a felhasználásra vonatkozó specifikus előírásokat

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használat során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott termék teljesen megszáradt, mielőtt belép a helyiségbe vagy egy olyan területre, ahol hosszabb ideig tartózkodnak majd emberek.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Ha irritáció lép fel, mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Nem szándékos bőrexpozíció esetén: mossa le vízzel.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

Közvetlen fénytől védendő.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány - Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 2**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			Sterillium pure IPM	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0034602-0003 1-2		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT1: Humán-egészségügy

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 3**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 3**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 3**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 3**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi tanácsot kell kérni. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó.

	P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, foglalkozásszerű és ipari felhasználók

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 25-ször). Behatási idő: 30 másodperc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE flakon 35 - 100 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Higiénés kézfertőtlenítő, PT1, lakossági felhasználás

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék intézményi, egészségügyi és háztartási területeken használható, használatra kész kézfertőtlenítőszer.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Higiénés kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 3 ml (kb. egy nagyobb érményi folyadék) A kezelések száma és időzítése: Szükség szerint: felnőttek és 2 évesnél idősebb gyermekek naponta legfeljebb 10 alkalommal, kisgyermekek naponta legfeljebb 8 alkalommal használhatják. Behatási idő: 30 másodperc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE flakon 35 - 100 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Dörzsöljön 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre, és tartsa nedvesen a bőrfelületet a szükséges behatási idő eléréséig.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Ne használja többször, mint az egy napra megadott alkalmazásszám.

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Először vigye fel a saját kezére a (kis)gyermeknek szánt mennyiséget, majd dörzsölje át vele a (kis)gyermek kezét. Ügyeljen arra, hogy a (kis)gyermek ne érjen a szeméhez vagy a szájához, mielőtt a termék megszáradna.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Sebészeti kézfertőtlenítés/rezidens bakteriális bőrflóra, PT1, foglalkozásszerű felhasználók

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Sebészeti kézfertőtlenítés / rezidens bakteriális bőrflóra. A termék használatra kész, alkoholos fertőtlenítőszer, amelyet egészségügyi területeken / kórházakban használnak.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: sebészeti kézfertőtlenítő Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Legalább 3 ml alkalmazásonként A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 4-szer). Behatási idő: 90 másodperc
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 35 - 100 ml HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Dörzsöljön legalább 3 ml terméket a száraz és láthatóan tiszta kézre és alkarra 1,5 percig, úgy, hogy az alkalmazás ideje alatt a bőr végig nedves maradjon.

Dekantálás vagy újratöltés csak aszeptikus körülmények között végezhető.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 3**

5.1. **Felhasználási útmutató**

lásd a felhasználásra vonatkozó specifikus előírásokat

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használat során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről.

Mielőtt belépne a helyiségbe vagy olyan területre, ahol hosszabb ideig tartózkodnak majd emberek, győződjön meg róla, hogy a terméket alkalmazták és az teljesen megszáradt.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Ha irritáció lép fel, mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Nem szándékos bőrexpozíció esetén: mossa le vízzel.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap.

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány - Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 3**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Sterillium Gel PRO	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0004 1-3			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 4 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 4

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-4

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 4**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 4**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 4**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 4**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P264: A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

	P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi tanácsot kell kérni. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 4

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m²; Ipari terület: 18 - 50 ml/m². A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

A termék felvitelére használt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 4

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 4

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m^2; Ipari terület: 18 - 50 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

A termék felvitelére használt palackok újratöltése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 4

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2 A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 4**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Permetezzen vagy öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Szobahőmérsékleten használja.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Az alkalmazás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: A bőrt vízzel le kell mosni. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap.

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány - Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 4**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol pure	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0005 1-4			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 5 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 5 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 5

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-5

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 5**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 5**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 5**

Formuláció típusa(i)	XX Impregnált törlőkendő(k)

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 5**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat.

	P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.
	P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni.
	P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges.
	P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges.
	P242: Szikramentes eszközök használandók.
	P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
	P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz.
	P264: A használatot követően a(z) kezek-t alaposan meg kell mosni.
	P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
	P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező.
	P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
	P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
	P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
	P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
	P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ kell kérni.
	P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz
	P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
	P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
	P405: Elzárva tárolandó.
	P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
	P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 5

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban.

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 5

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban.

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Az újbóli belépés előtt 15 percig megfelelő szellőztetést kell biztosítani (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel).

Kerülnje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 5

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m²/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum: naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban.

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m²-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 5

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban.

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a szükséges behatási idő eléréséig. Használat után ártalmatlanítsa a kendőt.

Csak nedves törlőkendőt használjon.

Szobahőmérsékleten használja.

Felbontás után zárja le a csomagolást.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

Az alkalmazás során gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítse ki vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést 5 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: A bőrt vízzel le kell mosni. Tünetek jelentkezése esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy forduljon orvoshoz.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 5**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Bacillol pure Tissues	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0034602-0006 1-5	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 6 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 6 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 6

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-6

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 6**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 6**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 6**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 6**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz

	P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 6

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m^2; Ipari terület: 18 - 50 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezzen vagy öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése és a termék kezelése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 6

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Kerülje a kifröccsenést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 6

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m^2; Ipari terület: 18 - 50 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezzen vagy öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m^2) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m^2.

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m^2-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése és a termék kezelése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 6

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2 A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Kerülje a kifröccsenést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 6**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Szobahőmérsékleten használja.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Az alkalmazás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután az összes szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Folytassa a bőr öblítését vízzel 15 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Orvos felkeresése előtt a szemet többször is ki kell öblíteni, ha lúgos (pH >11) vegyi anyagok, aminok és savak – például ecetsav, hangyasav vagy propionsav – kerültek bele.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések” szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány - Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 6**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Bacillol AF pro	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0034602-0007 1-6	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 7 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 7 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 7

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-7

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 7**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 7**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 7**

Formuláció típusa(i)	XX Impregnált törlőkendő(k)

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 7**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó.

	P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 7

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 7

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 7

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (gyakoriság: naponta 8-ször). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 7

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 7**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a szükséges behatási idő eléréséig. Használat után ártalmatlanítsa a kendőt.

Csak nedves törlőkendőt használjon.

Szobahőmérsékleten használja.

Felbontás után zárja le a csomagolást.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Az alkalmazás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután az összes szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Folytassa a bőr öblítését vízzel 15 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Orvos felkeresése előtt a szemet többször is ki kell öblíteni, ha lúgos (pH >11) vegyi anyagok, aminok és savak – például ecetsav, hangyasav vagy propionsav – kerültek bele

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap.

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „felhasználói kategóriák” vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)” alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 7**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol AF pro Tissues		Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma		EU-0034602-0008 1-7			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 8 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 8 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 8

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-8

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 8**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 8**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 8**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 8**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz.

	P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 8

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m²; Ipari terület: 18 - 50 ml/m². A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezzen vagy öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Szobahőmérsékleten használja.

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése és a termék kezelése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 8

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2 A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

Szobahőmérsékleten használja.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Kerülje a kifröccsenést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 8

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés vagy öntés, majd törlés Részletes leírás:

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Intézményi, egészségügyi és háztartási terület: 18 ml/m²; Ipari terület: 18 - 50 ml/m² A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml HDPE tartály 5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezzen vagy öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

A baktérium- és élesztőgomba-ölő hatás érdekében: 4 °C-tól akár szobahőmérsékletig terjedő használatra.

Egyéb célszervezetek elleni hatékonyság érdekében: Szobahőmérsékleten használja.

Intézményi, egészségügyi és háztartási területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

Ipari területen:

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8–22 sec/m²) a felületre.

Permetezés (500–1000 ml-es palack): 15–41 pumpálás/m².

Permetezés (50 ml-es palack): legalább 12 pumpálás 0,1 m²-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Tekintettel a 98/24/EK tanácsi irányelvre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó más uniós jogszabályokra, a következő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni:

Az alkalmazásra szánt palackok újratöltése és a termék kezelése során szemvédő használata kötelező. Az EN ISO 16321 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű szemvédő.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 8

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőszer, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Öntés, majd törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 18 ml/m^2. A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta. Behatási idők: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	HDPE flakon 50 - 1000 ml

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntsön elegendő mennyiséget a termékből a fertőtlenítendő felületre, és azt szükség esetén törölje át, úgy, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a terméket az előírt behatási idő eléréséig.

A baktérium- és élesztőgomba-ölő hatás érdekében: 4 °C-tól akár szobahőmérsékletig terjedő használatra.

Egyéb célszervezetek elleni hatékonyság érdekében: Szobahőmérsékleten használja.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Öntés: Fordítsa meg a palackot, és öntse a tartalmát (8 sec/m^2) a felületre.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Kerülje a kifröccsenést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 8**

5.1. **Felhasználási útmutató**

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Az alkalmazás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután az összes szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Folytassa a bőr öblítését vízzel 15 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Orvos felkeresése előtt a szemet többször is ki kell öblíteni, ha lúgos (pH >11) vegyi anyagok, aminok és savak – például ecetsav, hangyasav vagy propionsav – kerültek bele.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „Kockázatcsökkentő intézkedések" szakaszban említett EN-szabvány teljes címe a következő:

az EN ISO 16321 európai szabvány - Szem- és arcvédelem a foglalkozásszerű felhasználás során

A „felhasználói kategóriák" vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)" alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 8**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol AF classic	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0009 1-8			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

1. fejezet - **META-SPC 9 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 9 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: meta SPC 9

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-9

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. fejezet - **META SPC ÖSSZETÉTEL 9**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 9**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 9**

Formuláció típusa(i)	XX Impregnált törlőkendő(k)

3. fejezet - **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 9**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P103: Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőz. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) szemvédelem viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

	P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN:: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P312: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon vízköd, hab, szén-dioxid vagy por oltóanyag az oltáshoz P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalmának ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) konténer ártalmatlanítása: a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 9

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: 1) A Bacillol AF classic kendők és a Bacillol classic törlőkendők esetében: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc 2) A Bacillol classic kendők esetében: 5 perc, 2 kendőt egymás fölé helyezve
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban PET/cellulózkendők/törlőkendők HDPE adagolóban vagy PET/PE tasakban

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Szobahőmérsékleten használja.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

Bacillol classic kendők: 5-8 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol AF classic kendők: 2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol classic törlőkendők: Kb. 1 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT2, lakossági felhasználás – meta SPC 9

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok (korlátozott spektrumú virucid hatás) Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi (pl. szállodák), egészségügyi (pl. kórházak, orvosi rendelők) és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 5 alkalmazás naponta. Behatási idők: 1) A Bacillol AF classic kendők és a Bacillol classic törlőkendők esetében: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és korlátozott spektrumú virucid hatás – 5 perc 2) A Bacillol classic kendők esetében: 5 perc, 2 kendőt egymás fölé helyezve
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban PET/cellulózkendők/törlőkendők HDPE adagolóban vagy PET/PE tasakban

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Szobahőmérsékleten használja.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

Bacillol classic kendők: 5-8 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol AF classic kendők: 2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol classic törlőkendők: Kb. 1 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, foglalkozásszerű és ipari felhasználók – meta SPC 9

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely ipari, intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez.

	A kezelések száma és időzítése: A terméket szükség szerint kell használni, ami napi többszöri használatot is jelenthet (maximum naponta 8-szor). Behatási idők: 1) A Bacillol AF classic kendők és a Bacillol classic törlőkendők esetében: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc 2) A Bacillol classic kendők esetében: 5 perc, 2 kendőt egymás fölé helyezve
Felhasználói kör	ipari szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban PET/cellulózkendők/törlőkendők HDPE adagolóban vagy PET/PE tasakban

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A baktérium- és élesztőgomba-ölő hatás érdekében: 4 °C-tól akár szobahőmérsékletig terjedő használatra.

Egyéb célszervezetek elleni hatékonyság érdekében: Szobahőmérsékleten használja.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

Bacillol classic kendők: 5-8 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol AF classic kendők: 2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol classic törlőkendők: Kb. 1 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

lásd az általános részt

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

lásd az általános részt

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kis felületek fertőtlenítése, PT4, lakossági felhasználás – meta SPC 9

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Közhasználatú név: Baktériumok Közhasználatú név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Gombák Közhasználatú név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Vírusok Közhasználatú név: Burkos vírusok
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás A termék kemény, nem porózus felületek fertőtlenítésére alkalmas, használatra kész fertőtlenítőkendő/törlőkendő, amely intézményi, egészségügyi és háztartási területen használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés Részletes leírás:
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–0,5 m^2/törlőkendő. A törlőkendőt olyan gyakran kell cserélni, amilyen gyakran csak szükséges a felület teljes átnedvesítéséhez. A kezelések száma és időzítése: maximum 1 alkalmazás naponta. Behatási idők: 1) A Bacillol AF classic kendők és a Bacillol classic törlőkendők esetében: Baktériumok, élesztőgombák, mikobaktériumok és burkos vírusok – 1 perc Gombák és vírusok – 5 perc 2) A Bacillol classic kendők esetében: 5 perc, 2 kendőt egymás fölé helyezve
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	PET kendők/törlőkendők PET/PE flowpack csomagolásban vagy PET/PE tasakban PET/cellulózkendők/törlőkendők HDPE adagolóban vagy PET/PE tasakban

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A baktérium- és élesztőgomba-ölő hatás érdekében: 4 °C-tól akár szobahőmérsékletig terjedő használatra.

Egyéb célszervezetek elleni hatékonyság érdekében: Szobahőmérsékleten használja.

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, és győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet.

Bacillol classic kendők: 5-8 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol AF classic kendők: 2-3 törlőkendőt használjon m^2-enként.

Bacillol classic törlőkendők: Kb. 1 törlőkendőt használjon m^2-enként.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A címkén az engedélyesnek egyszerű, könnyen érthető formában kell feltüntetnie az alkalmazási mennyiséget.

Kerülje a szembe jutást.

Kerülje a bőrrel való szükségtelen érintkezést.

Bőrszárazság esetén használjon megfelelő bőrápolót.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

lásd az általános részt

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

lásd az általános részt

5. fejezet - **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 9**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Törölje át a felületet egy kendővel/törlőkendővel, győződjön meg róla, hogy a termék teljesen bevonja a felületet, majd hagyja hatni a szükséges behatási idő eléréséig.

Csak nedves törlőkendőt használjon.

Felbontás után zárja le a csomagolást.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Az alkalmazás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről (pl. ablaknyitással vagy gépi szellőztetéssel). Kis helyiségekbe 15 percig ne engedjen be kisgyermeket és háziállatot, mielőtt újra belépne.

Gyermekektől, házi kedvencektől vagy nem-célszervezetektől elzárva tartandó.

A használt törlőkendőket zárt edényben kell elhelyezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. Amennyiben az érintett személy képes nyelni, adjon neki valamit inni. TILOS hánytatni. Ha tünetek jelentkeznek: Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Ha nincsenek tünetek információért forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak: Szükség esetén kezdje el az elsősegélynyújtást, majd hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

HA BŐRRE KERÜL: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután az összes szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Folytassa a bőr öblítését vízzel 15 percig. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Orvosi segítségért hívja a 112-es telefonszámot vagy a mentőket. Információ az egészségügyi személyzetnek vagy orvosnak:: Orvos felkeresése előtt a szemet többször is ki kell öblíteni, ha lúgos (pH >11) vegyi anyagok, aminok és savak – például ecetsav, hangyasav vagy propionsav – kerültek bele.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Eltarthatóság: 36 hónap

A tárolási hőmérséklet: maximum 40 °C.

6. fejezet - **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Tartsa szem előtt a propán-2-ol hatóanyagra (CAS-szám: 67-63-0) vonatkozó 129,28 mg/m³-es európai referenciaértéket, amelyet a biocid termék kockázatértékelésénél használtak.

A „felhasználói kategóriák" vonatkozásában megjegyzendő: „Foglalkozásszerű felhasználók (az ipari felhasználókat is beleértve)" alatt szakképzett foglalkozásszerű felhasználók értendők, amennyiben az országos jogszabályok ezt előírják.

7. fejezet - **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 9**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol AF classic Tissues	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0010 1-9			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol classic Tissues	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0011 1-9			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)

7.3. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Bacillol classic Wipes	Forgalmazási terület: EU		
Az engedély száma		EU-0034602-0012 1-9			
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Propán-1-ol		Hatóanyag	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)
Propán-2-ol		Hatóanyag	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)