Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2079

18.9.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2079

(2026. gada 17. septembris)

par atļauju ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu lietot par atšķirtu sivēnu barības piedevu (atļaujas turētājs: uzņēmums *Industrial Técnica Pecuaria, S.A.*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju lietot ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* (iepriekš klasificēta kā suga *Trichoderma longibrachiatum*) CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums lūgts atļaut ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparātu lietot par atšķirtu sivēnu barības piedevu un ir lūgts minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2026. gada 27. janvāra atzinumā ([2]) secināja, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts, lietots ieteicamajā pievienojamā daudzumā 20 alfa-galaktozidāzes aktivitātes vienības (*GALU*) un 25 endo-1,4-bēta-ksilanāzes aktivitātes (*AXC*) vienības uz kg kompleksās barības, ir drošs atšķirtiem sivēniem, un arī patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts tiek uzskatīts par elpceļu sensibilizatoru un ka inhalatīva eksponētība tiek uzskatīta par risku. Par piedevas potenciālu kairināt ādu vai acis vai būt par ādas sensibilizatoru secinājumi netika izdarīti. Iestāde turklāt secināja, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts, lietots ieteicamajā lietošanas daudzumā 20 *GALU* un 25 *AXC* vienības uz kg kompleksās barības, potenciāli var būt iedarbīga zootehniskā piedeva atšķirtiem sivēniem. Iestāde neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal* 2026;24:e9920, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9920.

(5) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas sniegti iepriekšējā novērtējumā par citu pieteikumu uz tās pašas piedevas atļauju un ko Iestāde verificējusi 2020. gada 19. marta atzinumā ([3]), ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ([4]) 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740 ražotas alfa-galaktozidāzes un ar *Trichoderma orientale* CBS 139997 ražotas *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tātad minētā preparāta lietošana būtu jāatļauj attiecībā uz atšķirtiem sivēniem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas "zootehniskās piedevas" un funkcionālās grupas "gremošanas veicinātāji", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 17. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([3]) *EFSA Journal* 2020;18(4):6086, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6086.

([4]) Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a33	*Industrial Técnica Pecuaria, S.A.*	*Endo*-1,4-bēta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) un alfa-galaktozidāze (EK 3.2.1.22)	*Piedevas sastāvs* *Endo*-1,4-bēta-ksilanāze (EK 3.2.1.8), ražota ar *Trichoderma orientale* CBS 139997, un alfa-galaktozidāze (EK 3.2.1.22), ražota ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740, kuras minimālā fermentatīvā aktivitāte ir 50 *AXC* ([1]) uz g piedevas un 40 *GALU* ([2]) uz g piedevas Cietā forma *Aktīvās vielas raksturojums* *Endo*-1,4-bēta-ksilanāze (EK 3.2.1.8), kas ražota ar *Trichoderma orientale* CBS 139997, un alfa-galaktozidāze (EK 3.2.1.22), kas ražota ar *Aspergillus tubingensis* ATCC SD 6740	Atšķirti sivēni	—	25 *AXC* 20 *GALU*	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti termiskā apstrādē. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no piedevas un premiksu lietošanas. Ja minētos riskus ar šādām procedūrām un pasākumiem novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2036. gada 8. oktobris

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Analītiskā metode ([3]) *Endo*-1,4-bēta-ksilanāzes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetrija, kuras pamatā ir *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes fermentatīva reakcija i) uz kviešu arabinoksilāna substrāta (barības piedevai un premiksiem) un ii) uz azo-ksilāna substrāta (kompleksajai barībai). Alfa-galaktozidāzes kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetrija, kuras pamatā ir alfa-galaktozidāzes fermentatīvā reakcija uz paranitrofenil-alfa-D-galaktopiranozīda substrāta.					

([1]) Viena *endo*-1,4-bēta-ksilanāzes aktivitātes (*AXC*) vienība ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē no kviešu arabinoksilāna substrāta pie pH 4,7 un 30 °C temperatūrā atbrīvo 0,058 mikromolus reducējošo cukuru, kuri izteikti kā ksilozes ekvivalenti.

([2]) Viena alfa-galaktozidāzes aktivitātes vienība (*GALU*) ir definēta kā fermenta daudzums, kas vienā minūtē pie pH 5,5 un 37 °C temperatūrā noārda vienu mikromolu paranitrofenil-alfa-D-galaktopiranozīda.

([3]) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2079/oj