Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►**B**

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1852/2003

ze dne 21. října 2003,

kterým se na deset let povoluje užívání kokcidiostatik v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 271 , 22.10.2003, s. 13)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Nařízení Komise (ES) č. 249/2006 ze dne 13. února 2006,	L 42	22	14.2.2006

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1852/2003

ze dne 21. října 2003,

kterým se na deset let povoluje užívání kokcidiostatik v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), naposledy pozměněnou nařízením Komise (ES) č. 1847/2003 ([2]), a zejména na články 3 a 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 70/524/EHS musí členské státy vyžadovat, aby žádná doplňková látka nebyla uvedena na trh, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.

(2) V případě doplňkových látek uvedených v části I přílohy C směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří kokcidiostatika a ostatní léčebné látky, může být vydáno povolení spojené s osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Takové povolení lze udělit na dobu deseti let, jsou-li splněny všechny příslušné podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(3) Hodnocení žádosti o vydání povolení na dobu deseti let, která byla předložena pro kokcidiostatický přípravek „Sacox 120 microGranulate", ukazuje, že jsou splněny příslušné podmínky stanovené ve směrnici 70/524/EHS.

Vědecký výbor pro výživu zvířat vydal příznivé stanovisko, pokud jde o bezpečnost a pozitivní účinky kokcidiostatického přípravku, který náleží do skupiny „Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky", na kuřice.

(4) Kokcidiostatický přípravek „Sacox 120 microGranulate" by proto měl být povolen na dobu deseti let a měl by být zařazen do seznamu povolených doplňkových látek, které jsou spojeny s osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh a které se povolují na dobu deseti let, jak je stanoveno ve směrnici 70/524/EHS.

(5) Hodnocení žádosti ukazuje, že pro ochranu pracovníků před expozicí doplňkové látce „Sacox 120 microGranulate" jsou nezbytné určité postupy. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ([3]).

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňková látka „Sacox 120 microGranulate", která náleží do skupiny „Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky" a je uvedena v příloze, se povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské Unie.*

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 269, 21.10.2003, s. 3.
([3]) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky na trh	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemické označení, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální věk	Minimální obsah	Maximální obsah	Ostatní ustanovení	Doba povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva			
„Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky									
E766	►**M1** Huvepharma nv ◄	Salinomycinát sodný 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate)	**Složení doplňkové látky:** salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg oxid křemičitý: 10-100 g/kg uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg **Účinná látka:** salinomycinát sodný $C_{42}H_{69}O_{11}Na$ číslo CAS: 53003-10-4 sodná sůl polyetheru kyseliny monokarboxylové vzniklá fermentací *Streptomyces Albus* (DSM 12217) Související nečistoty: < 42 mg elaiophylinu/kg salinomycinátu sodného < 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycinátu/kg salinomycinátu sodného	kuřice	12 týdnů	50	50	Uveďte v návodu k použití: ‚Nebezpečná pro koňovité a krocany a krůty‘ ‚Toto krmivo obsahuje ionofor: současné užívání s některými léčebnými látkami (např. tiamulin) může být kontraindikováno.‘	11. 11. 2013”