Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1852/2003

av den 21 oktober 2003

om tillåtelse att under en period av tio år använda koccidiostatika i foder

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 271 , 22.10.2003, s. 13)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens förordning (EG) nr 249/2006 av den 13 februari 2006	L 42	22	14.2.2006

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1852/2003

av den 21 oktober 2003

om tillåtelse att under en period av tio år använda koccidiostatika i foder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser ([1]), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1847/2003 ([2]), särskilt artiklarna 3 och 9 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 70/524/EEG skall medlemsstaterna kräva att fodertillsatser endast får avyttras om ett gemenskapstillstånd har medgivits.

(2) Vad gäller de fodertillsatser som förtecknas i del I i bilaga C till direktiv 70/524/EEG, som omfattar koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser, får ett tillstånd kopplat till den som är ansvarig för avyttringen av dessa medges. Tillståndet får ges för en period av tio år under förutsättning att de villkor som föreskrivs i direktivet är uppfyllda.

(3) Granskningen av ansökan om tillstånd för en period av tio år för koccidiostatikumpreparatet ”Sacox 120 microGranulate” visar att de villkoren i direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

Vetenskapliga foderkommittén har i ett yttrande fastställt att detta ”koccidiostatikumpreparat, som är av typen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser”, är ofarligt för och har en gynnsam effekt på kycklingar avsedda till värphöns.

(4) Koccidiostatikumpreparatet ”Sacox 120 microGranulate” bör därför tillåtas under en tioårsperiod i enlighet med direktiv 70/524/EEG och tas med i förteckningen över tillåtna fodertillsatser kopplade till den som är ansvarig för avyttringen av dessa.

(5) Granskningen av ansökan om tillstånd visar att vissa förfaranden krävs för att skydda arbetstagarna från exponering för fodertillsatsen ”Sacox 120 microGranulate”. Ett sådant skydd garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet ([3]).

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fodertillsatsen ”Sacox 120 microGranulate” som är av typen ”koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” enligt förteckningen i bilagan skall tillåtas för användning som fodertillsats på de villkor som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

([1]) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) EUT L 269, 21.10.2003, s. 3.
([3]) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

BILAGA

Tillsatsens registreringsnummer	Namn och registreringsnummer på den som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen	Tillsats (handelsnamn)	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						mg aktiv substans/kg helfoder			
”Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser									
E766	►**M1** Huvepharma nv ◄	Salinomycin natrium 120 g/kg (Sacox 120 mikrogranulat)	**Tillsatsens sammansättning:** Salinomycin natrium: ≥ 120 g/kg Kiseldioxid: 10–100 g/kg Kalciumkarbonat: 350–700 g/kg **Aktiv substans:** Salinomycin natrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, CAS-nummer: 53003-10-4, Natriumsalt av polyetermonokarboxylsyra producerat genom jäsning av *Streptomyces albus* (DSM 12217) Besläktade föroreningar: < 42 mg elaiofylin/kg salinomycin natrium < 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycin/kg salinomycin natrium	Kycklingar avsedda till värphöns	12 veckor	50	50	Ange följande i bruksanvisningen: ’Farligt för hästdjur och kalkoner’ ’Detta foder innehåller en jonofor. Bör inte användas tillsammans med vissa medicinskt verksamma substanser (t.ex. tiamulin).’	11.11.2013”