2025/145

30.1.2025

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2025/145

ze dne 29. ledna 2025,

kterou se mění prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o regulované nekaranténní škodlivé organismy pro Unii Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur a Fig mosaic agent, a kterou se uvedená prováděcí směrnice opravuje, pokud jde o opatření týkající se *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce ([1]), a zejména na článek 4, čl. 6 odst. 4 a čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ([2]) zavádí seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“). Dále stanoví požadavky ohledně dovozu některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie s cílem předcházet vstupu, usazení a šíření těchto škodlivých organismů na území Unie.

(2) Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ([3]) stanoví zvláštní požadavky na rody a druhy některých ovocných rostlin, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.

(3) Prováděcí směrnice 2014/98/EU by měla být změněna s cílem aktualizovat fytosanitární status některých škodlivých organismů a změnit zvláštní opatření proti uvedeným škodlivým organismům. RNŠO jsou uvedeny společně s příslušnými rostlinami k pěstování v příloze IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a odpovídající opatření k zabránění výskytu těchto RNŠO na uvedených rostlinách k pěstování jsou stanovena v příloze V uvedeného prováděcího nařízení. Pro RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce jsou však tato opatření stanovena pouze v prováděcí směrnici 2014/98/EU.

(4) Tobacco ringspot virus byl odstraněn ze seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a je uveden na seznamu jako RNŠO v části J přílohy IV uvedeného nařízení v souvislosti s rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce *Vaccinium* L., kromě pylu a osiva. Je proto nezbytné zařadit Tobacco ringspot virus na seznam v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o uvedený rod, aby byly uplatňovány příslušné požadavky čl. 9 odst. 2 a 4, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 uvedené směrnice a aby byla zajištěna odpovídající úroveň fytosanitární ochrany.

([1]) Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomato ringspot virus byl odstraněn ze seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a je uveden na seznamu jako RNŠO v části J přílohy IV uvedeného prováděcího nařízení v souvislosti s rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce *Malus* Mill., *Prunus* L. a *Vaccinium* L., kromě pylu a osiva, a *Rubus* L., kromě pylu. Je proto nezbytné z důvodu konzistentnosti zařadit Tomato ringspot virus na seznam v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o uvedené rody, aby byly uplatňovány příslušné požadavky čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 uvedené směrnice a aby byla zajištěna odpovídající úroveň fytosanitární ochrany.

(6) Na Tobacco ringspot virus a Tomato ringspot virus by se dále měla vztahovat opatření přílohy IV prováděcí směrnice 2014/98/EU s cílem zajistit, aby příslušné rostliny byly v příslušných kategoriích prosté těchto škodlivých organismů.

(7) V bodě 11 přílohy IV prováděcí směrnice 2014/98/EU bylo opatření proti *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. omylem zařazeno do oddílu „f) Kategorie CAC“ do opatření týkajících se *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider. Prováděcí směrnice 2014/98/EU by proto měla být opravena odstraněním uvedeného opatření z opatření týkajících se *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur je uveden na seznamu jako RNŠO v části J přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 v souvislosti s rozmnožovacím materiálem ovocných rostlin a ovocnými rostlinami určenými k produkci ovoce *Vaccinium* L., kromě pylu a osiva. Je proto nezbytné z důvodu konzistentnosti zařadit uvedený škodlivý organismus na seznam v příloze I prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o uvedený rod, aby byly uplatňovány příslušné požadavky čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 21 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 uvedené směrnice a aby byla zajištěna odpovídající úroveň fytosanitární ochrany.

(9) Fig mosaic agent byl odstraněn z části J přílohy IV prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, protože již nesplňuje podmínky pro uvedení na seznamu jako RNŠO. Je proto nezbytné uvedený škodlivý organismus odstranit z přílohy I prováděcí směrnice 2014/98/EU.

(10) Prováděcí směrnice 2014/98/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11) Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna prováděcí směrnice 2014/98/EU

Přílohy prováděcí směrnice 2014/98/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. července 2025. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Změna prováděcí směrnice 2014/98/EU

1) V příloze I se tabulka mění takto:

a) ve druhém sloupci „RNŠO“ se u druhu „*Ficus carica* L.“ zrušují položky „Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy“ a „Fig mosaic agent [FGM000]“;

b) ve druhém sloupci „RNŠO“ se u rodu „*Vaccinium* L.“ v kategorii „Houby a řasovky“ doplňuje nová položka, která zní „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]“.

2) V příloze II se tabulka nahrazuje tímto:

„Rod nebo druh	RNŠO
***Castanea sativa* Mill.**	**Houby a řasovky** *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle a *Poncirus* Raf.**	**Bakterie** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Houby a řasovky** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** *Citrus cristacortis* agent [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] *Citrus impietratura* agent [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* virus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (izoláty z EU) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]

„Rod nebo druh	RNŠO
***Fragaria* L.**	**Bakterie** *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR] **Houby a řasovky** *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] **Hlístice** *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry crinkle virus [SCRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0] Strawberry mottle virus [SMOV00] Strawberry vein banding virus [SVBV00] Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple dimple fruit viroid [ADFVD0] Apple flat limb agent [AFL000] Apple mosaic virus [APMV00] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple scar skin viroid [ASSVD0] Apple star crack agent [APHW00] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA] Poruchy na plodech: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod nebo druh	RNŠO
***Olea europaea* L.**	**Houby a řasovky** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus avium* L. a *Prunus cerasus* L.**	**Bakterie** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00]

„Rod nebo druh	RNŠO
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley a další druhy *Prunus* L., které může napadnout Plum pox virus v případě hybridů *Prunus* L.**	**Bakterie**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterie**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod nebo druh	RNŠO
***Pyrus* L.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple rubbery wood agent [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY] Pear bark necrosis agent [PRBN00] Pear bark split agent [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]
***Ribes* L.**	**Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Cucumber mosaic virus [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Houby a řasovky** *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Black raspberry necrosis virus [BRNV00] *Candidatus* Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU] Cucumber mosaic virus [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Raspberry ringspot virus [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] *Rubus* yellow net virus [RYNV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0] Tomato black ring virus [TBRV00] Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod nebo druh	RNŠO
***Vaccinium* L.**	**Houby a řasovky** *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA] **Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy** Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0] Blueberry red ringspot virus [BRRV00] Blueberry scorch virus [BLSCV0] Blueberry shock virus [BLSHV0] Blueberry shoestring virus [BSSV00] *Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB] Tobacco ringspot virus [TRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]“

3) Příloha IV se mění takto:

a) bod 8 se nahrazuje tímto:

„8. ***Malus* Mill.**

a) **Všechny kategorie**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

b) **Prvotní kategorie**

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se patnáct let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v patnáctiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 (*), platí následující požadavky týkající se organismů *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny.

c) **Základní kategorie**

Odběr vzorků a testování

V případě základních matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

V případě základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části základních matečných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a Tomato ringspot virus, chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Ze základních matečných rostlin se každých dvacet let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Tomato ringspot virus.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a veškeré hostitelské rostliny v okolí byly neprodleně odstraněny a zničeny;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny.

d) **Certifikovaná kategorie**

Odběr vzorků a testování

V případě certifikovaných matečných rostlin, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

V případě certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a Tomato ringspot virus, chorob působených virům podobnými organismy a viroidů – uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Z certifikovaných matečných rostlin se každých dvacet let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Tomato ringspot virus.

Z certifikovaných ovocných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny i veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a veškeré hostitelské rostliny v okolí byly neprodleně odstraněny a zničeny;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny.

e) **Kategorie CAC**

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období podrobeny prohlídce a veškerý rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* a veškeré okolní hostitelské rostliny byly neprodleně odstraněny a zničeny;

iii) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu ToRSV byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a dané rostliny s příznaky napadení byly neprodleně odstraněny a zničeny.

(*) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 (Úř. věst. L 140, 31.5.2017, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“;

b) bod 11 se nahrazuje tímto:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch a *Prunus salicina* Lindley**

a) **Prvotní kategorie**

Vizuální prohlídka

Dvakrát ročně se provádějí vizuální prohlídky s ohledem na organismy *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch a *Prunus salicina* Lindley). Jednou ročně se provádějí vizuální prohlídky s ohledem na všechny RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie – uvedených v přílohách I a II.

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. a *Prunus dulcis* (Miller) Webb se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus.

Prvotní podnože *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. se získávají z matečných rostlin, které byly za předchozí vegetační období otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus. Prvotní podnože *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. se získávají z matečných rostlin, které byly v předchozích pěti vegetačních obdobích otestovány a shledány prostými organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Z každé kvetoucí prvotní matečné rostliny se rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v ročních intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus. V případě *Prunus persica* se z každé kvetoucí prvotní matečné rostliny rok po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Peach latent mosaic viroid.

Z každého stromu pěstovaného záměrně za účelem opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus.

Z každé prvotní matečné rostliny se pět let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a Plum pox virus.

Z každé prvotní matečné rostliny se deset let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v desetiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismů Prune dwarf virus, Plum pox virus a *Prunus* necrotic ringspot virus – relevantních pro daný druh a uvedených v příloze II a v případě pochyb se otestují také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I. Z reprezentativní části prvotních matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb na výskyt organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

V případě, kdy je povolena odchylka k produkci prvotního materiálu na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/925, platí následující požadavky týkající se organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a Tomato ringspot virus:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost stanoviště produkce závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider v dotčené oblasti a na relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;

ii) Plum pox virus

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie na stanovišti produkce je nutno izolovat od ostatních hostitelských rostlin. Izolační vzdálenost stanoviště produkce závisí na regionální situaci, druhu rozmnožovacího materiálu, výskytu organismu Plum pox virus v dotčené oblasti a relevantních existujících rizicích stanovených příslušnými orgány na základě inspekce;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

b) **Základní kategorie, certifikovaná kategorie a kategorie CAC**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídka se provádí jednou ročně.

c) **Základní kategorie**

Odběr vzorků a testování

i) Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus a Plum pox virus. Z reprezentativní části základních matečných rostlin se každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části základních matečných rostlin mimo rostlin určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Plum pox virus tak, aby byly v desetiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin *Prunus domestica* L. určených k produkci podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb na výskyt organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých dvacet let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Tomato ringspot virus.

Z reprezentativní části základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých deset let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus a Tomato ringspot virus – uvedených v příloze II a v případě pochyb se otestují také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

— Kvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus.

V případě *Prunus persica* (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích základních matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Peach latent mosaic viroid.

Z reprezentativní části stromů pěstovaných záměrně pro opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus.

— Nekvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části nekvetoucích základních matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus a *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

d) **Certifikovaná kategorie**

Odběr vzorků a testování

i) Matečné rostliny, které byly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každých pět let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus a Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

ii) Matečné rostliny, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Plum pox virus tak, aby byly v patnáctiletém intervalu otestovány všechny rostliny.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin určených k produkci podnoží se každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Plum pox virus, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prostými tohoto RNŠO. Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. určených k produkci podnoží musí být v předchozích pěti vegetačních obdobích odebrány vzorky a otestovány na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, přičemž dotčené rostliny musí být shledány prostými tohoto RNŠO.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb na výskyt organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých dvacet let odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Tomato ringspot virus.

Z reprezentativní části certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každých patnáct let odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus, Plum pox virus a Tomato ringspot virus – uvedených v příloze II a v případě pochyb se otestují také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

— Kvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každý rok odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus. V případě *Prunus persica* (L.) Batsch se z reprezentativní části kvetoucích certifikovaných matečných rostlin na základě posouzení rizika infekce daných rostlin jednou ročně odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu Peach latent mosaic viroid.

Z reprezentativní části stromů pěstovaných záměrně pro opylování a případně z hlavních opylujících stromů v daném prostředí se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus.

— Nekvetoucí matečné rostliny

Z reprezentativní části nekvetoucích certifikovaných matečných rostlin, které nebyly uchovávány v zařízeních chráněných proti hmyzu, se na základě posouzení rizika infekce daných rostlin každé tři roky odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus a *Prunus* necrotic ringspot virus.

e) **Základní a certifikovaná kategorie**

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní a certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní a certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

f) **Kategorie CAC**

Odběr vzorků a testování

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byly za předchozí tři vegetační období odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus.

Podnože kategorie CAC *Prunus cerasifera* Ehrh. a *Prunus domestica* L. se získávají z identifikovaného zdroje materiálu, z jehož reprezentativní části byly v předchozích pěti letech odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a Plum pox virus.

Z reprezentativní části rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC se odeberou vzorky a otestují se v případě pochyb na výskyt organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Z reprezentativní části ovocných rostlin kategorie CAC nevykazujících při vizuální prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se na základě posouzení rizika infekce daných ovocných rostlin odeberou vzorky a otestují se na výskyt tohoto RNŠO, jakož i v případě rostlin s příznaky napadení v bezprostředním okolí.

Po zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC vykazujících příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider na stanovišti produkce při vizuální prohlídce se z reprezentativní části zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, odeberou vzorky a otestují se na výskyt organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – mimo organismů *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a Plum pox virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) Plum pox virus

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu Plum pox virus byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 1 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny a reprezentativní vzorek zbývajícího rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rozmnožovací materiál a ovocné rostliny s příznaky napadení, byl otestován a shledán prostým organismu Plum pox virus;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny;

iv) Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu ToRSV, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky napadení organismem ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu ToRSV byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a dané rostliny s příznaky napadení byly neprodleně odstraněny a zničeny;

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny nebo

— příznaky výskytu organismu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.“;

c) bod 14 se nahrazuje tímto:

„14. ***Rubus* L.**

a) **Prvotní kategorie**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se dva roky po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně ve dvouletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny prvotní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté virů uvedených v příloze II pro *Rubus* L., nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách prvotní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu kteréhokoli z RNŠO uvedených v příloze II pro *Rubus* L. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

b) **Základní kategorie**

Vizuální prohlídka

Pokud jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny pěstovány na poli nebo v nádobách, vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

V případě rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných mikrovegetativním množením a uchovávaných po dobu kratší než tři měsíce, je v daném období nezbytná jen jedna vizuální prohlídka.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – mimo organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus nebo Tomato ringspot virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny odstraní a neprodleně zničí.

ii) Požadavky na RNŠO mimo organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus:

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 0,1 % v případě:

Agrobacterium spp. Conn a

Rhodococcus fascians Tilford; a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

iii) Požadavky týkající se všech virů:

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté virů uvedených v příloze II pro *Rubus* L., nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu virů uvedených v příloze II pro *Rubus* L. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny nebo

— příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,25 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

c) **Certifikovaná kategorie**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – mimo organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) V případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie vykazujících příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus nebo Tomato ringspot virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny odstraní a neprodleně zničí.

ii) Požadavky na RNŠO mimo organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus:

Procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 0,5 % v případě *Resseliella theobaldi* Barnes,

— 0,1 % v případě:

Agrobacterium spp. Conn a

Rhodococcus fascians Tilford; a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny.

iii) Požadavky týkající se všech virů:

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté virů uvedených v příloze II pro *Rubus* L., nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu virů uvedených v příloze II pro *Rubus* L. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny nebo

— příznaky výskytu všech virů uvedených v přílohách I a II byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 0,5 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

d) **Kategorie CAC**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí, pokud jsou při vizuální prohlídce nejasné příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus. Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO – mimo organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus a Tomato ringspot virus – uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté RNŠO uvedených v přílohách I a II pro *Rubus* L., nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II pro *Rubus* L. a

— v případě příznaků výskytu organismu ToRSV byly tyto příznaky za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a dané rostliny s příznaky napadení byly neprodleně odstraněny a zničeny a

— v případě pozitivního výsledku testu rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC vykazujících příznaky výskytu organismů *Arabis* mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus nebo Tomato ringspot virus se příslušný rozmnožovací materiál a ovocné rostliny neprodleně odstraní a zničí.“;

d) bod 15 „*Vaccinium* L.“ se nahrazuje tímto:

„15. ***Vaccinium* L.**

a) **Prvotní kategorie**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Z každé prvotní matečné rostliny se pět let po její akceptaci jako prvotní matečné rostliny a následně v pětiletých intervalech odeberou vzorky a otestují se na výskyt RNŠO uvedených v příloze II a v případě pochyb také na výskyt RNŠO uvedených v příloze I.

b) **Základní kategorie**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí dvakrát ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Diaporthe vaccinii* Shear, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a *Godronia cassandrae* (anamorfa *Topospora myrtilli*) Peck

— procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin základní kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 0,1 % v případě *Godronia cassandrae* (anamorfa *Topospora myrtilli*) Peck,

— 0,5 % v případě *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny;

iv) *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách základní kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončený vegetační cyklus pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

v) Tobacco ringspot virus (TRSV) a Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů TRSV a ToRSV, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů TRSV a ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

c) **Certifikovaná kategorie a kategorie CAC**

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídky se provádějí jednou ročně.

Odběr vzorků a testování

Odběr vzorků a testování se provádí v případě pochyb ohledně výskytu RNŠO uvedených v přílohách I a II.

d) **Certifikovaná kategorie**

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin a *Godronia cassandrae* (anamorfa *Topospora myrtilli*) Peck

— procentní podíl rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin certifikované kategorie na stanovišti produkce za poslední ukončené vegetační období vykazujících příznaky výskytu následujících RNŠO nepřekročí:

— 0,5 % v případě:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,

Godronia cassandrae (anamorfa *Topospora myrtilli*) Peck,

— 1 % v případě *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; a daný rozmnožovací materiál a dané ovocné rostliny a veškeré okolní hostitelské rostliny byly odstraněny a zničeny;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu *Diaporthe vaccinii* Shear, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Diaporthe vaccinii* Shear;

iii) *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách certifikované kategorie na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončený vegetační cyklus pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny certifikované kategorie vykazující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na stanovišti produkce a veškeré rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení byly odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy,

a

— pro veškeré rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny z napadené partie platí, že:

— během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a

— po tomto tříměsíčním období:

— na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld nebo

— reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

a

— u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin na stanovišti produkce:

— na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld nebo

— reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

iv) Tobacco ringspot virus (TRSV) a Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny základní kategorie se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů TRSV a ToRSV, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů TRSV a ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly odstraněny a neprodleně zničeny.

e) **Kategorie CAC**

Požadavky na stanoviště produkce, místo produkce či oblast

i) *Phytophthora ramorum* (izoláty z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření nebo

— na rozmnožovacím materiálu a ovocných rostlinách kategorie CAC na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončený vegetační cyklus pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

nebo

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC vykazující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld na stanovišti produkce a veškeré rostliny v okruhu 2 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení byly odstraněny a zničeny, včetně ulpělé zeminy, a

— pro veškeré rostliny v okruhu 10 m od rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení a veškerý zbývající rozmnožovací materiál a ovocné rostliny z napadené partie platí, že:

— během tří měsíců od zjištění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin s příznaky napadení nebyly na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a během tohoto tříměsíčního období nebylo provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld a po tomto tříměsíčním období:

  — na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld nebo

  — reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld

a

— u veškerého ostatního rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin na stanovišti produkce:

  — na daném rozmnožovacím materiálu a daných ovocných rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld nebo

  — reprezentativní vzorek daného rozmnožovacího materiálu a daných ovocných rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu *Phytophthora ramorum* (izolátů z EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

ii) Tobacco ringspot virus (TRSV) a Tomato ringspot virus (ToRSV)

— rozmnožovací materiál a ovocné rostliny kategorie CAC se produkují v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismů TRSV a ToRSV, nebo

— na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů TRSV a ToRSV a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly neprodleně odstraněny a zničeny nebo

— příznaky výskytu organismů TRSV a ToRSV byly za poslední ukončené vegetační období pozorovány nejvýše u 2 % rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin kategorie CAC na stanovišti produkce a dané rostliny s příznaky napadení byly neprodleně odstraněny a zničeny."