2025/145

30.1.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2025/145 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιανουαρίου 2025

για την τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά ορισμένους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας, συγκεκριμένα τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού, τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur και τον παθογόνο παράγοντα του μωσαϊκού της συκιάς, καθώς και για τη διόρθωση της εν λόγω εκτελεστικής οδηγίας όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με το *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων ([1]), και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 6 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής ([2]) θεσπίζει κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας (στο εξής: ΡΕΟΜΚ). Επιπλέον, καθορίζει τις απαιτήσεις για την είσοδο και τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στην Ένωση, με στόχο την πρόληψη της εισόδου, της εγκατάστασης και της εξάπλωσης των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της Ένωσης.

(2) Η εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής ([3]) καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη ορισμένων οπωροφόρων δένδρων, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις.

(3) Η εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επικαιροποιηθεί το φυτοϋγειονομικό καθεστώς ορισμένων επιβλαβών οργανισμών και να τροποποιηθούν τα ειδικά μέτρα κατά των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Πράγματι, οι ΡΕΟΜΚ απαριθμούνται μαζί με τα σχετικά φυτά προς φύτευση στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, και τα αντίστοιχα μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας αυτών των ΡΕΟΜΚ στα εν λόγω φυτά προς φύτευση προβλέπονται στο παράρτημα V του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού. Ωστόσο, για τους ΡΕΟΜΚ οι οποίοι αφορούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, τα μέτρα αυτά προβλέπονται αποκλειστικά στην εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ.

(4) Ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού διαγράφηκε από τον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 και καταχωρίστηκε ως ΡΕΟΜΚ στο μέρος I του παραρτήματος IV του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, του γένους *Vaccinium* L., εκτός της γύρης και των σπόρων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταχωριστεί ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού στο παράρτημα II της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ, όσον αφορά το εν λόγω γένος, προκειμένου να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 4, του άρθρου 10 παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 21 παράγραφος 1 και του άρθρου 26 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας.

([1]) ΕΕ L 267 της 8.10.2008, σ. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2019, για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων δένδρων που αναφέρονται στο παράρτημα I, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L 298 της 16.10.2014, σ. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας διαγράφηκε από τον κατάλογο των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 και καταχωρίστηκε ως ΡΕΟΜΚ στο μέρος Ι του παραρτήματος IV του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, των γενών *Malus* Mill., *Prunus* L. και *Vaccinium* L., εκτός της γύρης και των σπόρων, και του γένους *Rubus* L., εκτός της γύρης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, για λόγους συνέπειας, να καταχωριστεί ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας στο παράρτημα ΙΙ της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ, όσον αφορά τα εν λόγω γένη, και προκειμένου να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 4, του άρθρου 10 παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 21 παράγραφος 1 και του άρθρου 26 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας.

(6) Επιπλέον, ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού και ο ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας θα πρέπει να υπόκεινται στα μέτρα του παραρτήματος IV της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαλλαγή των αντίστοιχων φυτών από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς για τις αντίστοιχες κατηγορίες.

(7) Στο σημείο 11 του παραρτήματος IV της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ, στα μέτρα που αφορούν το *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, στο στοιχείο «στ) Κατηγορία υλικού CAC», συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής ένα μέτρο κατά του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie και του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. Ως εκ τούτου, η εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ πρέπει να διορθωθεί με τη διαγραφή του εν λόγω μέτρου από τα μέτρα που αφορούν το *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) Το *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur καταχωρίστηκε ως ΡΕΟΜΚ στο μέρος Ι του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, του γένους *Vaccinium* L., εκτός της γύρης και των σπόρων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, για λόγους συνέπειας, να καταχωριστεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός στο παράρτημα Ι της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ, όσον αφορά το εν λόγω γένος, και προκειμένου να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1, του άρθρου 10 παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφος 1, του άρθρου 21 παράγραφος 1 και του άρθρου 26 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας.

(9) Ο παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς διαγράφηκε από το μέρος Ι του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, διότι δεν πληροί πλέον τους όρους για να καταχωριστεί ως ΡΕΟΜΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διαγραφεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός από το παράρτημα Ι της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ.

(10) Συνεπώς, η εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ

Τα παραρτήματα της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2025. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ

1. Στο παράρτημα Ι, ο πίνακας τροποποιείται ως εξής:

α) στη δεύτερη στήλη «ΡΕΟΜΚ», για το είδος «*Ficus carica* L.», διαγράφονται οι καταχωρίσεις «Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα» και «Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς [FGM000]»·

β) στη δεύτερη στήλη «ΡΕΟΜΚ» στην κατηγορία «Μύκητες και ωομύκητες», για το γένος «*Vaccinium* L.», προστίθεται η καταχώριση «*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]».

2. Στο παράρτημα ΙΙ, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής:

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
***Castanea sativa* Mill.**	**Μύκητες και ωομύκητες** *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle και *Poncirus* Raf.**	**Βακτήρια** *Spiroplasma citri* Saglio et al. [SPIRCI] **Μύκητες και ωομύκητες** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Παθογόνος παράγοντας της κριστάκορτης των εσπεριδοειδών [CSCC00] Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00] Παθογόνος παράγοντας της λιθίασης των εσπεριδοειδών [CSI000] Ιός της κηλίδωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών [CLBV00] Ιός της ψώρωσης των εσπεριδοειδών [CPSV00] Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (στελέχη απομονωθέντα στην ΕΕ) [CTV000] Ιός της ποικιλοχλώρωσης των εσπεριδοειδών [CVV000] Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000] Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00] Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00] Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00] Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00] Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0] Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00] Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
***Fragaria* L.**	**Βακτήρια**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Μύκητες και ωομύκητες
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Νηματώδεις
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα
	Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]
	Ιός της ρυτίδωσης της φράουλας [SCRV00]
	Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
	Ιός του ήπιου περιφερειακού κιτρινίσματος της φράουλας [SMYEV0]
	Ιός της ποικιλοχλώρωσης της φράουλας [SMOV00]
	Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00]
	Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα**
	Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα**
	Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]
	Ιοειδές των βοθρίων των μήλων [ADFVD0]
	Παθογόνος παράγοντας των επίπεδων κλάδων της μηλιάς [AFL000]
	Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
	Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000]
	Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων [ASSVD0]
	Παθογόνος παράγοντας των αστεροειδών ρωγμών των μήλων [APHW00]
	Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00]
	Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Αλλοιώσεις των καρπών: ατροφικοί καρποί [APCF00], πράσινοι ρυτιδωμένοι καρποί [APGC00], καρποί με εξογκώματα (Ben Davis), τραχύς φλοιός [APRSK0], αστεροειδείς ρωγμές, καστανέρυθροι δακτύλιοι [APLP00], καστανέρυθρα οζίδια
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
***Olea europaea* L.**	**Μύκητες και ωομύκητες** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00] Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Βακτήρια** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Βακτήρια** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000] Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000] Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
***Prunus avium* L. και *Prunus cerasus* L.**	**Βακτήρια** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] **Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα** Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0] Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00] Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Ιός της πράσινης δακτυλιωτής ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CGRMV0] Ιός του καρουλιάσματος των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
	Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CMLV00]
	Ιός της σκωριόχρου νεκρωτικής ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς [CRNRM0]
	Ιός 1 και 2 της μικροκαρπίας της κερασιάς [LCHV10], [LCHV20]
	Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]
	Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000]
	Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]
	Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
	Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley και άλλα είδη *Prunus* L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς στην περίπτωση των υβριδίων *Prunus* L.**	**Βακτήρια**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα
	Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]
	Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της μυροβαλάνου [MLRSV0]
	Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]
	Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000]
	Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Βακτήρια**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα
	Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]
	Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
	Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς [PLMVD0]
	Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]
	Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000]
	Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0] Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
***Pyrus* L.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα**
	Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]
	Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000]
	Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00]
	Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00]
	Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00]
	Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0]
	Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00]
	Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]
***Ribes* L.**	**Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα**
	Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]
	Ιός της αναστροφής του μαύρου φραγκοστάφυλου [BRAV00]
	Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000]
	Ιός σχετιζόμενος με την ταινίωση των νεύρων του πράσινου φραγκοστάφυλου [GOVB00]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]
	Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Μύκητες και ωομύκητες**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα
	Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]
	Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]
	Ιός της νέκρωσης του μαύρου σμέουρου [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
	Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000]
	Ιός του θαμνώδους νανισμού του σμέουρου [RBDV00]
	Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του σμέουρου [RLMV00]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]
	Ιός της χλώρωσης των νεύρων του σμέουρου [RVCV00]
	Κίτρινη κηλίδωση του σμέουρου [RYS000]
	Ιός του κίτρινου διχτυού της βατομουριάς [RYNV00]
	Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]
	Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

«Γένη ή είδη	ΡΕΟΜΚ
***Vaccinium* L.**	**Μύκητες και ωομύκητες**
	Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα
	Ιός σχετιζόμενος με το μωσαϊκό του μύρτιλου (γένος ophiovirus) [BLMAV0]
	Ιός της κόκκινης δακτυλιωτής κηλίδωσης του μύρτιλου [BRRV00]
	Ιός του εγκαύματος του μύρτιλου [BLSCV0]
	Ιός της καταπληξίας του μύρτιλου [BLSHV0]
	Ιός της νημάτωσης του μύρτιλου [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee et al. [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino et al. [PHYPSO]
	Φυτόπλασμα των ανώμαλων ανθέων του κράνμπερι/οξύκοκκου [PHYPFB]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSV0]
	Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]»

3. Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α) το σημείο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8. ***Malus* Mill.**

α) **'Ολες οι κατηγορίες**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

β) **Κατηγορία προβασικού υλικού**

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές δεκαπέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού και, εν συνεχεία, ανά δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, εκτός από τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα II, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής (*), ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, τον *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) **Κατηγορία βασικού υλικού**

Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση βασικών μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε τρία έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider· αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Τα βασικά μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) **Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού**

Δειγματοληψία και δοκιμές

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

Στην περίπτωση πιστοποιημένων μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε πέντε έτη σχετικά με την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider· αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider και εκτός από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, τις ασθένειες που είναι παρεμφερείς με τις ιογενείς και τα ιοειδή που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Τα πιστοποιημένα μητρικά φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη σχετικά με την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Τα πιστοποιημένα οπωροφόρα φυτά υποβάλλονται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως· ή

— παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής επιθεωρούνται κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ε) **Κατηγορία υλικού CAC**

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider·

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής έχουν επιθεωρηθεί κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλο το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., όπως και τυχόν φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

iii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

(*) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2017, για τη χορήγηση προσωρινής άδειας σε ορισμένα κράτη μέλη να πιστοποιούν προβασικό υλικό ορισμένων ειδών οπωροφόρων φυτών, τα οποία παράγονται σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/167 (ΕΕ L 140 της 31.5.2017, σ. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).»·

β) το σημείο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley**

α) **Κατηγορία προβασικού υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται δύο φορές ετησίως σε σχέση με τον *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch και *Prunus salicina* Lindley). Οπτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται ετησίως για όλους τους ΡΕΟΜΚ, εκτός από τον *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού των ειδών *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. και *Prunus dulcis* (Miller) Webb προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Τα προβασικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς. Τα προβασικά έρριζα υποκείμενα των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμές κατά τις προηγούμενες πέντε καλλιεργητικές περιόδους και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τον *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού και στη συνέχεια ανά διαστήματα ενός έτους. Στην περίπτωση του *Prunus persica*, κάθε προβασικό μητρικό φυτό σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία ένα έτος μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς.

Κάθε δένδρο που έχει φυτευτεί σκόπιμα για επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων.

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και στη συνέχεια ανά διαστήματα πέντε ετών, και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider και για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία δέκα έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε δέκα έτη, και υποβάλλεται και σε δοκιμές για τους ΡΕΟΜΚ, εκτός από τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων, που προσβάλλουν τα συγκεκριμένα είδη, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των προβασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

Σε περίπτωση που επιτρέπεται παρέκκλιση για την παραγωγή προβασικού υλικού σε αγρούς σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν την προστασία από έντομα, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/925 της Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τον *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, τον *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. και τον *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie και τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά-ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν επιθεώρησης·

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής είναι απομονωμένα από άλλα φυτά-ξενιστές. Η απόσταση απομόνωσης της μονάδας παραγωγής εξαρτάται από τις περιφερειακές συνθήκες, το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού, την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς στην οικεία περιοχή και τους σχετικούς κινδύνους, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν επιθεώρησης·

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

β) **Κατηγορίες βασικού υλικού, πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC**

Οπτική επιθεώρηση

Η οπτική επιθεώρηση πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.

γ) **Κατηγορία βασικού υλικού**

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δέκα χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών, εκτός εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων, υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δέκα ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών του *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων πρέπει να υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider και να έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε είκοσι έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα βασικών μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δέκα έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων, του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

— Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

— Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των βασικών μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές κάθε τρία χρόνια σχετικά με την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

δ) **Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού**

Δειγματοληψία και δοκιμές

i) Μητρικά φυτά που έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε πέντε έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, ώστε όλα τα φυτά να υποβληθούν σε δοκιμές εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε δεκαπέντε χρόνια και υποβάλλεται σε δοκιμές ως προς την παρουσία του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Μητρικά φυτά που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα φυτά να έχουν εξεταστεί εντός διαστήματος δεκαπέντε ετών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές σχετικά με την παρουσία του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών των γενών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων υποκειμένων έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις πέντε προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους όσον αφορά την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον εν λόγω ΡΕΟΜΚ.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε είκοσι έτη και σε δοκιμές βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα πιστοποιημένων μητρικών φυτών υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε δεκαπέντε έτη βάσει εκτίμησης του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς, του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και υποβάλλεται σε δοκιμές στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

— Μητρικά φυτά σε στάδιο ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για τον *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών. Στην περίπτωση του *Prunus persica* (L.) Batsch, αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών σε στάδιο ανθοφορίας υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε έτος και υποβάλλεται σε δοκιμές για το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των δένδρων που φυτεύονται με σκοπό την επικονίαση και, όπου είναι απαραίτητο, τα κύρια δένδρα επικονίασης στο περιβάλλον υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές για τον ιό του νανισμού της δαμασκηνιάς και τον ιό της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

— Μητρικά φυτά εκτός σταδίου ανθοφορίας

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των πιστοποιημένων μητρικών φυτών εκτός σταδίου ανθοφορίας που δεν έχουν διατηρηθεί σε εντομοστεγείς εγκαταστάσεις υποβάλλεται σε δειγματοληψία κάθε τρία έτη και υποβάλλεται σε δοκιμές για την παρουσία του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, του ιού του νανισμού της δαμασκηνιάς και του ιού της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων με βάση εκτίμηση κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών.

ε) **Κατηγορίες βασικού και πιστοποιημένου υλικού**

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider·

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς·

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά των κατηγοριών βασικού και πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

στ) **Κατηγορία υλικού CAC**

Δειγματοληψία και δοκιμές

Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τις τρεις προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Τα έρριζα υποκείμενα κατηγορίας υλικού CAC των ειδών *Prunus cerasifera* Ehrh. και *Prunus domestica* L. προέρχονται από αναγνωρισμένη πηγή υλικού, από την οποία αντιπροσωπευτικό τμήμα έχει υποβληθεί σε δειγματοληψία και δοκιμές κατά τα τελευταία 5 έτη και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider και τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

Αντιπροσωπευτικό τμήμα των οπωροφόρων φυτών CAC που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς κατά την οπτική επιθεώρηση υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές με βάση εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των οπωροφόρων φυτών αυτών όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω ΡΕΟΜΚ και στην περίπτωση ύπαρξης φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον.

Εάν εντοπιστεί πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider στη μονάδα παραγωγής μέσω οπτικής επιθεώρησης, αντιπροσωπευτικό τμήμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC των παρτίδων στις οποίες εντοπίστηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα υποβάλλεται σε δειγματοληψία και δοκιμές σχετικά με την παρουσία *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider και του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα του *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider·

ii) Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό δείγμα του εναπομείναντος ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά που εμφανίζουν συμπτώματα υποβλήθηκε σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένο από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς·

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV):

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.»·

γ) το σημείο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«14. ***Rubus* L.**

α) **Κατηγορία προβασικού υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές δύο έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε δύο έτη για την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας προβασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

β) **Κατηγορία βασικού υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά καλλιεργούνται στον αγρό ή σε δοχεία, πραγματοποιούνται οπτικές επιθεωρήσεις δύο φορές ανά έτος.

Για το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά που παράγονται από μικροπολλαπλασιασμό και διατηρούνται για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών, είναι αναγκαία μόνο μία οπτική επιθεώρηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.

ii) Απαιτήσεις για ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

— το 0,1 % στην περίπτωση:

των *Agrobacterium* spp. Conn· και

του *Rhodococcus fascians* Tilford· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν·

iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,25 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) **Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως·

ii) Απαιτήσεις για ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

Το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

— το 0,5 % στην περίπτωση του *Resseliella theobaldi* Barnes·

— το 0,1 % στην περίπτωση:

των *Agrobacterium* spp. Conn· και

του *Rhodococcus fascians* Tilford· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν·

iii) Απαιτήσεις για όλους τους ιούς:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ιούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— συμπτώματα όλων των ιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,5 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

δ) **Κατηγορία υλικού CAC**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον κατά την οπτική επιθεώρηση υπάρχει ασάφεια ως προς την παρουσία συμπτωμάτων του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας. Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ, πλην του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, οι οποίοι απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τους ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II για το γένος *Rubus* L.· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II για το γένος *Rubus* L. σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· και

— σε περίπτωση συμπτωμάτων του ToRSV, τα εν λόγω συμπτώματα παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· και

— σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής για πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού του μωσαϊκού της αραβίδας, του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου, του λανθάνοντος ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας, του ιού των μαύρων δακτυλίων της τομάτας και του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, το οικείο πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται αμέσως.»·

δ) το σημείο 15 «*Vaccinium* L.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15. ***Vaccinium* L.**

α) **Κατηγορία προβασικού υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Κάθε προβασικό μητρικό φυτό υποβάλλεται σε δειγματοληψία και σε δοκιμές πέντε έτη μετά την αποδοχή του ως προβασικού μητρικού φυτού, και μετέπειτα κάθε πέντε έτη για την παρουσία των ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα II και στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

β) **Κατηγορία βασικού υλικού**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου·

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck

— το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

— το 0,1 % στην περίπτωση του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck·

— το 0,5 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Wortonin· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

iv) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο.

v) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

γ) **Κατηγορίες πιστοποιημένου υλικού και υλικού CAC**

Οπτική επιθεώρηση

Οι οπτικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά έτος.

Δειγματοληψία και δοκιμές

Δειγματοληψία και δοκιμές διενεργούνται σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II.

δ) **Κατηγορία πιστοποιημένου υλικού**

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin και *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck

— το ποσοστό πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο το οποίο παρουσιάζει συμπτώματα καθενός από τους ακόλουθους ΡΕΟΜΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει:

— το 0,5 % στην περίπτωση:

του *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn·

του *Godronia cassandrae* (ανάμορφο στάδιο: *Topospora myrtilli*) Peck·

— το 1 % στην περίπτωση του *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Wortonin· και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα εν λόγω οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλα τα φυτά-ξενιστές γύρω από αυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν.

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από *Diaporthe vaccinii* Shear· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα του *Diaporthe vaccinii* Shear στη μονάδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου·

iii) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας πιστοποιημένου υλικού που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους·

και

— για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρο φυτό από την προσβεβλημένη παρτίδα:

— εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών οπωροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου δεν πραγματοποιούνται επεξεργασίες που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld· και

— μετά την εν λόγω τρίμηνη περίοδο:

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld·

και

— για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

iv) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας βασικού υλικού παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

ε) **Κατηγορία υλικού CAC**

Απαιτήσεις όσον αφορά τη μονάδα παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή

i) *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld σε πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC που παρουσιάζουν συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in't Veld στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά εκριζώνονται και καταστρέφονται, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλημένου εδάφους· και

— για όλα τα φυτά που βρίσκονται σε ακτίνα 10 m από συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά και κάθε εναπομένον πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρο φυτό από την προσβεβλημένη παρτίδα:

— εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και συμπτωματικών οπωροφόρων φυτών, δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου δεν πραγματοποιούνται επεξεργασίες που καταστέλλουν τα συμπτώματα του *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld· και μετά την εν λόγω τρίμηνη περίοδο:

  — δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή

  — αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld·

και

— για κάθε άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό και τα άλλα οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής:

  — δεν παρατηρούνται συμπτώματα *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής· ή

  — αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω πολλαπλασιαστικού υλικού και των εν λόγω οπωροφόρων φυτών προς διακίνηση έχει υποβληθεί σε δοκιμή και διαπιστώνεται ότι είναι απαλλαγμένο από *Phytophthora ramorum* (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ii) Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού (TRSV) και ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας (ToRSV)

— το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά της κατηγορίας υλικού CAC παράγονται σε περιοχές που είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον TRSV και τον ToRSV· ή

— δεν παρατηρούνται συμπτώματα TRSV ή ToRSV στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα στο άμεσο περιβάλλον εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

— παρατηρήθηκαν συμπτώματα του TRSV και του ToRSV σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών της κατηγορίας υλικού CAC στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και τα φυτά αυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.».