IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2025/145

z dne 29. januarja 2025

o spremembi Izvedbene direktive 2014/98/EU glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur in bolezni fig mosaic ter o popravku navedene izvedbene direktive glede ukrepov v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja ([1]), in zlasti člena 4, člena 6(4) in člena 13(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 ([2]) določa seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Poleg tega določa zahteve za vnos nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo in njihove premike po njej, da se preprečijo vstop navedenih škodljivih organizmov na ozemlje Unije ter njihova naselitev in širjenje na njenem ozemlju.

(2) Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU ([3]) določa posebne zahteve za rodove in vrste določenih sadnih rastlin, posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobne predpise za uradne preglede.

(3) Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo treba spremeniti, da se posodobi fitosanitarni status nekaterih škodljivih organizmov in spremenijo posebni ukrepi proti navedenim škodljivim organizmom. Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi so navedeni skupaj z zadevnimi rastlinami za saditev v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, ustrezni ukrepi za preprečevanje navzočnosti navedenih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na navedenih rastlinah za saditev pa so določeni v Prilogi V k navedeni izvedbeni uredbi. Vendar so za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme v zvezi z razmnoževalnim materialom sadja in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, taki ukrepi določeni izključno v Izvedbeni direktivi 2014/98/EU.

(4) Tobacco ringspot virus je bil črtan s seznama karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 in uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v delu J Priloge IV k navedeni uredbi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, *Vaccinium* L., razen cvetnega prahu in semen. Zato je treba v Prilogi II k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU za navedeni rod navesti Tobacco ringspot virus, da se lahko uporabijo ustrezne zahteve iz člena 9(2) in (4), člena 10(1), člena 16(1), člena 21(1) in člena 26(1) navedene direktive ter zagotovi ustrezna raven fitosanitarne zaščite.

([1]) UL L 267, 8.10.2008, str. 8; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/90/oj.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L 298, 16.10.2014, str. 22; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/98/oj).

(5) Tomato ringspot virus je bil črtan s seznama karantenskih škodljivih organizmov za Unijo v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 in uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v delu J Priloge IV k navedeni izvedbeni uredbi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, *Malus* Mill., *Prunus* L. ter *Vaccinium* L., razen cvetnega prahu in semen, ter *Rubus* L., razen cvetnega prahu. Zato je treba zaradi doslednosti v Prilogi II k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU za navedene rodove navesti Tomato ringspot virus, da se lahko uporabijo ustrezne zahteve iz člena 9(4), člena 10(1), člena 16(1), člena 21(1) in člena 26(1) navedene direktive ter zagotovi ustrezna raven fitosanitarne zaščite.

(6) Za Tobacco ringspot virus in Tomato ringspot virus bi morali nadalje veljati ukrepi iz Priloge IV k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU, da se zagotovi, da so zadevne rastline proste navedenih škodljivih organizmov za zadevne kategorije.

(7) V točki 11 Priloge IV k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU je bil ukrep proti *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie in *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. pomotoma vključen v oddelek „(f) Kategorija CAC“ v okviru ukrepov v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider. Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo zato treba popraviti, tako da se navedeni ukrep črta iz ukrepov v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(8) *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur je bil uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v delu J Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, *Vaccinium* L., razen cvetnega prahu in semen. Zato je treba zaradi doslednosti v Prilogi I k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU za navedeni rod navesti ta škodljivi organizem, da se lahko uporabijo ustrezne zahteve iz člena 9(1), člena 10(1), člena 16(1), člena 21(1) in člena 26(1) navedene direktive ter zagotovi ustrezna raven fitosanitarne zaščite.

(9) Bolezen fig mosaic je bila črtana iz dela J Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, ker ne izpolnjuje več pogojev za uvrstitev na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Zato je treba navedeni škodljivi organizem črtati iz Priloge I k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU.

(10) Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11) Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene direktive 2014/98/EU

Priloge k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU se spremenijo skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

1. Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. julija 2025. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga zajema ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. januarja 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Sprememba Izvedbene direktive 2014/98/EU

(1) V Prilogi I se razpredelnica spremeni:

(a) v drugem stolpcu „Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi“ se za vrsto „*Ficus carica* L.“ črtata vnosa „Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme“ ter „Bolezen fig mosaic [FGM000]“;

(b) v drugem stolpcu „Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi“ pod kategorijo „Glive in oomicete“ se za rod „*Vaccinium* L.“ doda vnos „*Pucciniastrum minimum* Sydow & P. Sydow [THEKMI]“;

(2) V Prilogi II se tabela nadomesti z naslednjim:

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
***Castanea sativa* Mill.**	**Glive in oomicete** *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
***Citrus* L., *Fortunella* Swingle in *Poncirus* Raf.**	**Bakterije** *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] **Glive in oomicete** *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] **Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Bolezen *Citrus cristacortis* [CSCC00] *Citrus exocortis* viroid [CEVD00] Bolezen *Citrus impietratura* [CSI000] *Citrus* leaf blotch virus [CLBV00] *Citrus psorosis* virus [CPSV00] *Citrus tristeza* virus (unijski izolati) [CTV000] *Citrus* variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]
***Corylus avellana* L.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Apple mosaic virus [APMV00]
***Cydonia oblonga* Mill.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Bolezen apple rubbery wood [ARW000] Apple stem grooving virus [ASGV00] Apple stem-pitting virus [ASPV00] Bolezen pear bark necrosis [PRBN00] Bolezen pear bark split [PRBS00] Pear blister canker viroid [PBCVD0] Bolezen pear rough bark [PRRB00] Bolezen quince yellow blotch [ARW000]

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
***Fragaria* L.**	**Bakterije**
	Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
	Glive in oomicete
	Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
	Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
	Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]
	Ogorčice
	Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
	Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
	Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
	Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
	Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
	Strawberry mottle virus [SMOV00]
	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
***Juglans regia* L.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme**
	Cherry leaf roll virus [CLRV00]
***Malus* Mill.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]
	Bolezen apple flat limb [AFL000]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Bolezen apple rubbery wood [ARW000]
	Apple scar skin viroid [ASSVD0]
	Bolezen apple star crack [APHW00]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA]
	Bolezni plodov: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
***Olea europaea* L.**	**Glive in oomicete** *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] **Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** *Arabis* mosaic virus [ARMV00] Cherry leaf roll virus [CLRV00] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Prunus dulcis* (Miller) Webb**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus armeniaca* L.**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] Apricot latent virus [ALV000] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Plum pox virus [PPV000] Prune dwarf virus [PDV000] *Prunus* necrotic ringspot virus [PNRSV0] Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus avium* L. in *Prunus cerasus* L.**	**Bakterije** *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] **Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme** Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0] Apple mosaic virus [APMV00] *Arabis* mosaic virus [ARMV00] *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0] Cherry leaf roll virus [CLRV00]

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
	Cherry mottle leaf virus [CMLV00]
	Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]
	Little cherry virus 1 in 2 [LCHV10], [LCHV20]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley in druge vrste *Prunus* L., občutljive za Plum pox virus v primeru hibridov *Prunus* L.**	**Bakterije**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]
***Prunus persica* (L.) Batsch**	**Bakterije**
	Xanthomonas arboricola pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR]
	Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Apricot latent virus [ALV000]
	Candidatus Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]
	Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
	Plum pox virus [PPV000]
	Prune dwarf virus [PDV000]
	Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0] Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
***Pyrus* L.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme**
	Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]
	Bolezen apple rubbery wood [ARW000]
	Apple stem grooving virus [ASGV00]
	Apple stem-pitting virus [ASPV00]
	Candidatus Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY]
	Bolezen pear bark necrosis [PRBN00]
	Bolezen pear bark split [PRBS00]
	Pear blister canker viroid [PBCVD0]
	Bolezen pear rough bark [PRRB00]
	Bolezen quince yellow blotch [ARW000]
***Ribes* L.**	**Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme**
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Blackcurrant reversion virus [BRAV00]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
***Rubus* L.**	**Glive in oomicete**
	Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
	Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme
	Apple mosaic virus [APMV00]
	Arabis mosaic virus [ARMV00]
	Black raspberry necrosis virus [BRNV00]
	Candidatus Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU]
	Cucumber mosaic virus [CMV000]
	Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]
	Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]
	Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
	Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]
	Raspberry yellow spot [RYS000]
	Rubus yellow net virus [RYNV00]
	Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
	Tomato black ring virus [TBRV00]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]

„Rod ali vrsta	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
***Vaccinium* L.**	**Glive in oomicete**
	Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
	Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme
	Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]
	Blueberry red ringspot virus [BRRV00]
	Blueberry scorch virus [BLSCV0]
	Blueberry shock virus [BLSHV0]
	Blueberry shoestring virus [BSSV00]
	Candidatus Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS]
	Candidatus Phytoplasma *pruni* [PHYPPN]
	Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO]
	Fitoplazma Cranberry false blossom [PHYPFB]
	Tobacco ringspot virus [TRSV0]
	Tomato ringspot virus [TORSV0]“

(3) Priloga IV se spremeni:

(a) točka 8 se nadomesti z naslednjim:

„8. ***Malus* Mill.**

(a) **Vse kategorije**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(b) **Pred-bazna kategorija**

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita petnajst let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih petnajst let.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 (*) dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* in Tomato ringspot virus uporabljajo naslednje zahteve:

(i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ali

— v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni;

(iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.

(c) **Bazna kategorija**

Vzorčenje in testiranje

V primeru baznih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

V primeru baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka tri leta opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, Tomato ringspot virusa ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje baznih matičnih rastlin na prisotnost Tomato ringspot virusa se opravi vsakih dvajset let.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ali

— v zadnji popolni rastni sezoni se pregledajo razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki kažejo simptome *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa se takoj izruvajo in uničijo;

(iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.

(d) **Certificirana kategorija**

Vzorčenje in testiranje

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider.

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih pet let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, Tomato ringspot virusa ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje certificiranih matičnih rastlin na prisotnost Tomato ringspot virusa se opravi vsakih dvajset let.

Vzorčenje in testiranje certificiranih sadnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa se izruvajo in takoj uničijo; ali

— v zadnji popolni rastni sezoni so simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider na enoti pridelave opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini se izruvajo in takoj uničijo, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da je prost *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., ali

— v zadnji popolni rastni sezoni se pregledajo razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki kažejo simptome *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa se takoj izruvajo in uničijo;

(iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.

(e) **Kategorija CAC**

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni in vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bile izruvane in takoj uničene, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider;

(ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, ali

— v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(iii) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

— simptomi ToRSV so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bile navedene simptomatične rastline takoj izruvane in uničene.

_____

(*) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/925 z dne 29. maja 2017 o začasnem dovoljenju nekaterim državam članicam za certificiranje predbaznega materiala nekaterih vrst sadnih rastlin, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/167 (UL L 140, 31.5.2017, str. 7; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj).“;

(b) točka 11 se nadomesti z naslednjim:

„11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch in *Prunus salicina* Lindley**

(a) **Pred-bazna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virusom, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* in *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch in *Prunus salicina* Lindley) se opravijo dvakrat letno. Za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz prilog I in II, razen *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virusa, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* in *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. in *Prunus dulcis* (Miller) Webb so pridobljeni iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnji rastni dobi in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s Plum pox virusom.

Pred-bazne podlage *Prunus cerasifera* Ehrh.in *Prunus domestica* L. so pridobljene iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnji rastni dobi in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s Plum pox virusom. Pred-bazne podlage *Prunus cerasifera* Ehrh. in *Prunus domestica* L. so pridobljene iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnjih petih rastnih sezonah in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Vzorčenje in testiranje vsake cvetoče pred-bazne matične rastline za Prune dwarf virus in *Prunus* necrotic ringspot virus se opravita eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsako leto. V primeru rastline *Prunus persica* se vzorčenje vsake cvetoče pred-bazne matične rastline opravi eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline, hkrati pa se opravi testiranje na Peach latent mosaic viroid.

Na vsakem drevesu, ki je zasajeno namenoma zaradi opraševanja, in, kadar je ustrezno, vseh glavnih opraševalnih drevesih v okolju se opravita vzorčenje in testiranje za Prune dwarf virus in *Prunus* necrotic ringspot virus.

Vzorčenje vsake pred-bazne matične rastline se opravi pet let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih pet let, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider in Plum pox virusa.

Vzorčenje vsake pred-bazne matične rastline se opravi deset let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih deset let, hkrati pa se opravi testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in za vrsto značilnih virusov iz Priloge II, razen Prune dwarf virusa, Plum pox virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa, ter v primeru dvoma testiranje na prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža pred-baznih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Plum pox virusom, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in Tomato ringspot virus uporabljajo naslednje zahteve:

(i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave so izolirane od drugih gostiteljskih rastlin. Izolacijska razdalja enote pridelave je odvisna od regionalnih okoliščin, vrste razmnoževalnega materiala, prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider na zadevnem območju ter povezanih tveganj, ki jih določijo pristojni organi na podlagi pregleda;

(ii) Plum pox virus:

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave so izolirane od drugih gostiteljskih rastlin. Izolacijska razdalja enote pridelave je odvisna od regionalnih okoliščin, vrste razmnoževalnega materiala, prisotnosti Plum pox virusa na zadevnem območju in povezanih tveganj, ki jih določijo pristojni organi na podlagi pregleda;

(iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene;

(v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* :

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.

(b) **Bazna in certificirana kategorija ter kategorija CAC**

Vizualni pregled

Vizualni pregled se opravi enkrat letno.

(c) **Bazna kategorija**

Vzorčenje in testiranje

(i) Matične rastline, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Prune dwarf virusa, *Prunus* necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa. Vzorčenje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravi vsakih deset let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(ii) Matične rastline, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin, razen tistih, namenjenih za pridelavo podlag, glede prisotnosti Plum pox virusa se opravita vsako leto, da se vse rastline testirajo v intervalu desetih let.

Vzorčenje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin, namenjenih za pridelavo podlag, se opravi vsako leto, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Plum pox virusa, pri čemer mora biti ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin *Prunus domestica* L., namenjenih za pridelavo podlag, glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider se morata opraviti v prejšnjih petih rastnih dobah, pri čemer mora biti ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Tomato ringspot virusa se opravita vsakih 20 let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa, *Prunus* necrotic ringspot virusa, Plum pox virusa in Tomato ringspot virusa, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih deset let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

— Cvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih baznih matičnih rastlin se opravi vsako leto, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

V primeru rastline *Prunus persica* (L.) Batsch se vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih baznih matičnih rastlin opravi enkrat letno, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti Peach latent mosaic viroida na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža dreves, zasajenih namenoma zaradi oprašitve, in, kadar je ustrezno, glavnih opraševalnih dreves v okolju glede prisotnosti Prune dwarf virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa se opravita na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

— Necvetoče matične rastline

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža necvetočih baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, glede prisotnosti Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider se opravita vsaka tri leta na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d) **Certificirana kategorija**

Vzorčenje in testiranje

(i) Matične rastline, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih pet let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Prune dwarf virusa, *Prunus* necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa, da se vse rastline testirajo v intervalu petnajstih let. Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih petnajst let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

(ii) Matične rastline, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Plum pox virusa, da se vse rastline testirajo v intervalu petnajstih let.

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin, namenjenih za pridelavo podlag, se opravi vsako leto, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Plum pox virusa, pri čemer mora biti ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom. Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin *Prunus cerasifera* Ehrh. in *Prunus domestica* L., namenjenih za pridelavo podlag, je bilo opravljeno v prejšnjih petih rastnih dobah, hkrati s testiranjem glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih 20 let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Tomato ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih 15 let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa, *Prunus* necrotic ringspot virusa, Plum pox virusa in Tomato ringspot virusa, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

— Cvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih certificiranih matičnih rastlin se opravi vsako leto, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin. V primeru rastline *Prunus persica* (L.) Batsch se vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih certificiranih matičnih rastlin opravi enkrat letno, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti Peach latent mosaic viroida na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža dreves, zasajenih namenoma zaradi oprašitve, in, kadar je ustrezno, glavnih opraševalnih dreves v okolju glede prisotnosti Prune dwarf virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa se opravita na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

— Necvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža necvetočih certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa in *Prunus* necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(e) **Bazna in certificirana kategorija**

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

(ii) Plum pox virus:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi Plum pox virusa so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Plum pox virusom;

(iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni;

(iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene;

(v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in nemudoma uničene, ali

— simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni.

(f) **Kategorija CAC**

Vzorčenje in testiranje

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC so pridobljeni iz prepoznanega vira materiala, katerega reprezentativni delež je bil vzorčen in testiran v prejšnjih treh rastnih dobah, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Plum pox virusom.

Podlage CAC rastlin *Prunus cerasifera* Ehrh. in *Prunus domestica* L. so pridobljene iz prepoznanega vira materiala, katerega reprezentativni delež je bil vzorčen in testiran v prejšnjih petih letih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni okužen s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider in Plum pox virusom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

Reprezentativni delež sadnih rastlin CAC, ki po vizualnem pregledu ne kažejo simptomov Plum pox virusa, se vzorči in testira glede prisotnosti navedenega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma in v primeru simptomatičnih rastlin v neposredni bližini na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih sadnih rastlin.

Po odkritju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki kažejo simptome *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, na enoti pridelave z vizualnim pregledom se opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, glede prisotnosti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider in Plum pox virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da niso okuženi s *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

(ii) Plum pox virus:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi Plum pox virusa so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da navedeni razmnoževalni material in sadne rastline niso okuženi s Plum pox virusom;

(iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni;

(iv) Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta ToRSV, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi ToRSV so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bile navedene simptomatične rastline takoj izruvane in uničene;

(v) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali

— simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni.“;

(c) točka 14 se nadomesti z naslednjim:

„14. ***Rubus* L.**

(a) **Pred-bazna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita dve leti po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsaki dve leti.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

— razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta virusov iz Priloge II za *Rubus* L., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi nobenega od nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II za *Rubus* L., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(b) **Bazna kategorija**

Vizualni pregled

Kadar se razmnoževalni material in sadne rastline gojijo na poljih ali v loncih, se vizualni pregledi opravijo dvakrat letno.

Pri razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se vzdržujejo manj kot tri mesece, je treba v tem času opraviti samo en vizualni pregled.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) V primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije, ki kažejo simptome *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa ali Tomato ringspot virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo.

(ii) Zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa:

delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

— 0,1 % pri:

Agrobacterium spp. Conn; ter

Rhodococcus fascians Tilford; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje rastline gostiteljice pa so bili izruvani in uničeni;

(iii) zahteve za vse viruse:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta virusov iz Priloge II za *Rubus* L., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi virusov iz Priloge II za *Rubus* L., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

— simptomi vseh virusov iz prilog I in II so opaženi pri največ 0,25 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni.

(c) **Certificirana kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) V primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, ki kažejo simptome *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa ali Tomato ringspot virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo.

(ii) Zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa:

delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti predelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

— 0,5 % pri *Resseliella theobaldi* Barnes;

— 0,1 % pri:

Agrobacterium spp. Conn; ter

Rhodococcus fascians Tilford; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje rastline gostiteljice pa so bili izruvani in uničeni;

(iii) zahteve za vse viruse:

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta virusov iz Priloge II za *Rubus* L., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi virusov iz Priloge II za *Rubus* L., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

— simptomi vseh virusov iz prilog I in II so bili opaženi pri največ 0,5 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni.

(d) **Kategorija CAC**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa in Tomato ringspot virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II za *Rubus* L., ali

— na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II za *Rubus* L., ter

— v primeru simptomov ToRSV, so ti bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bile navedene simptomatične rastline takoj izruvane in uničene, ter

— v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki kažejo simptome *Arabis* mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Tomato black ring virusa ali Tomato ringspot virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline takoj izruvajo in uničijo.“;

(d) točka 15 „*Vaccinium* L.“ se nadomesti z naslednjim:

„15. ***Vaccinium* L.**

(a) **Pred-bazna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita pet let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih pet let.

(b) **Bazna kategorija**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn:

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn;

(ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Diaporthe vaccinii* Shear, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi *Diaporthe vaccinii* Shear;

(iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin in *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck:

— delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

— 0,1 % pri *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 0,5 % pri *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje rastline gostiteljice pa so bili izruvani in uničeni;

(iv) *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

— na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

(v) Tobacco ringspot virus (TRSV) in Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta TRSV in ToRSV, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi TRSV in ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.

(c) **Certificirana kategorija in kategorija CAC**

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(d) **Certificirana kategorija**

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin in *Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck:

— delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti predelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

— 0,5 % pri:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn;

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck;

— 1 % pri *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje rastline gostiteljice pa so bili izruvani in uničeni;

(ii) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta *Diaporthe vaccinii* Shear, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi *Diaporthe vaccinii* Shear;

(iii) *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

— na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

ali

— razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije na enoti pridelave, ki kažejo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin se izruvajo in uničijo, vključno z zemljo, ki se jih drži,

ter

— za vse rastline, ki rastejo v polmeru 10 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ter ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline iz prizadete partije velja naslednje:

— v treh mesecih po odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld in v navedenem trimesečnem obdobju se ne izvede nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ter

— po navedenem trimesečnem obdobju:

— na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali

— se je reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

ter

— za ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline na enoti pridelave velja naslednje:

— na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali

— reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, se je testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

(iv) Tobacco ringspot virus (TRSV) in Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta TRSV in ToRSV, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi TRSV in ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.

(e) **Kategorija CAC**

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i) *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera so pristojni organi ugotovili, da so prosta *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe, ali

— na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

ali

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ki kažejo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin se izruvajo in uničijo, vključno z zemljo, ki se jih drži, ter

— za vse rastline, ki rastejo v polmeru 10 m od simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ter ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline iz prizadete partije velja naslednje:

— v treh mesecih po odkritju simptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld in v navedenem trimesečnem obdobju se ne izvede nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, po navedenem trimesečnem obdobju pa:

  — na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali

  — se je reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

ter

— za ves preostali razmnoževalni material in sadne rastline na enoti pridelave velja naslednje:

  — na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave niso opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali

  — reprezentativni vzorec navedenega razmnoževalnega materiala in navedenih sadnih rastlin, ki naj bi se premaknili, se je testiral, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld;

(ii) Tobacco ringspot virus (TRSV) in Tomato ringspot virus (ToRSV):

— razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta TRSV in ToRSV, ali

— na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso opaženi simptomi TRSV in ToRSV, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

— simptomi TRSV in ToRSV so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bile navedene simptomatične rastline takoj izruvane in uničene.".