Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1993. február 8.)

a Newcastle-betegség ellen a rutin vakcinázási programok során alkalmazandó oltóanyagokra vonatkozó szempontok megállapításáról

(93/152/EGK)

(HL L 59., 1993.3.12., 35. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 2010/633/EU határozata (2010. október 22.)	L 279	33	2010.10.23.

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1993. február 8.)

a Newcastle-betegség ellen a rutin vakcinázási programok során alkalmazandó oltóanyagokra vonatkozó szempontok megállapításáról

(93/152/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/65/EGK tanácsi irányelvvel [1] módosított, a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak III. mellékletére,

mivel a 90/539/EGK irányelv III. melléklete megállapítja, hogy a Bizottság meghatározhatja a baromfipestis elleni oltóanyagok rutin vakcinázási programokban való alkalmazásával kapcsolatos szempontokat;

mivel az említett szempontok biztosítják, hogy a rutin vakcinázási programokban alkalmazott élő attenuált és inaktivált oltóanyagok a bennük használt baromfipestis-vírustörzs vonatkozásában megfeleljenek az intracerebrális pathogenitási indexszel (ICPI) kapcsolatos bizonyos követelményeknek;

mivel kívánatosnak tűnik, hogy az oltóanyag előállítására alkalmazandó vírustörzs intracerebrális pathogenitási indexének szintjét egyértelműen meghatározzák;

mivel az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság és az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményét kikérték,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A rutin vakcinázási programok során történő felhasználásra:

a) az élő attenuált baromfipestis vakcinát olyan baromfipestis-vírustörzsből állítják elő, amely eredeti tenyészetét (master seed) megvizsgálták és megállapították, hogy az intracerebrális pathogenitási index (ICPI) értéke:

   i. 0,4 alatti, ha az ICPI-tesztben minden egyes madárnak legalább 10^7 EID_{50}-et adagolnak;

   vagy

   ii. 0,5 alatti, ha az ICPI-tesztben minden egyes madárnak legalább 10^8 EID_{50}-et adagolnak;

▼M1

_____

[1] HL L 268., 1992.9.14., 54. o.
[2] HL L 303., 1990.10.31., 6. o.

▼B

2. cikk

Ezt a határozatot 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.