PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/86

ze dne 20. ledna 2025,

kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2024/2189, pokud jde o souhrn vlastností biocidního přípravku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 22. dubna 2024 vyjádřil Stálý výbor pro biocidní přípravky (dále jen „výbor“) kladné stanovisko k návrhu aktu, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ClearKlens wipes based on IPA“, včetně jeho přílohy, v níž je uveden souhrn vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“).

(2) Dne 3. září 2024 bylo přijato a následně vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/2189 ([2]), kterým se uděluje povolení, avšak bez souhrnu vlastností přípravku.

(3) Prováděcí nařízení (EU) 2024/2189 by proto mělo být opraveno tak, aby zahrnovalo souhrn vlastností přípravku.

(4) V zájmu jasnosti a právní jistoty by uvedená oprava měla být provedena neprodleně a toto nařízení by se mělo použít se zpětnou působností, neboť podmínky týkající se dodávání jednotlivého biocidního přípravku „ClearKlens wipes based on IPA“ na trh a jeho používání jsou definovány v souhrnu vlastností přípravku.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky vydaným před přijetím prováděcího nařízení (EU) 2024/2189,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2024/2189 se jako příloha doplňuje znění uvedené v příloze tohoto nařízení.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/2189 ze dne 3. září 2024 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „ClearKlens wipes based on IPA“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L, 2024/2189, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2189/oj).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 24. září 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ BIOCIDNÍHO PŘÍPRAVKU

ClearKlens wipes based on IPA

Typ přípravku (typy přípravků)

PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

Číslo povolení: EU-0032009-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0032009-0000

Kapitola 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Obchodní název (názvy) přípravku**

Obchodní název (názvy)	ClearKlens IPA 70 % non sterile WW ClearKlens IPA 70 % v/v wipes ClearKlens IPA 70 % wipes ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile VH1 ClearKlens IPA 70 % wipes VH1 ClearKlens IPA 70 % WW ClearKlens IPA 70 % WW VH1 ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes VH1 ClearKlens IPA wipe ClearKlens IPA Wipes ClearKlens IPA WW Divodes IPA WW IPA 70 % v/v WW IPA 70 % wipes IPA 70 % WW IPA 70 % WW VH1 IPA wipes IPA WW Divodes IPA Wipes Soft Care IPA Desinfection Wipes TASKI Sprint IPA Wipes TASKI Sani IPA Wipes TASKI Jontec IPA Wipes TechniSat® DES TexVantage™ DES PolySat® DES AlphaSat™ DES ThermaSat DES TechniScrub™ DES HoneyComb® DES AlphaSat™ 10 DES ClearKlens IPA 70 % v/v WW Suma IPA Wipes Vectra Honeycomb 10 TechniSat DCO TechniSat MDC TexVantage DCO TexVantage MDC PolySat DCO PolySat MDC AlphaSat DCO AlphaSat MDC ThermaSat DCO ThermaSat MDC TechniScrub DCO

	TechniScrub MDC HoneyComb DCO HoneyComb MDC AlphaSat 10 DCO AlphaSat 10 MDC

1.2. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Číslo povolení		EU-0032009-0000
Číslo záznamu v registru R4BP		EU-0032009-0000
Datum udělení povolení		22. ledna 2025
Datum skončení platnosti povolení		31. prosince 2034

1.3. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa výrobce	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Polígono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španělsko Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itálie Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Spojené království Velké Británie a Severního Irska Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemsko Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden Německo

Jméno (název) výrobce	Flexible Medical Packaging Ltd
Adresa výrobce	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Umístění výrobních závodů	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Ardepharm
Adresa výrobce	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francie
Umístění výrobních závodů	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francie

Jméno (název) výrobce	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Adresa výrobce	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francie
Umístění výrobních závodů	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francie

Jméno (název) výrobce	Pluswipes Ltd
Adresa výrobce	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	ITW Contamination Control BV
Adresa výrobce	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	ITW Texwipe
Adresa výrobce	1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Spojené státy americké
Umístění výrobních závodů	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Spojené státy americké

Jméno (název) výrobce	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD

Adresa výrobce	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Čína
Umístění výrobních závodů	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Čína

1.4. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	INEOS Solvents Germany GmbH
Adresa výrobce	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Německo
Umístění výrobních závodů	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Německo INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers Německo

Účinná látka	propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Shell Chemicals Europe B.V.
Adresa výrobce	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemsko

Účinná látka	propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Exxon Mobil Chemicals
Adresa výrobce	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgie
Umístění výrobních závodů	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Spojené státy americké Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 1TX Hampshire Spojené státy americké

Účinná látka	propan-2-ol
Jméno (název) výrobce	Novapex
Adresa výrobce	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Francie
Umístění výrobních závodů	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Francie

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
propan-2-ol		účinná látka	67-63-0	200-661-7	63,1 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

XX – Namočené utěrky

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti	H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261: Zamezte vdechování par. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280: Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy. P405: Skladujte uzamčené.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití #1 PT02: Dezinfekční prostředek na tvrdé povrchy - profesionální uživatelé - Stírání

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Namočené utěrky připravené k použití (RTU) pro dezinfekci předem vyčištěných neporézních tvrdých povrchů v laboratořích, čistých prostorách a farmaceutických a kosmetických výrobních zařízení.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání použití RTU utěrek Podrobný popis: -
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Použijte X na 0,5 m^2. Kde X je 1 utěrka; pro utěrky o velikosti 20-46 cm × 38-68 cm 2 utěrky; pro utěrky o velikosti 15-31 cm × 20-31 cm 3 utěrky; pro utěrky o velikosti 15 cm x× 15 cm 4 utěrky; pro utěrky o velikosti 10 cm × 10 cm Ředění (%): K okamžitému použití Počet a načasování aplikace: Aplikujte dle výsledků v dezinfekčních protokolech až 20 krát denně Kontaktní doba: nechte působit minimálně 5 minut.
Kategorie uživatelů	průmysl; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Obal: Sáček s posuvným uzávěrem Polyethylentereftalát (PET)/Nízkohustotní polyethylen (LDPE) / Vysokohustotnní Polyethylen (HDPE) s KOEXovou bariérovou vrstvou Flexi sáček PET/LDPE/HDE s KOEXovou bariérovou vrstvou Kbelík – HDPE Dóza – HDPE Každé balení může obsahovat 5 až 500 utěrek, kbelík (HDPE) může obsahovat až 1 000 utěrek. Utěrky: 100 % polyester 100 % polypropylen 50/50 % polyester/celulóza nebo 45/55 % polyester/celulóza

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Důkladně vyčistěte a opláchněte povrch.

Před dezinfekcí odstraňte z povrchu přebytečnou vodu.

Na vzduchu přehněte utěrku na čtvrtiny

Stírejte jedním směrem překrývajícími se tahy.

Povrch zcela navlhčete. Nechte působit minimálně 5 minut.

Používejte jen vlhké utěrky. Po použití uzavřete obal. Ihned po aplikaci vložte použité utěrky do uzavřené nádoby a zlikvidujte je.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz Návod k použití.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití #2 PT02: Dezinfekční prostředek na tvrdé povrchy – profesionální uživatelé- stírání mopem

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	—
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Namočené utěrky připravené k použití (RTU) pro dezinfekci předem vyčištěných neporézních tvrdých povrchů v čistých prostorách a farmaceutických a kosmetických výrobních zařízení.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: stírání pomocí vlhkých RTU utěrek Podrobný popis: -

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Použijte X na 1 m^2. Kde X je 1 utěrka pro utěrky o velikosti 25-38 cm × 38-68 cm; 2 utěrky pro utěrky o velikosti 20-46 cm × 31-46 cm; 3 utěrky pro utěrky o velikosti 15-23 cm × 20-28 cm; Ředění (%): K okamžitému použití Počet a načasování aplikace: Aplikujte dle výsledků v dezinfekčních protokolech až 2 krát denně Kontaktní doba: nechte působit minimálně 5 minut.
Kategorie uživatelů	průmysl; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Obal: Sáček s posuvným uzávěrem Polyethylentereftalát (PET)/Nízkohustotní polyethylen (LDPE) / Vysokohustotnní Polyethylen (HDPE) s KOEXovou bariérovou vrstvou Flexi sáček PET/LDPE/HDE s KOEXovou bariérovou vrstvou Kbelík – HDPE Dóza – HDPE Každé balení může obsahovat 5 až 500 utěrek, kbelík (HDPE) může obsahovat až 1 000 utěrek. Utěrky: 100 % polyester 100 % polypropylen 50/50 % polyester/celulóza nebo 45/55 % polyester/celulóza

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Důkladně vyčistěte a opláchněte povrch.

Před dezinfekcí odstraňte z povrchu přebytečnou vodu.

Připevněte utěrku na mop.

Stírejte systematicky překrývajícími se tahy.

Povrch zcela navlhčete. Nechte působit minimálně 5 minut.

Používejte jen vlhké utěrky. Po použití uzavřete obal. Ihned po aplikaci vložte použité utěrky do uzavřené nádoby a zlikvidujte je.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz Návod k použití.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití #3 PT02: Dezinfekční prostředek na tvrdé povrchy – profesionální uživatelé – Stírání (zařízení a malé povrchy)

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Namočené utěrky připravené k použití (RTU) pro dezinfekci vybavení a malých neporézních tvrdých povrchů v zařízeních (včetně nemocnic, pečovatelských domů a lékařských ordinací)
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání použití RTU utěrek Podrobný popis: -
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Použijte X na 0,5 m^2. Kde X je 1 utěrka; pro utěrky o velikosti 20-46 cm x 38-68 cm 2 utěrky; pro utěrky o velikosti 15-31 cm x 20-31 cm 3 utěrky; pro utěrky o velikosti 15 cm x 15 cm 4 utěrky; pro utěrky o velikosti 10 cm x 10 cm Ředění (%): K okamžitému použití Počet a načasování aplikace: Aplikujte dle výsledků v dezinfekčních protokolech až 20 krát denně Kontaktní doba: nechte působit minimálně 5 minut.
Kategorie uživatelů	průmysl; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Obal: Sáček s posuvným uzávěrem Polyethylentereftalát (PET)/Nízkohustotní polyethylen (LDPE) / Vysokohustotnní Polyethylen (HDPE) s KOEXovou bariérovou vrstvou Flexi sáček PET/LDPE/HDE s KOEXovou bariérovou vrstvou Kbelík – HDPE Dóza – HDPE Každé balení může obsahovat 5 až 500 utěrek, kbelík (HDPE) může obsahovat až 1 000 utěrek.

	Utěrky: 100 % polyester 100 % polypropylen 50/50 % polyester/celulóza nebo 45/55 % polyester/celulóza

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Důkladně vyčistěte a opláchněte povrch.

Před dezinfekcí odstraňte z povrchu přebytečnou vodu.

Na vzduchu přehněte utěrku na čtvrtiny a stírejte jedním směrem překrývajícími se tahy.

Povrch zcela navlhčete. Nechte působit minimálně 5 minut.

Používejte jen vlhké utěrky. Po použití uzavřete obal. Ihned po aplikaci vložte použité utěrky do uzavřené nádoby a zlikvidujte je.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz Návod k použití.

Chraňte děti dokud ošetřené povrchy neoschnou.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz Návod k použití.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ** [1]

5.1. **Návod k použití**

Viz návod k použití pro konkrétní aplikaci.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Prostředek se může používat jen v dostatečně větraném prostoru. Minimální požadovaná výměna vzduchu je:

— 8/h v laboratořích

— 60/h ve farmaceutických a kosmetických výrobních provozech

— 20/h v čistých prostorech

— 1,5/h v ostatních oblastech (včetně nemocnic, pečovatelských domů a lékařských praxí)

[1] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

Během manipulace s prostředkem používejte ochranné chemicky odolné rukavice v souladu s evropskou normou EN 374 nebo ekvivalent (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o prostředku). Tím není dotčeno použití směrnice Rady 98/24/ES ([2]) a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné reference naleznete v části 6.

Zabraňte kontaktu s očima.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Vdechnutí: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zasažení očí: Způsobuje silné podráždění

PŘI VDECHNUTÍ: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Pokožku omyjte vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování alespoň 5 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Opatření na ochranu životního prostředí:

Neměl by se vypouštět do půdy, vodních toků, potrubí a kanalizace.

Zabraňte uvolnění do kanalizačního systému.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění.

Posypte inertním materiálem např. pískem, štěrkem, pilinami, univerzálním absorbentem.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Prostředek a obal je nutno bezpečně zlikvidovat v souladu se všemi příslušnými zákony o likvidaci nebezpečného odpadu. Proveďte likvidaci nebo spálení v souladu s místními legislativou a požadavky.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelné po dobu 24 měsíců

Uchovávejte pouze v původním balení.

Skladujte mimo přímé sluneční záření při teplotě do 40 °C.

Skladujte v uzavřeném obalu.

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Koncentrace účinné látky vyjádřená v objemových procentech je 70 % v/v.

Celé názvy odkazů v části 5.2 „Opatření ke zmírnění rizik“ jsou: EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům.

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

([2]) Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).