Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2012 m. geguzis 1 d. iki 2012 m. geguzis 31 d.

(Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB [1] *34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB* [2] 38 straipsnį*)*

(2012/C 190/02)

— **Nacionalinio rinkodaros leidimo suteikimas, atnaujinimas arba pakeitimas**

Sprendimo data	Vaisto pavadinimas (-ai)	Rinkodaros leidimo turėtojas (-ai)	Susijusi valstybė narė	Pranešimo data
7.5.2012	Vivaglobin and associated names	Žr. Priedą I	Žr. Priedą I	8.5.2012
22.5.2012	Femara and associated names	Žr. Priedą II	Žr. Priedą II	23.5.2012
25.5.2012	Priorix and associated names	Žr. Priedą III	Žr. Priedą III	30.5.2012
25.5.2012	Prontax 5 Mg/ml	Žr. Priedą IV	Žr. Priedą IV	30.5.2012
25.5.2012	Prontax 10 Mg/ml	Žr. Priedą V	Žr. Priedą V	29.5.2012

[1] OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
[2] OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

I PRIEDAS

VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMŲ, VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Straße 76 35041 Marburg an der Lahn Germany	Vivaglobin 160 mg/ml Injektionslösung (subkutane Anwendung)	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Belgija	CSL Behring GMBH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Danija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Suomija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Prancūzija	CSL BEHRING SA – PARIS 44 rue Cambronne 75015 Paris, France	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Vokietija	CSL Behring GmbH, Emil von Behring Strasse 76, 35041 Marburg	Vivaglobin	tirpalas injekcijoms, 160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Graikija	CSL BEHRING ΜΕΠΕ XATZHGIANNI MEKSI 5 ATHENS 11528	VIVAGLOBIN	16 % (W/V) [150-170 MG]	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Vengrija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-str. 76. 35041 Marburg Germany	Vivaglobin 160 mg/ml oldatos injekció szubkután alkalmazásra	160 mg/ml tirpalas injekcijoms (švirkšti po oda)	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	CSL BEHRING GmbH Emil von Behring Str 76 D-35041 Marburg-Germany	VIVAGLOBIN	160 MG/ML	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Liuksemburgas	CSL BEHRING GMBH 76 EMIL-VON-BEHRING-STRASSE D 35041 MARBURG	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Nyderlandai	CSL Behring GmbH, Emil v. Behring Str. 76, 35041 Marburg, Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Norvegija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Lenkija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Portugalija	CSL Behring GmbH Emil-von-Behring Strasse, 76 D-35041 Marburg Germany	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Ispanija	CSL BEHRING, GMBH Emil von Bhering Strasse, 76 35041 Marburg, Germany	VIVAGLOBIN 160 mg/ml para inyección (uso subcutáneo)	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda
Švedija	CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, Tyskland	Vivaglobin	160 mg/ml	tirpalas injekcijoms	švirkšti po oda

II PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMU, VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISIŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Novartis Pharma GmbH Stella-Klein Loew-Weg 17 1020 Vienna Austria	Femara 2,5 mg – Filmtabletten	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Novartis Pharma N.V. Medialaan, 40 bus 1, 1800 Vilvoorde Belgium	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nuernberg Germany	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Novartis Pharmaceuticals UK Limited Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR United Kingdom	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Novartis s.r.o., Gemini, budova B Na Pankráci 1724/129 140 00 Prague 4 Czech Republic	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172, 2100 København Ø Denmark	Femar	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Estija	Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 02130 Espoo Finland	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10 02130 Espoo Finland	Femar	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Novartis Pharma S.A.S. 2 & 4, rue Lionel Terray, 92500 Rueil Malmaison Cédex France	Fémara 2,5 mg comprimé pelliculé	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg Germany	Femara 2,5 mg Filmtabletten	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Novartis (Hellas) S.A.C.I. 12 km of National Road Athens, Lamia Nº 1, 14451 Metamorphosis, Athens Greece	FEMARA	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Novartis Hungária Kft. Pharma 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47 Hungary	Femara 2,5 mg filmtabletta	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej 172, 2100 København Ø Denmark	Femar	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Airija	Novartis Pharmaceuticals UK Limited Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR United Kingdom	Femara 2,5 mg Film-coated Tablets	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Italija	Novartis Europharm Ltd Wimblehurst Road RH12 5 Ab - Horsham (West Sussex) United Kingdom	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo Finland	Femara 2,5 mg apvalkotās tabletes	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Novartis Finland Oy Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo Finland	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg, Germany	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Malta	Novartis Pharmaceuticals UK Limited Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR United Kingdom	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Novartis Pharma B.V. Raapopseweg 1, 6824 DP Arnhem The Netherlands	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Novartis Norge AS Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo Norway	Femar	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg, Germany	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A. Rua do Centro Empresarial, Edif. 8, Quinta da Beloura 2710-444 Sintra Portugal	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg, Germany	Femara 2,5 mg comprimate filmate	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Novartis, s.r.o. Gemini, budova B Na Pankráci 1724,/129 14000 Prague 4, Czech Republic	Femara	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 90429 Nürnberg, Germany	Femara 2,5 mg filmsko obložene tablete	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios Padró, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, N^{o} 764 08013 Barcelona Spain	Loxifan 2,5 mg comprimidos recubiertos con película	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
	Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, N^{o} 764 08013 Barcelona Spain	Femara 2,5 mg comprimidos recubiertos con película	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Švedija	Novartis Sverige AB Kemistvägen 1B, Box 1150, 18311 Täby, Sweden	Femar	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Novartis Pharmaceuticals UK Limited Trading as Ciba Laboratories Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR United Kingdom	Femara 2,5 mg Tablets	2,5 mg	plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

III PRIEDAS

VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, RINKODAROS TEISIŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas (*)	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert Schweitzer-Gasse 6 A-1140 Wien Austria	Priorix		Milteliai buteliukuose ir tirpiklis užpildytuose švirkštuose injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Belgija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Bulgarija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda Leisti į raumenis
Kipras	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Čekijos Respublika	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Estija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas (*)	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	Priorix powder and solvent for solution for injection in a pre-filled syringe Measles, mumps, and rubella vaccine (live)		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 D-80339 München Germany	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Graikija	GlaxoSmithKline AEBE 266 Kifisias avenue 152 32 Halandri Greece	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Islandija	GlaxoSmithKline ehf. Thverholt 14 105 Reykjavik Iceland	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas (*)	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112, Vilnius Lithuania	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Malta	SmithKline Beecham plc Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS Trading as GlaxoSmithKline UK Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Nyderlandai	GlaxoSmithKline BV Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist The Netherlands	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Norvegija	GlaxoSmithKline AS Forskningsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Lenkija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Portugalija	Smith Kline & French Portuguesa, Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque – Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas (*)	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Slovakijos Respublika	GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart Belgium	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Slovėnija	GSK d.o.o., Ljubljana, Knezov štradon 90, 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. C/Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) Spain	Priorix polvo y disolvente en jeringa precargada para solución inyectable		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Švedija	GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna Sweden	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis
Jungtinė Karalystė	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS United Kingdom Trading as GlaxoSmithKline UK Stockley Park West Uxbridge Middlesex UB11 1BT United Kingdom	Priorix		Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda Leisti į raumenis

(*) Stiprumas taikomas visose šalyse

Vienoje ištirpintos vakcinos (0,5 ml) dozėje yra:

Gyvo susilpninto tymų viruso (Schwarz padermės)	ne mažiau kaip $10^{3,0}$ $CCID_{50}$[3]
Gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvesto iš Jeryl Lynn padermės)	ne mažiau kaip $10^{3,7}$ $CCID_{50}$[3]
Gyvo susilpninto raudonukės viruso (Wistar RA 27/3 padermės)	ne mažiau kaip $10^{3,0}$ $CCID_{50}$[3]

IV PRIEDAS

VETERINARINIŲ VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTO FORMŲ, STIPRUMŲ, GYVŪNŲ RŪŠIŲ, IŠLAUKŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ SĄRAŠAS ŠALYSE NARĖSE

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprumas	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Austrija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Bulgarija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Danija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Ispanija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Suomija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Prancūzija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprumas	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Vengrija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Airija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Islandija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Nyderlandai	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Norvegija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Lenkija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Portugalija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Rumunija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Švedija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.
Slovėnija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė Karalystė	Prontax 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Užlašinamasis tirpalas	Doramectin 5 mg/ml	Galvijai	vietiškai, lašinti ant gyvulio nugaros	1 ml 10 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 35 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi.

V PRIEDAS

VETERINARINIŲ VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTO FORMŲ, STIPRUMŲ, GYVŪNŲ RŪŠIŲ, IŠLAUKŲ, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ SĄRAŠAS ŠALYSE NARĖSE

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Austrija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Bulgarija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Kipras	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Čekijos Respublika	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Danija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Estija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Graikija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Ispanija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Suomija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Prancūzija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Vengrija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Airija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Islandija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Latvija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Lietuva	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Malta	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Nyderlandai	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Norvegija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Lenkija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Portugalija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Rumunija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.

Šalis narė ES/EEE	Rinkodaros teisės	Pavadinimas	Vaisto forma	INN/Stiprums	Gyvūnų rūšys	Naudojimo būdas	Rekomenduojamos Dozės	Išlauka
Švedija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Slovėnija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.
Slovakija	Pfizer Limited Veterinary Medical Research & Development Sandwich Kent CT13 9NJ Jungtinė karalystė	Prontax 10 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Injekcinis tirpalas	Doramectin 10 mg/ml	Galvijai, avys ir kiaulės	Galvijams – po oda; Avims ir kiaulėms – į raumenis	Galvijams ir avims – 1 ml 50 kg kūno svorio Kiaulėms – 1 ml 33 kg kūno svorio	**GALVIJAI:** Galvijienai ir subproduktams – 54 paros. Pienui: Negalima naudoti karvėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms karvėms užtrūkimo metu bei veršingoms telyčioms, likus mažiau kaip 60 d. iki veršiavimosi. **AVYS:** Avienai ir subproduktams– 70 parų. Pienui: Negalima naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui. Negalima naudoti melžiamoms avims užtrūkimo metu bei ėringoms avims, likus mažiau kaip 70 d. iki ėriavimosi. **KIAULĖS:** Kiaulienai ir subproduktams – 56 paros.