РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/403 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2019 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Deosan Activate BPF based on Iodine“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) На 7 юли 2015 г. Diversey Europe Operations B.V. подаде заявление по член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за разрешаване на употребата на група биоциди „Deosan Activate BPF based on Iodine“ („групата продукти“) от продуктов тип 3 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент. Компетентният орган на Обединеното кралство се съгласи да направи оценка на заявлението съгласно предвиденото в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-JN018376-30.

(2) Групата биоциди съдържа йод като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества. Предвид характерните свойства на активното вещество и установените в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система ([2]), Комисията ще прецени дали е необходимо да се преразгледа одобрението на йода, включително на поливинилпиролидон-йода, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 528/2012. След това, в зависимост от резултата от това преразглеждане, Комисията ще прецени дали разрешенията на Съюза за употреба на продукти, съдържащи активното вещество, трябва да бъдат преразгледани в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3) На 20 декември 2017 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклада за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4) На 6 юли 2018 г. Агенцията представи пред Комисията становище ([3]), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групата продукти и окончателния доклад за оценката на групата продукти, в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012. В становището се стига до заключението, че групата продукти попада в обхвата на определението за „група биоциди“ в член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(5) На 17 септември 2018 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което счита, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 301, 17.11.2017 г., стр. 1).

([3]) Становище на ECHA от 6 юли 2018 г. относно разрешение на Съюза за „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (ECHA/BPC/207/2018).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Diversey Europe Operations B.V. се предоставя разрешение на Съюза EU-0019228-0000 за групата биоциди „Deosan Activate BPF based on Iodine“.

Разрешението на Съюза е валидно от 3 април 2019 г. до 31 март 2029 г.

Разрешението на Съюза е обвързано със спазването на изложеното в приложението обобщение на характеристиките на биоцидите.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Deosan Activate BPF based on Iodine

Вид продукт 3 — Ветеринарна хигиена (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0019228-0000

Номер на актив R4BP: EU-0019228-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Наименование на групата**

Наименование	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Diversey Europe Operations B.V.
	Адрес	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Netherlands
Номер на разрешението	EU-0019228-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0019228-0000	
Дата на издаване на разрешението	3 април 2019 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31 март 2029 г.	

1.4. **Производител(и) на биоцидите**

Име на производителя	Diversey Europe Operations B.V.
Адрес на производителя	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Холандия
Местонахождение на производствените обекти	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Италия Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Испания Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Холандия Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Великобритания Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Йод
Име на производителя	ACF Minera S.A.
Адрес на производителя	San Martin № 499, 1100000 Iquique Чили
Местонахождение на производствените обекти	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Чили

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Адрес на производителя	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Чили

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Cosayach Nitratos S.A.
Адрес на производителя	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Чили

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Адрес на производителя	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Япония
Местонахождение на производствените обекти	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Япония

Активно вещество	Йод
Име на производителя	ISE Chemicals Corporation
Адрес на производителя	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Япония
Местонахождение на производствените обекти	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Япония

Активно вещество	Йод
Име на производителя	Atacama Minerals SCM
Адрес на производителя	Coronel Pereira № 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Чили
Местонахождение на производствените обекти	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Чили

2. СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. **Вид(ове) формулация**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност SL - Разтворим концентрат GW - Водоразтворим гел

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — META SPC

META SPC 1

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 1

1.1. **Идентификатор на мета SPC 1**

Идентификатор	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА META SPC 1

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 1**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА META SPC 1

Категория на опасност	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се избягва изпускане в околната среда. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1. **Описание за използване**

Таблица 1. Употреба # 1 – Дезинфекция преди доене, ръчно потапяне (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	бактерия Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни. Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством ръчно потапяне
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди доене, за животно, за ден Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти съдържащи 1,5 % йод това може да бъде: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно потапяне.

3 приложения преди доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2. **Описание за използване**

Таблица 2. Употреба # 2 – Дезинфекция преди доене, ръчно разпенване (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерия Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни. Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством метода на ръчно разпенване
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди доене, за животно, за ден Използвайте максимум 5 мл/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно разпенване.

3 приложения преди доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3. **Описание за използване**

Таблица 3. Употреба # 3 – Дезинфекция преди доене, ръчно пръскане (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерия Yeas
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством метода на ръчно пръскане.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод, разредете 1,5 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди доене, за животно, за ден Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно пръскане.

3 приложения преди доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, когато използвате продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в частта за информация за продукта)

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4. **Описание за използване**

Таблица 4. Употреба # 4 – Дезинфекция след доене, ръчно потапяне (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Bacteria Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: - Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения след доене, за животно, за ден Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

3 приложения след доене, за животно, за ден (общо 5 приложения)

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5. **Описание за използване**

Таблица 5. Употреба # 5 –Дезинфекция след доене, ръчно разпенване (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерия Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно разпенване.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения след доене, за животно, за ден Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

3 приложения след доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6. **Описание за използване**

Таблица 6. Употреба # 6 –Дезинфекция след доене, ръчно пръскане (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерия Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно пръскане.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения след доене, за животно, за ден Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

3 приложения след доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при използването на продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в частта за информацията за продукта)

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7. **Описание за използване**

Таблица 7. Употреба # 7 –Дезинфекция след доене, Автоматично пръскане (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерия Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Автоматично пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с автоматично пръскане.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 5 приложения след доене, за животно, за ден. Да не се комбинира с дезинфекция преди доене. Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с автоматично пръскане.

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

5 приложения след доене, за животно, за ден. Да не се комбинира с дезинфекция преди доене на базата на йод.

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8. **Описание за използване**

Таблица 8. Употреба # 8 – Дезинфекция след доене, Полуавтоматично потапяне (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	бактерии Няма данни Мая Мая Няма данни
Област на употреба	На закрито Виж раздел 5 – Общи указания за употреба
Метод(и) на прилагане	Полуавтоматично потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения след доене, за животно, за ден Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

3 приложения след доене, за животно, за ден

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9. **Описание за използване**

Таблица 9. Употреба # 9 – Дезинфекция преди и след доене, ръчно потапяне (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	бактерии Няма данни Мая Мая Няма данни
Област на употреба	На закрито На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно потапяне
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения) Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Прилагайте директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения)

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10. **Описание за използване**

Таблица 10. Употреба # 10 – Дезинфекция преди и след доене, Ръчно разпенване (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Няма данни Мая Мая Няма данни
Област на употреба	На закрито На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно разпенване
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения) Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Приложете директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения)

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11. **Описание за използване**

Таблица 11. Употреба # 11 – Дезинфекция преди и след доене, Ръчно пръскане (концентрат)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно пръскане.
Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения) Използвайте максимум 15 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

За продукти, съдържащи 1,5 % йод: Разредете 1 част от продукта с 4 части вода за постигане на 0,3 % работна концентрация на йод. За продукти с друга концентрация тази инструкция трябва да се адаптира.

Приложете директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения)

Използвайте максимум 15 мл от продукта/животно/приложение

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

При употреба на продукта, носете подходящи защитни обувки (EN 13832).

Да се носи защитен работен комбинезон (най-малко тип 6, EN 13034)

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [1] НА МЕТА SPC 1

5.1. **Инструкции за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да бъде подгрят до температура > 20 °C

Преди доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето.

За ефективно използване срещу бактерии и дрожди, продуктът трябва да бъде оставен в контакт с кожата за най-малко 30 секунди.

След подходящото време за контакт, отстранете напълно продукта, като използвате стерилна хартиена кърпа/тъкан, за да гарантирате чисти и сухи цицки.

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

След доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето, непосредствено след издояване.

За осигуряване на достатъчно време за контакт е необходимо да се вземат меркии, продуктът да не бъде отстранен след прилагането му (напр. кравите да се поддържат изправени най-малко 5 минути)

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Този продукт може да се използва в комбинация за дезинфекция преди и след издояване (може да се прилага върху дадено животно до общо 5 пъти дневно). Той обаче не трябва да се използва в комбинация с друг продукт на йодна основа.

За пълнене на продукта, в оборудването за неговото прилагане, се препоръчва да се използва дозираща помпа.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Вдишване: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с кожата: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с очите: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Поглъщане: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба

След вдишване: Да се подава свеж въздух; в случай на възникване на симптоми се консултирайте с лекар.

След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и щателно изплакнете.

След контакт с очите: Изплакнете отвореното око в продължение на няколко минути с течаща вода (най-малко 15 минути).

След поглъщане: Изплакнете устата, след което пийте много вода. Незабавно повикайте лекар.

При необходимост от медицински съвет, е необходимо да разполагате под ръка с контейнера или етикета на продукта

Стабилност и реактивност:

Реактивност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Химична стабилност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Възможни опасни реакции: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасни реакции.

Условия което трябва да се избягват: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

[1] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.

Опасни продукти на разлагането: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

Мерки за опазване на околната среда:

Оградете с насип за събиране на големи разливи от течност.

Съберете и/или абсорбирайте разлива с инертен материал, след което го поставете в подходящ контейнер.

Предотвратете попадане на оттока в канализацията, изпускателни канали или водни пътища.

Събирайте в затворени и подходящи контейнери за изхвърляне.

Не връщайте разлети материали обратно в оригиналния контейнер.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Преди да бъдат изхвърлени, изпразнените контейнери трябва да бъдат трикратно изплакнати

Хартиените кърпи, използвани за подсушаване на виметата на животните и отстраняване на продукта от тях, трябва да бъдат изхвърляни като нормален битов отпадък.

Не изпускайте неразреден продукт в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява само в оригинални, затворени контейнери

Да се защити от замръзване

Да не се съхранява при температури над 40 °C

Срок на съхранение 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Няма

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Номер на разрешението	EU-0019228-0001 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	1.5

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Номер на разрешението	EU-0019228-0002 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	1,5

МЕТА SPC 2

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 2

1.1. **Идентификатор на мета SPC 2**

Идентификатор	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 2**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

Категория на опасност	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се избягва изпускане в околната среда. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

4.1. **Описание за използване**

Таблица 12. Употреба # 1 – Дезинфекция преди доене, Ръчно потапяне (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с потапяне

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2. **Описание за използване**

Таблица 13. Употреба # 2 – Дезинфекция преди доене, ръчно разпенване (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством метода с ръчно разпенване.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно разпенване.

3 приложения преди доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3. **Описание за използване**

Таблица 14. Употреба # 3 – Дезинфекция преди доене, ръчно пръскане (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/ww/w) – Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4. **Описание за използване**

Таблица 15. Употреба # 4 – Дезинфекция след доене, ръчно потапяне (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Няма данни Мая Мая Няма данни
Област на употреба	На закрито На закрито
Метод(и) на прилагане	Manual dipping Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл продукт/животно/приложение

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5. **Описание за използване**

Таблица 16. Употреба # 5 – Дезинфекция след доене, ръчно разпенване (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) – Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6. **Описание за използване**

Таблица 17. Употреба # 6 – Дезинфекция след доене, ръчно пръскане (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7. **Описание за използване**

Таблица 18. Употреба # 7 – Дезинфекция след доене, автоматично пръскане (да не се комбинира с дезинфекция преди доене (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Автоматично пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с автоматично пръскане.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 5 приложения след доене, за животно, за ден. Да не се комбинира с дезинфекция преди доене на базата на йод. Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с автоматично пръскане.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

5 приложения след доене, за животно, за ден. Да не се комбинира с дезинфекция преди доене на базата на йод.

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8. **Описание за използване**

Таблица 19. Употреба # 8 – Дезинфекция след доене, полуавтоматично потапяне (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Полуавтоматично потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) – Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9. **Описание за използване**

Таблица 20. Употреба # 9 – Дезинфекция преди и след доене, ръчно потапяне (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством методи с ръчно потапяне

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения). Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Приложете директно върху вимето на животното, преди доене, по метода с ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения).

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10. **Описание за използване**

Таблица 21. Употреба # 10 – Дезинфекция преди и след доене, ръчно разпенване (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно разпенване Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения). Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

Приложете директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно разпенване.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения).

Използвайте максимум 5 мл от продукта/животно/приложение

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11. **Описание за използване**

Таблица 22. Употреба # 11 – Дезинфекция преди и след доене, ръчно пръскане (течност RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно пръскане Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) – Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения). Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно пръскане.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения).

Използвайте максимум 15 мл продукт/животно/приложение

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, при манипулации с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

При употреба на продукта, носете подходящи защитни обувки (EN 13832).

Да се носи защитен работен комбинезон (най-малко тип 6, EN 13034)

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([2]) НА МЕТА SPC 2

5.1. **Инструкции за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да бъде подгрят до температура > 20 °C

Преди доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето.

За ефективно използване срещу бактерии и дрожди, продуктът трябва да бъде оставен в контакт с кожата за най-малко 30 секунди.

След подходящото време за контакт, отстранете напълно продукта, като използвате стерилна хартиена кърпа/тъкан, за да гарантирате чисти и сухи цицки.

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

([2]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 2.

След доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето, непосредствено след издояване.

За осигуряване на достатъчно време за контакт е необходимо да се вземат мерки, продуктът да не бъде отстранен след прилагането му (напр. кравите да се поддържат изправени най-малко 5 минути)

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Този продукт може да се използва в комбинация за дезинфекция преди и след издояване (може да се прилага върху дадено животно до общо 5 пъти дневно). Той обаче не трябва да се използва в комбинация с друг продукт на йодна основа.

За пълнене на продукта, в оборудването за неговото прилагане, се препоръчва да се използва дозираща помпа.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Вдишване: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с кожата: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с очите: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Поглъщане: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба

След вдишване: Да се подава свеж въздух; в случай на възникване на симптоми се консултирайте с лекар.

След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и щателно изплакнете.

След контакт с очите: Изплакнете отвореното око в продължение на няколко минути с течаща вода (най-малко 15 минути).

След поглъщане: Изплакнете устата, след което пийте много вода. Незабавно повикайте лекар.

При необходимост от медицински съвет, е необходимо да разполагате под ръка с контейнера или етикета на продукта

Стабилност и реактивност:

Реактивност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Химична стабилност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Възможни опасни реакции: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасни реакции.

Условия което трябва да се избягват: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

Опасни продукти на разлагането: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

Мерки за опазване на околната среда:

Оградете с насип за събиране на големи разливи от течност.

Съберете и/или абсорбирайте разлива с инертен материал, след което го поставете в подходящ контейнер.

Предотвратете попадане на оттока в канализацията, изпускателни канали или водни пътища.

Събирайте в затворени и подходящи контейнери за изхвърляне.

Не връщайте разлети материали обратно в оригиналния контейнер.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Преди да бъдат изхвърлени, изпразнените контейнери трябва да бъдат трикратно изплакнати

Хартиените кърпи, използвани за подсушаване на виметата на животните и отстраняване на продукта от тях, трябва да бъдат изхвърляни като нормален битов отпадък.

Не изпускайте неразреден продукт в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява само в оригинални, затворени контейнери

Да се защити от замръзване

Да не се съхранява при температури над 30 °C

Срок на съхранение 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Няма

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Номер на разрешението	EU-0019228-0003 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Номер на разрешението	EU-0019228-0004 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Номер на разрешението	EU-0019228-0005 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3

МЕТА SPC 3

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 3

1.1. **Идентификатор на мета SPC 3**

Идентификатор	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 3**

Формулация(и)	GW - Водоразтворим гел

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

Категория на опасност	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се избягва изпускане в околната среда. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

4.1. **Описание за използване**

Таблица 23. Употреба # 1 – Дезинфекция преди доене, Ръчно потапяне (гел RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством ръчно потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, преди доене, посредством ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2. **Описание за използване**

Таблица 24. Употреба # 2 – Дезинфекция след доене, ръчно потапяне (гел RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

2-3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3. **Описание за използване**

Таблица 25. Употреба # 3 – Дезинфекция след доене, полуавтоматично потапяне (гел RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Полуавтоматично потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение след доене на млекодайни животни Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения след доене, за животно, за ден. Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, след доене, посредством метода с полуавтоматично потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения след доене, за животно, за ден.

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4. **Описание за използване**

Таблица 26. Употреба # 4 – Дезинфекция преди и след доене, ръчно потапяне (гел RTU)

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Ръчно потапяне Дезинфектант за вимета, за пряко приложение преди и след доене на млекодайни животни. Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Степен и честота на приложение	Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w) - Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба. 3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения) Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1, 5 и 20 л бидони с HDPE или f-HDPE 200 л варели с HDPE или f-HDPE 950 л палетни контейнери (IBC) с HDPE или f-HDPE

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Прилага се директно върху вимето на животното, преди и след доене, посредством метода с ръчно потапяне.

Готов за употреба състав, съдържащ 0,3 % w/w йод. Да не се разрежда преди употреба.

3 приложения преди и 3 след доене, за животно, за ден (до общо 5 приложения)

Използвайте максимум 10 мл от продукта/животно/приложение

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

При прилагане на продукта чрез потапяне, носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Виж раздел 5 – Общи указания за употреба

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([3]) НА МЕТА SPC 3

5.1. **Инструкции за употреба**

Преди употреба продуктът трябва да бъде подгрят до температура > 20 °C

Преди доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето.

За ефективно използване срещу бактерии и дрожди, продуктът трябва да бъде оставен в контакт с кожата за най-малко 30 секунди.

След подходящото време за контакт, отстранете напълно продукта, като използвате стерилна хартиена кърпа/тъкан, за да гарантирате чисти и сухи цицки.

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

([3]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 3.

След доене:

Нанесете продукта по цялата дължина на всяка бозка от вимето, непосредствено след издояване.

За осигуряване на достатъчно време за контакт е необходимо да се вземат меркии, продуктът да не бъде отстранен след прилагането му (напр. кравите да се поддържат изправени най-малко 5 минути)

Работна концентрация на йод от 3 000 мг/кг (0,3 % w/w)

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Този продукт може да се използва в комбинация за дезинфекция преди и след издояване (може да се прилага върху дадено животно до общо 5 пъти дневно). Той обаче не трябва да се използва в комбинация с друг продукт на йодна основа.

За пълнене на продукта, в оборудването за неговото прилагане, се препоръчва да се използва дозираща помпа.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Вдишване: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с кожата: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Контакт с очите: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба.

Поглъщане: Няма известни въздействия или симптоми при нормална употреба

След вдишване: Да се подава свеж въздух; в случай на възникване на симптоми се консултирайте с лекар.

След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и щателно изплакнете.

След контакт с очите: Изплакнете отвореното око в продължение на няколко минути с течаща вода (най-малко 15 минути).

След поглъщане: Изплакнете устата, след което пийте много вода. Незабавно повикайте лекар.

При необходимост от медицински съвет, е необходимо да разполагате под ръка с контейнера или етикета на продукта

Стабилност и реактивност:

Реактивност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Химична стабилност: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасности свързани с реактивността.

Възможни опасни реакции: При нормални условия на съхранение и употреба, няма известни опасни реакции.

Условия което трябва да се избягват: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

Опасни продукти на разлагането: Няма, при нормални условия на съхранение и употреба.

Мерки за опазване на околната среда:

Оградете с насип за събиране на големи разливи от течност.

Съберете и/или абсорбирайте разлива с инертен материал, след което го поставете в подходящ контейнер.

Предотвратете попадане на оттока в канализацията, изпускателни канали или водни пътища.

Събирайте в затворени и подходящи контейнери за изхвърляне.

Не връщайте разлети материали обратно в оригиналния контейнер.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Преди да бъдат изхвърлени, изпразнените контейнери трябва да бъдат трикратно изплакнати

Хартиените кърпи, използвани за подсушаване на виметата на животните и отстраняване на продукта от тях, трябва да бъдат изхвърляни като нормален битов отпадък.

Не изпускайте неразреден продукт в канализацията.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява само в оригинални, затворени контейнери

Да се защити от замръзване

Да не се съхранява при температури над 30 °C

Срок на съхранение 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Няма

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Номер на разрешението	EU-0019228-0006 1-3				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3