KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/403

af 13. marts 2019

om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Deosan Activate BPF based on Iodine«

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 7. juli 2015 indgav Diversey Europe Operations B.V. en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af en familie af biocidholdige produkter med betegnelsen »Deosan Activate BPF based on Iodine« (i det følgende benævnt »produktfamilien«) af produkttype 3 som defineret i bilag V til nævnte forordning. Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed indvilligede i at vurdere ansøgningen, jf. artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-JN018376-30 i registret over biocidholdige produkter.

(2) Den biocidholdige produktfamilie indeholder aktivstoffet iod, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. Idet der tages hensyn til aktivstoffets iboende egenskaber og de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 ([2]), vil Kommissionen overveje behovet for at foretage en ny vurdering af godkendelsen af iod, herunder polyvinylpyrrolidon-iod, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 528/2012. Afhængigt af resultatet af denne vurdering vil Kommissionen dernæst overveje, hvorvidt EU-godkendelserne af produkter, som indeholder aktivstoffet, skal vurderes på ny, jf. artikel 48 i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Den 20. december 2017 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, vurderingsrapporten og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt »agenturet«).

(4) Den 6. juli 2018 fremlagde agenturet en udtalelse for Kommissionen ([3]), herunder udkastet til resumé af den biocidholdige produktfamilies egenskaber (i det følgende benævnt »resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om produktfamilien, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012. I udtalelsen konkluderes det, at produktfamilien falder ind under definitionen »familie af biocidholdige produkter« i artikel 3, stk. 1, litra s), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktfamilien i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktfamilien, forudsat at den er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1 og 6.

(5) Den 17. september 2018 fremlagde agenturet udkastet til resuméet for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).
([3]) ECHA's udtalelse af 6. juli 2018 om EU-godkendelse af »Deosan Activate BPF based on Iodine« (ECHA/BPC/207/2018).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse til Diversey Europe Operations B.V. af familien af biocidholdige produkter »Deosan Activate BPF based on Iodine« med godkendelsesnummer EU-0019228-0000.

EU-godkendelsen gælder fra den 3. april 2019 til den 31. marts 2029.

EU-godkendelsen meddeles med forbehold af overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, jf. bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Resumé af produktegenskaber for en familie af biocidholdige produkter

Deosan Activate BPF based on Iodine

PT03 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0019228-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3: EU-0019228-0000

DEL I

INFORMATIONSNIVEAU 1

1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Familienavn**

Navn	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

1.3. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresse	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Holland
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0000	
Referencenummer på emne i R4BP 3	EU-0019228-0000	
Godkendelsesdato	3. april 2019	
Godkendelsens udløbsdato	31. marts 2029	

1.4. **Producent(er) af de biocidholdige produkter**

Producentens navn	Diversey Europe Operations B.V.
Producentens adresse	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Holland
Placering af produktionsanlæg	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Holland Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Storbritannien Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Tyskland

1.5. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	Jod
Producentens navn	ACF Minera S.A.
Producentens adresse	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Placering af produktionsanlæg	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Producentens adresse	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	Cosayach Nitratos S.A.
Producentens adresse	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Aktivstof	Jod
Producentens navn	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Producentens adresse	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japan
Placering af produktionsanlæg	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japan

Aktivstof	Jod
Producentens navn	ISE Chemicals Corporation
Producentens adresse	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japan
Placering af produktionsanlæg	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japan

Aktivstof	Jod
Producentens navn	Atacama Minerals SCM
Producentens adresse	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. PRODUKTFAMILESAMMENSÆTNING OG -FORMULERING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af familien**

Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. **Type(r) formulering**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet SL — Vandpløseligt koncentrat GW — Vandopløselig gel

DEL II

INFORMATIONSNIVEAU 2 — META SPC'ER

META SPC 1

1. META SPC 1 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta SPC 1 identifikator**

Identifikator	Meta SPC 1 — Deosan Activate BPF — Concentrate

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-1

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. META SPC 1 SAMMENSÆTNING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 1**

Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 1**

Formulering(er)	SL — Vandpløseligt koncentrat

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 1

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 1

4.1. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 1. Brug # 1 — Desinfektion før malkning med manuel dypning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod kan dette være: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.1.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 2. Brug # 2 — Desinfektion før malkning med manuel skumning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel skumningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.

4.2.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 3. Brug # 3 — Desinfektion før malkning med manuel sprøjtning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel sprøjtningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.3.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 4. Brug # 4 — Desinfektion efter malkning med manuel dypning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.4.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 5. Brug # 5 — Desinfektion efter malkning med manuel skumning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel skumningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.5.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer efter malkning, pr. dyr, pr. dag.

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.

4.5.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 6. Brug # 6 — Desinfektion efter malkning med manuel sprøjtning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.6.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.6.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produkt (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.6.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 7. Brug # 7 — Desinfektion efter malkning med automatisk sprøjtning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Automatisk sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med automatisk sprøjtningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 5 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Må ikke kombineres med desinfektion før malkning. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.7.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med automatisk sprøjtningsmetode.

5 påføringer efter malkning, pr. dyr, pr. dag. Må ikke kombineres med jodbaseret desinfektion før malkning.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.7.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 8. Brug # 8 — Desinfektion efter malkning med halvautomatisk dypning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Halvautomatisk dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.8.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypning.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.8.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 9. Brug # 9 — Desinfektion før og efter malkning med manuel dypning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.9.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.9.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 10. Brug # 10 — Desinfektion før og efter malkning med manuel skumning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel skumningsmetode
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.10.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.

4.10.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 11. Brug # 11 — Desinfektion før og efter malkning med manuel sprøjtning (koncentrat)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på 0,3 % jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.11.1. *Brugsanvisning for brugere*

For produkter indeholdende 1,5 % jod: Fortynd 1 del produkt med 4 dele vand for at opnå en brugskoncentration på,3% jod. For produkter med en anden koncentration bør denne anvisning tilpasses.

Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.11.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj (min. type 6, EN 13034) og sikkerhedssko (EN 13832) ved brug af produktet (handske- og tøjmaterialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.11.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

5. GENEREL VEJLEDNING OM BRUG [1] AF META SPC 1

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på > 20 °C før brug

Før malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat.

For effektiv anvendelse mod bakterier og gær skal produktet have kontakt med huden i mindst 30 sekunder.

Fjern omhyggeligt produktet efter den passende kontakttid med en engangspapirserviet el.lign. for at sikre, at patterne er rene og tørre.

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

Efter malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat straks efter malkning.

For at sikre tilstrækkelig kontakttid bør produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. ved at lade køerne stå oprejst i mindst 5 minutter)

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen (kan anvendes op til 5 gange i alt pr. dyr pr. dag). Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

Det anbefales at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Indånding: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med huden: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med øjnene: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Indtagelse: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug

VED INDÅNDING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask omgående med vand og sæbe og skyl grundigt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med åbent øje i adskillige minutter under rindende vand (i mindst 15 minutter).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden og drik rigelige mængder vand. Tilkald straks en læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Stabilitet og reaktivitet:

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Kemisk stabilitet: Kemisk stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Forhold, der skal undgås: Ingen kendte forhold ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

[1] Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 1.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger:

Foretag inddæmning ved opsamling af større væskespild.

Begræns og/eller absorbér spild med inert materiale og anbring i en egnet beholder.

Undgå udledning til afløbssystemer, kloakker eller vandveje.

Opbevar i passende lukkede beholdere til bortskaffelse.

Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Tomme beholdere skal skylles tre gange inden bortskaffelse.

Papirservietter brugt til at fjerne produkt og tørre dyrets patter bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Ufortyndet produkt må ikke udledes til kloakker.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i den originale, lukkede beholder.

Skal beskyttes mod frost.

Må ikke oplagres ved temperaturer over 40 °C.

Holdbarhed 24 måneder.

6. ANDRE OPLYSNINGER

Ingen

7. INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 1

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0001 1-1				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0002 1-1				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	1,5

META SPC 2

1. META SPC 2 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta SPC 2 identifikator**

Identifikator	Meta SPC 2 — Deosan Activate BPF — RTU liquid

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-2

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. META SPC 2 SAMMENSÆTNING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 2**

Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 2**

Formulering(er)	AL — Opløsning til brug ufortyndet

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 2

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter. beholderen bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 2

4.1. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 12. Brug # 1 — Desinfektion før malkning med manual dypning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.1.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 13. Brug # 2 — Desinfektion før malkning med manuel skumning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel skumningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.

4.2.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 14. Brug # 3 — Desinfektion før malkning med manuel sprøjtning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel sprøjtningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.3.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 15. Brug # 4 — Desinfektion efter malkning med manuel dypning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.4.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 16. Brug # 5 — Desinfektion efter malkning med manuel skumning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel skumningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.5.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring

4.5.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.5.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 17. Brug # 6 — Desinfektion efter malkning med manuel sprøjtning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.6.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrs patter efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.6.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.6.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.6.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 18. Brug # 7 — Desinfektion efter malkning med automatisk sprøjtning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Automatisk sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med automatisk sprøjtningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 5 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Må ikke kombineres med jodbaseret desinfektion før malkning. Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.7.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med automatisk sprøjtningsmetode.

5 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Må ikke kombineres med jodbaseret desinfektion før malkning.

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.7.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.7.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 19. Brug # 8 — Desinfektion efter malkning med halvautomatisk dypning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Halvautomatisk dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.8.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.8.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.8.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 20. Brug # 9 — Desinfektion før og efter malkning med manuel dypning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.9.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrs patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.9.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.9.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.9.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 21. Brug # 10 — Desinfektion før og efter malkning med manuel skumning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel skumning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel skumningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.10.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel skumningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 5 ml produkt/dyr/påføring.

4.10.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.10.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.10.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 22. Brug # 11 — Desinfektion før og efter malkning med manuel sprøjtning (RTU-væske)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.11.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Anvendes direkte på dyrs patter før og efter malkning med manuel sprøjtningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning, pr. dyr, pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 15 ml produkt/dyr/påføring.

4.11.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj (min. type 6, EN 13034) og sikkerhedssko (EN 13832) ved brug af produktet (handskematerialet og tøjmaterialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.11.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.11.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

5. GENEREL VEJLEDNING OM BRUG ([2]) AF META SPC 2

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på > 20 °C før brug

Før malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat.

For effektiv anvendelse mod bakterier og gær skal produktet have kontakt med huden i mindst 30 sekunder.

Fjern omhyggeligt produktet efter den passende kontakttid med en engangspapirserviet el.lign. for at sikre, at patterne er rene og tørre.

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

([2]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 2.

Efter malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat straks efter malkning.

For at sikre tilstrækkelig kontakttid bør produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. ved at lade køerne stå oprejst i mindst 5 minutter).

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen (kan anvendes op til 5 gange i alt pr. dyr pr. dag). Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

Det anbefales at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Indånding: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med huden: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med øjnene: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Indtagelse: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug

VED INDÅNDING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask omgående med vand og sæbe og skyl grundigt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med åbent øje i adskillige minutter under rindende vand (i mindst 15 minutter).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden og drik rigelige mængder vand. Tilkald straks en læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Stabilitet og reaktivitet:

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Kemisk stabilitet: Kemisk stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Forhold, der skal undgås: Ingen kendte forhold ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger:

Foretag inddæmning ved opsamling af større væskespild.

Begræns og/eller absorbér spild med inert materiale og anbring i en egnet beholder.

Undgå udledning til afløbssystemer, kloakker eller vandveje.

Opbevar i passende lukkede beholdere til bortskaffelse.

Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Tomme beholdere skal skylles tre gange inden bortskaffelse.

Papirservietter brugt til at fjerne produkt og tørre dyrets patter bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Ufortyndet produkt må ikke udledes til kloakker.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Må kun opbevares i den originale, lukkede beholder.

Skal beskyttes mod frost.

Må ikke oplagres ved temperaturer over 30 °C.

Holdbarhed 24 måneder.

6. ANDRE OPLYSNINGER

Ingen

7. INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 2

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0003 1-2				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0004 1-2				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0005 1-2				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3

META SPC 3

1. META SPC 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. **Meta SPC 3 identifikator**

Identifikator	Meta SPC 3 — Deosan Activate BPF — RTU gel

1.2. **Suffiks til godkendelsesnummeret**

Nummer	1-3

1.3. **Produkttype(r)**

Produkttype(r)	PT03 — Veterinærhygiejne

2. META SPC 3 SAMMENSÆTNING

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af meta SPC 3**

Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Type(r) af formulering af meta SPC 3**

Formulering(er)	GW — Vandopløselig gel

3. FARE- OG SIKKERHEDSSÆTNINGER VEDRØRENDE META SPC 3

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter. beholderen bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter.

4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R) AF META SPC 3

4.1. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 23. Brug # 1 — Desinfektion før malkning med manuel dypning (RTU-gel)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før malkning. Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.1.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 24. Brug # 2 — Desinfektion efter malkning med manuel dypning (RTU-gel)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med manuel dypningsmetode.

2-3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 25. Brug # 3 — Desinfektion efter malkning med halvautomatisk dypning (RTU-gel)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Halvautomatisk dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. — Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag. Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter efter malkning med halvautomatisk dypningsmetode.

3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag.

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.3.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4. **Brugsbeskrivelse**

Tabel 26. Brug # 4 — Desinfektion før og efter malkning med manuel dypning (RTU-gel)

Produkttype	PT03 — Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	—
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Bakterier Gær
Anvendelsesområde	Indendørs
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning Pattedesinfektionsmiddel til direkte anvendelse på lakterende dyr før og efter malkning. Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod. Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug. 3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt). Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE eller f-HDPE): 1, 5 og 20 liter Tønde (HDPE eller f-HDPE): 200 liter Mellemstor beholder (HDPE eller f-HDPE): 950 liter

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Brugsklar formulering indeholdende 0,3 % v/v jod. Må ikke fortyndes inden brug.

Påføres direkte på dyrets patter før og efter malkning med manuel dypningsmetode.

3 påføringer før og 3 påføringer efter malkning pr. dyr pr. dag (op til 5 påføringer i alt).

Anvend højst 10 ml produkt/dyr/påføring.

4.4.2. *Brugsspecifikke risikoreducerende foranstaltninger*

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktdatabladet).

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se afsnit 5 — Generelle retningslinjer for anvendelse

5. GENEREL VEJLEDNING OM BRUG ([3]) AF META SPC 3

5.1. **Brugsanvisning**

Produktet skal have en temperatur på > 20 °C før brug

Før malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat.

For effektiv anvendelse mod bakterier og gær skal produktet have kontakt med huden i mindst 30 sekunder.

Fjern omhyggeligt produktet efter den passende kontakttid med en engangspapirserviet el.lign. for at sikre, at patterne er rene og tørre.

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

([3]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser inden for meta SPC 3.

Efter malkning:

Påfør produktet på hele længden af hver enkelt pat straks efter malkning.

For at sikre tilstrækkelig kontakttid bør produktet ikke fjernes efter påføring (f.eks. ved at lade køerne stå oprejst i mindst 5 minutter).

Brugskoncentration på 3 000 mg/kg (0,3 % v/v) jod.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Dette produkt kan bruges i kombination til desinfektion før og efter malkningen (kan anvendes op til 5 gange i alt pr. dyr pr. dag). Det bør dog ikke anvendes i kombination med et andet jodbaseret produkt.

Det anbefales at bruge en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

Indånding: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med huden: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Kontakt med øjnene: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug.

Indtagelse: Ingen kendte virkninger eller symptomer ved normal brug

VED INDÅNDING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Vask omgående med vand og sæbe og skyl grundigt.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med åbent øje i adskillige minutter under rindende vand (i mindst 15 minutter).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden og drik rigelige mængder vand. Tilkald straks en læge.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Stabilitet og reaktivitet:

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Kemisk stabilitet: Kemisk stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendes ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Forhold, der skal undgås: Ingen kendte forhold ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte ved normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger:

Foretag inddæmning ved opsamling af større væskespild.

Begræns og/eller absorbér spild med inert materiale og anbring i en egnet beholder.

Undgå udledning til afløbssystemer, kloakker eller vandveje.

Opbevar i passende lukkede beholdere til bortskaffelse.

Hæld aldrig spildt produkt tilbage i originalemballagen til senere brug.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Tomme beholdere skal skylles tre gange inden bortskaffelse.

Papirservietter brugt til at fjerne produkt og tørre dyrets patter bør bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Ufortyndet produkt må ikke udledes til kloakker.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Måkun opbevares i den originale, lukkede beholder.

Skalbeskyttes mod frost.

Måikke oplagres ved temperaturer over 30 °C.

Holdbarhed 18 måneder.

6. ANDRE OPLYSNINGER

Ingen

7. INFORMATIONSNIVEAU 3: INDIVIDUELLE PRODUKTER I META SPC 3

7.1. **Hvert enkeltstående produkts handelsnavn(e), godkendelsesnummer og specifikke sammensætning**

Handelsnavn	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Godkendelsesnummer	EU-0019228-0006 1-3				
Trivialnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,3