ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαρτίου 2019

για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Deosan Activate BPF based on Iodine»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 7 Ιουλίου 2015 η Diversey Europe Operations BV υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «Deosan Activate BPF based on Iodine» («η οικογένεια προϊόντων») του τύπου προϊόντων 3, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού. Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε να αξιολογήσει την αίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η αίτηση καταχωρίστηκε με αριθμό υπόθεσης BC-JN018376-30 στο Μητρώο Βιοκτόνων.

(2) Η οικογένεια βιοκτόνων περιέχει ως δραστική ουσία ιώδιο, το οποίο περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς ιδιότητες της δραστικής ουσίας και τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη που καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ([2]), η Επιτροπή θα εκτιμήσει την ανάγκη επανεξέτασης της έγκρισης του ιωδίου, συμπεριλαμβανομένης της ιωδιούχου πολυβινυλοπυρρολιδόνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια κατά πόσον οι ενωσιακές άδειες για τα προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία πρέπει να επανεξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3) Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»).

(4) Στις 6 Ιουλίου 2018 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνώμη ([3]), στην οποία περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, ΠΧΠ) για την οικογένεια προϊόντων και η τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την οικογένεια προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια προϊόντων εμπίπτει στον ορισμό της «οικογένειας βιοκτόνων», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο της ΠΧΠ, η οικογένεια προϊόντων πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

(5) Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, επομένως, θεωρεί, σκόπιμη τη χορήγηση ενωσιακής άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1).

([3]) Γνωμοδότηση του ECHA της 6ης Ιουλίου 2018 για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Deosan Activate BPF based on Iodine» (ECHA/BPC/207/2018).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται άδεια της Ένωσης στην Diversey Europe Operations BV για την οικογένεια βιοκτόνων «Deosan Activate BPF based on Iodine» με αριθμό άδειας EU-0019228-0000.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 3 Απριλίου 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2029.

Η άδεια της Ένωσης υπόκειται σε συμμόρφωση με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Deosan Activate BPF based on Iodine

ΤΠ 3 - Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0019228-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: EU-0019228-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

1.1. **Επώνυμο**

Ονομασία	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

1.3. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Diversey Europe Operations B.V.
	Διεύθυνση	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Ολλανδία
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	EU-0019228-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	3 Απριλίου 2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31 Μαρτίου 2029	

1.4. **Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων**

Επωνυμία παρασκευαστή	Diversey Europe Operations B.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Ιταλία Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Ισπανία Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Ολλανδία Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Ηνωμένο Βασίλειο Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Γερμανία

1.5. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	ACF Minera S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	San Martin No 499, 1100000 Iquique Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Χιλή

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Χιλή

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Cosayach Nitratos S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Χιλή

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Ιαπωνία

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	ISE Chemicals Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Ιαπωνία

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Atacama Minerals SCM
Διεύθυνση παρασκευαστή	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Χιλή
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Χιλή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΎΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. **Τύπος(οι) σκευάσματος**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL - Κάθε άλλο υγρό SL - Πυκνό διάλυμα GW - Υδατοδιαλυτή γέλη

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - META-SPC

META-SPC 1

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ META-SPC 1

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-1

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ META-SPC 1

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	SL - Πυκνό διάλυμα

3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ ΤΩΝ META-SPC 1

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-ΕΣ ΧΡΉΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα γαλακτοπαραγωγά θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα. Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο εμβάπτισης
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο, αυτό μπορεί να είναι: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

3 εφαρμογές προ-αρμέγματος, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο αφρισμού
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητου αφρισμού.

3 εφαρμογές προ-αρμέγματος, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από την άμελξη με χειροκίνητη μέθοδο ψεκασμού.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος σε 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί συγκέντρωση ιωδίου 0,3 %. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητου ψεκασμού.

3 εφαρμογές προ-αρμέγματος, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (5 εφαρμογές συνολικά)

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο αφρισμού.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο αφρισμού.

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.6.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 7. Χρήση # 7 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, αυτόματος ψεκασμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Αυτόματος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά την άμελξη με αυτόματη μέθοδο ψεκασμού.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 5 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Να μην συνδυάζεται με την απολύμανση πριν από το άρμεγμα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά την άμελξη με αυτόματη μέθοδο ψεκασμού.

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

5 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Να μην συνδυάζεται με απολύμανση πριν από το άρμεγμα με βάση το ιώδιο.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 8. Χρήση # 8 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, ημι-αυτόματη εμβάπτιση (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ημι-αυτόματη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.8.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.8.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 9. Χρήση # 9 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο εμβάπτισης
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (έως και 5 εφαρμογές συνολικά) Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.9.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο εμβάπτισης.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά)

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.9.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 10. Χρήση # 10 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου αφρίσματος
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά) Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.10.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητου αφρισμού.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά)

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.10.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 11. Χρήση # 11 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (συμπύκνωμα)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Η συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση είναι 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Για προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (έως και 5 εφαρμογές συνολικά) Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.11.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για τα προϊόντα που περιέχουν 1,5 % ιώδιο: Αραιώστε 1 μέρος του προϊόντος έως 4 μέρη νερού για να επιτευχθεί 0,3 % συγκέντρωση ιωδίου κατά τη χρήση. Για προϊόντα με άλλη συγκέντρωση, αυτή η οδηγία πρέπει να προσαρμοστεί.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής του χειροκίνητου ψεκασμού.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (έως και 5 εφαρμογές συνολικά)

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.11.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα (EN 13832) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

4.11.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ([1]) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία > 20 °C πριν από τη χρήση

Πριν το άρμεγμα:

Εφαρμόστε το προϊόν σε όλο το μήκος κάθε θηλής.

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από τον κατάλληλο χρόνο επαφής, αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν, χρησιμοποιώντας μία απλή χαρτοπετσέτα/πανί για να βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι καθαρές και στεγνές.

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

Μετά το άρμεγμα:

Καλύψτε το πλήρες μήκος κάθε θηλής με το προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα.

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά)

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμένη απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά ανά ζώο και ανά ημέρα). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

Απαιτείται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών Απαιτείται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.**

Εισπνοή: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με το δέρμα: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με τα μάτια: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Κατάποση: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση

Μετά από εισπνοή: Παροχή καθαρού αέρα. συμβουλευτείτε τον ιατρό σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε το ανοιχτό μάτι για αρκετά λεπτά με τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά).

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια πίνετε άφθονο νερό. Αμέσως καλέστε για γιατρό.

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, πρέπει να έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος

Σταθερότητα και αντιδραστικότητα:

Αντιδραστικότητα: Κανένας κίνδυνος αντιδραστικότητας δεν είναι γνωστός υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

([1]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 1.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Ανάχωμα για τη συλλογή μεγαλύτερων διαρροών υγρών.

Περιέχετε ή/και απορροφάτε τη διαρροή με αδρανές υλικό και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο.

Αποφύγετε την εισροή απορριμμάτων σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή πλωτές οδούς.

Συλλέξτε σε κλειστά και κατάλληλα δοχεία για απόρριψη.

Μην τοποθετείτε τα χυμένα υλικά πίσω στο αρχικό δοχείο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Τα άδεια δοχεία πρέπει να τριπλασιαστούν ξεπλυμένα πριν από τη διάθεσή τους

Οι χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούνται για την ξήρανση των θηλών και την απομάκρυνση του προϊόντος από αυτά πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά/οικιακά απορρίμματα.

Μην ρίχνετε αδιάλυτο προϊόν μέσα σε υπονόμους.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Αποθηκεύεται μόνο σε αρχικό, κλειστό δοχείο

Προστατεύστε από τον παγετό

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C

Διάρκεια ζωής 24 μήνες

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Κανένα

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0001 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0002 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,5

ΜΕΤΑ-SPC 2

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 2

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 2**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-2

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 2

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 2**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL - Κάθε άλλο υγρό

3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-ΕΣ ΧΡΉΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 12. Χρήση # 1 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με μεθόδους χειροκίνητης εμβάπτισης

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με μεθόδους χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές πριν το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 13. Χρήση # 2 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο αφρισμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητου αφρισμού.

3 εφαρμογές πριν το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 14. Χρήση # 3 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκινήτου ψεκασμού.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές πριν το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 15. Χρήση # 4 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 16. Χρήση # 5 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου αφρισμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με χειροκίνητη μέθοδο αφρισμού.)

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 17. Χρήση # 6 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (RTU υγρό)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.6.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό γαντιών να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες προϊόντος)

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 18. Χρήση # 7 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, αυτόματος ψεκασμός (δεν πρέπει να συνδυαστεί με απολύμανση πριν από το άρμεγμα (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Αυτόματος ψεκασμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά την άμελξη με αυτόματη μέθοδο ψεκασμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 5 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Να μην συνδυάζεται με απολύμανση βασισμένη στο ιώδιο πριν από το άρμεγμα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά την άμελξη με αυτόματη μέθοδο ψεκασμού.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

5 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Να μην συνδυάζεται με απολύμανση βασισμένη στο ιώδιο πριν από το άρμεγμα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 19. Χρήση # 8 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, ημι-αυτόματη εμβάπτιση (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ημι-αυτόματη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.8.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.8.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 20. Χρήση # 9 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με μεθόδους χειροκίνητης εμβάπτισης

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά). Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.9.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας σε θηλάζουσες θηλές πριν από το άρμεγμα με μεθόδους χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά).

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.9.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

4.9.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.9.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 21. Χρήση # 10 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος αφρισμός (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος αφρισμός Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου αφρισμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά). Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.10.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

Εφαρμόστε απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητου αφρισμού.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά).

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 5 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.10.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν)

4.10.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.10.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 22. Χρήση # 11 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητος ψεκασμός (υγρό RTU)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητος ψεκασμός Απολυμαντικό θηλών, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση, συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά). Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.11.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο του χειροκίνητου ψεκασμού.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά).

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 15 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.11.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το υλικό του γαντιού να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες για το προϊόν

Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα (EN 13832) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

4.11.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.11.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

5. ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ([2]) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία > 20 °C πριν από τη χρήση

Πριν το άρμεγμα:

Εφαρμόστε το προϊόν σε όλο το μήκος κάθε θηλής.

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από τον κατάλληλο χρόνο επαφής, αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν, χρησιμοποιώντας μία απλή χαρτοπετσέτα/πανί για να βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι καθαρές και στεγνές.

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

([2]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 2.

Μετά το άρμεγμα:

Καλύψτε το πλήρες μήκος κάθε θηλής με το προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα.

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά)

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμένη απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά ανά ζώο και ανά ημέρα). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

Απαιτείται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Εισπνοή: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με το δέρμα: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με τα μάτια: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Κατάποση: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση

Μετά από εισπνοή: Παροχή καθαρού αέρα. συμβουλευτείτε τον ιατρό σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε το ανοιχτό μάτι για αρκετά λεπτά με τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά).

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια πίνετε άφθονο νερό. Αμέσως καλέστε για γιατρό.

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, πρέπει να έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος

Σταθερότητα και αντιδραστικότητα:

Αντιδραστικότητα: Κανένας κίνδυνος αντιδραστικότητας δεν είναι γνωστός υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Ανάχωμα για τη συλλογή μεγαλύτερων διαρροών υγρών.

Περιέχετε ή/και απορροφάτε τη διαρροή με αδρανές υλικό και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο.

Αποφύγετε την εισροή απορριμμάτων σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή πλωτές οδούς.

Συλλέξτε σε κλειστά και κατάλληλα δοχεία για απόρριψη.

Μην τοποθετείτε τα χυμένα υλικά πίσω στο αρχικό δοχείο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Τα άδεια δοχεία πρέπει να τριπλασιαστούν ξεπλυμένα πριν από τη διάθεσή τους

Οι χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούνται για την ξήρανση των θηλών και την απομάκρυνση του προϊόντος από αυτά πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά/οικιακά απορρίμματα.

Μην ρίχνετε αδιάλυτο προϊόν μέσα σε υπονόμους.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Αποθηκεύεται μόνο σε αρχικό, κλειστό δοχείο

Προστατεύστε από τον παγετό

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C

Διάρκεια ζωής 24 μήνες

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Κανένα

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 2

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0003 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0004 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0005 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3

ΜΕΤΑ-SPC 3

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 3

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 3**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-3

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 3

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 3**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	GW - Υδατοδιαλυτή γέλη

3. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-ΕΣ ΧΡΉΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 23. Χρήση # 1 – Απολύμανση πριν από το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (RTU τζελ)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν από το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων πριν από το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 24. Χρήση # 2 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (RTU τζελ)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. εφαρμογή κατ 'ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

2 - 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 25. Χρήση # 3 – Απολύμανση μετά το άρμεγμα, ημι-αυτόματη εμβάπτιση (RTU τζελ)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ημι-αυτόματη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα. Εφαρμογή κατ 'ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο ημιαυτόματης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα.

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 26. Χρήση # 4 – Απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα, χειροκίνητη εμβάπτιση (RTU τζελ)

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	—
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικά
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Χειροκίνητη εμβάπτιση Απολυμαντικό για θηλή, για άμεση εφαρμογή στα θηλάζοντα ζώα πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητης εμβάπτισης.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000mg/kg (0,3 % w/w) - Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση. 3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (έως και 5 εφαρμογές συνολικά) Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE ή f-HDPE 1, 5 & 20 λίτρων 200 λίτρα HDPE ή f-HDPE τύμπανο 950 λίτρα HDPE ή f-HPDE ενδιάμεσο χύδην εμπορευματοκιβώτιο (IBC)

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόζεται απευθείας στις θηλές των ζώων προ και μετά το άρμεγμα με τη μέθοδο εφαρμογής χειροκίνητης εμβάπτισης.

Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση που περιέχει 0,3 % w/w ιώδιο. Μην αραιώνετε πριν τη χρήση.

3 προ και 3 εφαρμογές μετά το άρμεγμα, ανά ζώο, ανά ημέρα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά)

Εφαρμογή κατ' ανώτατο όριο 10 ml προϊόντος/ζώο/εφαρμογή

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά την εφαρμογή του προϊόντος με εμβάπτιση (το υλικό γαντιών να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε ενότητα 5 - Γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ([3]) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν πρέπει να φθάσει σε θερμοκρασία > 20 °C πριν από τη χρήση

Πριν το άρμεγμα:

Εφαρμόστε το προϊόν σε όλο το μήκος κάθε θηλής.

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Μετά από τον κατάλληλο χρόνο επαφής, αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν, χρησιμοποιώντας μία απλή χαρτοπετσέτα/πανί για να βεβαιωθείτε ότι οι θηλές είναι καθαρές και στεγνές.

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

([3]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 3.

Μετά το άρμεγμα:

Καλύψτε το πλήρες μήκος κάθε θηλής με το προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα.

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά)

Κατά τη χρήση συγκέντρωση ιωδίου 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδυασμένη απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα (μέχρι 5 εφαρμογές συνολικά ανά ζώο και ανά ημέρα). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

Απαιτείται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την πλήρωση του προϊόντος στον εξοπλισμό εφαρμογής.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Εισπνοή: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με το δέρμα: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Επαφή με τα μάτια: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση.

Κατάποση: Δεν υπάρχουν γνωστά αποτελέσματα ή συμπτώματα κατά την κανονική χρήση

Μετά από εισπνοή: Παροχή καθαρού αέρα. συμβουλευτείτε τον ιατρό σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε το ανοιχτό μάτι για αρκετά λεπτά με τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά).

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και στη συνέχεια πίνετε άφθονο νερό. Αμέσως καλέστε για γιατρό.

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, πρέπει να έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος

Σταθερότητα και αντιδραστικότητα:

Αντιδραστικότητα: Κανένας κίνδυνος αντιδραστικότητας δεν είναι γνωστός υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Συνθήκες προς αποφυγή: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστές υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

Ανάχωμα για τη συλλογή μεγαλύτερων διαρροών υγρών.

Περιέχετε ή/και απορροφάτε τη διαρροή με αδρανές υλικό και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε κατάλληλο δοχείο.

Αποφύγετε την εισροή απορριμμάτων σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή πλωτές οδούς.

Συλλέξτε σε κλειστά και κατάλληλα δοχεία για απόρριψη.

Μην τοποθετείτε τα χυμένα υλικά πίσω στο αρχικό δοχείο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Τα άδεια δοχεία πρέπει να τριπλασιαστούν ξεπλυμένα πριν από τη διάθεσή

Οι χαρτοπετσέτες που χρησιμοποιούνται για την ξήρανση των θηλών και την απομάκρυνση του προϊόντος από αυτά πρέπει να απορρίπτονται ως κανονικά/οικιακά απορρίμματα.

Μην ρίχνετε αδιάλυτο προϊόν μέσα σε υπονόμους.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Αποθηκεύεται μόνο σε αρχικό, κλειστό δοχείο

Προστατεύστε από τον παγετό

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 30° C

Διάρκεια ζωής 18 μήνες

6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Κανένα

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 3

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Αριθμός άδειας	EU-0019228-0006 1-3				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3