KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/403,

13. märts 2019,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Deosan Activate BPF based on Iodine“

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) 7. juulil 2015 esitas Diversey Europe Operations B.V. määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase loataotluse biotsiidipere jaoks, mille nimi on „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (joodipõhine biotsiidipere Deosan Activate, edaspidi „tootepere“) ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 3. Ühendkuningriigi pädev asutus nõustus taotlust hindama kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõikega 1. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-JN018376-30.

(2) Biotsiidipere sisaldab toimeainena joodi, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja. Võttes arvesse toimeaine olemuslikke omadusi ja endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikke kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100, ([2]) kaalub komisjon joodi, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjoodi heakskiitmise otsuse läbivaatamist vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 15. Olenevalt kõnealuse läbivaatamise tulemustest kaalub komisjon seejärel, kas kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 48 tuleb liidu antud load kõnealust toimeainet sisaldavate toodete jaoks läbi vaadata.

(3) 20. detsembril 2017 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja järeldused Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“).

(4) 6. juulil 2018 esitas kemikaaliamet komisjonile arvamuse, ([3]) mis vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 3 sisaldas tootepere biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandit ning tootepere lõplikku hindamisaruannet. Arvamuses järeldatakse, et tootepere vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et selle jaoks sai taotleda liidu luba kooskõlas kõnealuse määruse artikli 42 lõikega 1 ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab tootepere kõnealuse määruse artikli 19 lõigetes 1 ja 6 sätestatud tingimustele.

(5) 17. septembril 2018 edastas kemikaaliamet komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4.

(6) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidipere jaoks liidu luba.

(7) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

([2]) Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301, 17.11.2017, lk 1).

([3]) Euroopa Kemikaaliameti 6. juuli 2018. aasta arvamus liidu loa andmise kohta „Deosan Activate BPF based on Iodine“ jaoks (ECHA/BPC/207/2018).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Diversey Europe Operations B.V. antakse liidu luba biotsiidipere „Deosan Activate BPF based on Iodine“ jaoks, loa number on EU-0019228-0000.

Liidu luba kehtib alates 3. aprillist 2019 kuni 31. märtsini 2029.

Liidu loa andmisel eeldatakse vastavust lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Biotsiidipere omaduste kokkuvõte

Deosan Activate BPF based on Iodine

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0019228-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EU-0019228-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

1. HALDUSTEAVE

1.1. **Biotsiidipere nimi**

Nimetus	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Diversey Europe Operations B.V.
	Aadress	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Holland
Loa number	EU-0019228-0000	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EU-0019228-0000	
Loa andmise kuupäev	3. aprill 2019	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	31. märts 2029	

1.4. **Biotsiidide tootja(d)**

Tootja nimi	Diversey Europe Operations B.V.
Tootja aadress	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Holland
Tootmiskohtade asukoht	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itaalia Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Hispaania Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Holland Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Ühendkuningriik Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	ACF Minera S.A.
Tootja aadress	San Martin No 499, 1100000 Iquique Tšiili
Tootmiskohtade asukoht	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Tšiili

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Tootja aadress	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Tšiili
Tootmiskohtade asukoht	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Tšiili

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	Cosayach Nitratos S.A.
Tootja aadress	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Tšiili
Tootmiskohtade asukoht	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Tšiili

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Tootja aadress	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Jaapan
Tootmiskohtade asukoht	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Jaapan

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	ISE Chemicals Corporation
Tootja aadress	3–1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Jaapan
Tootmiskohtade asukoht	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Jaapan

Toimeaine	Jood
Tootja nimi	Atacama Minerals SCM
Tootja aadress	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Tšiili
Tootmiskohtade asukoht	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Tšiili

2. BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA KASUTUSVORM

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3	1,6

2.2. **Kasutusvormi liik (liigid)**

Kasutusvorm(id)	AL - Muu vedelik SL - Lahustuv kontsentraat GW - Vees lahustuv geel

II OSA

TEINE TEABETASAND — TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕT(T)E(D)

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaal-selt
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	1,35	1,6

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 1 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	SL - Lahustuv kontsentraat

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Sisu kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.. Mahuti kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele..

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 1 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 1. Kasutus # 1 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks. Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavate toodete korral võib see olla: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2. Kasutus # 2 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 3. Kasutus # 3 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: Lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 4. Kasutus # 4 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku 5 pealekandmist)

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 5. Kasutus # 5 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.5.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.5.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 6. Kasutus # 6 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.6.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.6.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.6.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 7. Kasutus # 7 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, automatiseeritud pihustamine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Automatiseeritud pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda automatiseeritud pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 5 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Mitte kombineerida lüpsieelse desinfitseerimisega. Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.7.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda automatiseeritud pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

5 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Mitte kombineerida joodipõhise lüpsieelse desinfitseerimisega.

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.7.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 8. Kasutus # 8 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, poolautomatiseeritud sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Poolautomatiseeritud sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.8.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.8.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 9. Kasutus # 9 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist) Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.9.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist)

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.9.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 10. Kasutus # 10 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist) Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.10.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist)

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.10.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 11. Kasutus # 11 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kontsentraat)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist) Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.11.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

1,5 % joodi sisaldavad tooted: lahjendada 1 osa toodet 4 osa veega, et saada kasutamiseks 0,3 % joodi kontsentratsioon. Teise kontsentratsiooniga toote korral tuleb seda juhist kohandada.

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist)

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.11.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kanda toote kasutamise ajal sobivaid kaitsejalatseid (EN 13832).

Kanda kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN13034)

4.11.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S ([1]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile > 20 °C

Lüpsieelselt:

Kanda toode igale nisale kogu ulatuses.

Bakterite ja pärmseene vastaseks efektiivseks kasutamiseks jätta toode nahale vähemalt 30 sekundiks.

Pärast nõutud kontaktaja möödumist eemaldada ühekordse paberrätiku/lapiga põhjalikult toode, et nisad oleksid puhtad ja kuivad.

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

Lüpsijärgselt:

Kanda kohe pärast lüpsmist toode igale nisale kogu ulatuses.

Piisava kontaktaja tagamiseks tuleb jälgida, et toodet ei eemaldata pärast pealekandmist (nt lasta lehmadel vähemalt 5 minutit seista)

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Toodet võib kasutada kombineeritult lüpsieelseks ja -järgseks desinfitseerimiseks (kokku kuni viis kasutuskorda looma kohta päevas). Seda ei tohiks siiski kasutada koos mõne muu joodipõhise tootega.

Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

Sissehingamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Nahale sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Silma sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Allaneelamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Pärast sissehingamist: Tagada värske õhk, sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Pärast nahale sattumist: Pesta koheselt vee ja seebiga ning loputada põhjalikult.

Pärast silma sattumist: Loputada avatud silma jooksva veega mitu minutit (vähemalt 15 minutit).

Pärast allaneelamist: Loputada suud ja seejärel juua rohkelt vett. Koheselt pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Püsivus ja reaktsioonivõime:

Reaktsioonivõime: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada reaktsioonivõimega seotud ohtusid.

Keemiline stabiilsus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada ohtlikke reaktsioone.

Tingimused, mida tuleb vältida: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 1 iga lubatud kasutuse puhul

Ohtlikud lagusaadused: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud:

Tõkestada ulatuslikumad lekked kogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertsesse materjali ja asetada seejärel sobivasse mahutisse.

Vältida äravoolutorudesse, kanalisatsiooni või veetorudesse sattumist.

Koguda kõrvaldamiseks suletud ja sobivatesse mahutitesse.

Mitte panna lekkinud materjale tagasi originaalpakendisse.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Tühjad pakendid tuleb kolm korda läbi loputada enne ära viskamist

Looma nisade kuivatamiseks ja nendelt toote eemaldamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tava-/olmeprügina.

Mitte valada lahjendamata toodet kanalisatsiooni.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Ladustada ainult suletud originaalpakendis

Kaitsta külmumise eest

Mitte ladustada temperatuuril üle 40 °C

Säilivusaeg 24 kuud

6. MUU TEAVE

Puudub

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Loa number	EU-0019228-0001 1–1				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	1,5

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Loa number	EU-0019228-0002 1–1				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	1,5

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3	0,32

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 2 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	AL - Muu vedelik

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Sisu kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.. Mahuti kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele..

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 2 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 12. Kasutus # 1 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 13. Kasutus # 2 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 14. Kasutus # 3 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 15. Kasutus # 4 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutusvalmis 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 16. Kasutus # 5 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.5.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.5.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 17. Kasutus # 6 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.6.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.6.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.6.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.6.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 18. Kasutus # 7 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, automatiseeritud pihustamine (mitte kombineerida lüpsieelse desinfitseerimisega) (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Automatiseeritud pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda automatiseeritud pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 5 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Mitte kombineerida joodipõhise lüpsieelse desinfitseerimisega. Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.7.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda automatiseeritud pihustamise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

5 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Mitte kombineerida joodipõhise lüpsieelse desinfitseerimisega.

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.7.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.7.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 19. Kasutus # 8 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, poolautomatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Poolautomatiseeritud sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.8.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.8.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.8.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 20. Kasutus # 9 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist). Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.9.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist).

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.9.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.9.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.9.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 21. Kasutus # 10 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi vahuga katmine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi vahuga katmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist). Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.10.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

Kanda käsitsi vahuga katmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist).

Kasutada maksimaalselt 5 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.10.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.10.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.10.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 22. Kasutus # 11 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi pihustamine (kasutusvalmis vedelik)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi pihustamine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist). Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.11.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi pihustamise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt..

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist).

Kasutada maksimaalselt 15 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.11.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kanda toote kasutamise ajal sobivaid kaitsejalatseid (EN 13832).

Kanda kaitseülikonda (vähemalt tüüp 6, EN13034)

4.11.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.11.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S ([2]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile > 20 °C

Lüpsieelselt:

Kanda toode igale nisale kogu ulatuses.

Bakterite ja pärmseene vastaseks efektiivseks kasutamiseks jätta toode nahale vähemalt 30 sekundiks.

Pärast nõutud kontaktaja möödumist eemaldada ühekordse paberrätiku/lapiga põhjalikult toode, et nisad oleksid puhtad ja kuivad.

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([2]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 2 iga lubatud kasutuse puhul.

Lüpsijärgselt:

Kanda kohe pärast lüpsmist toode igale nisale kogu ulatuses.

Piisava kontaktaja tagamiseks tuleb jälgida, et toodet ei eemaldata pärast pealekandmist (nt lasta lehmadel vähemalt 5 minutit seista)

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Toodet võib kasutada kombineeritult lüpsieelseks ja -järgseks desinfitseerimiseks (kokku kuni viis kasutuskorda looma kohta päevas). Seda ei tohiks siiski kasutada koos mõne muu joodipõhise tootega.

Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

Sissehingamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Nahale sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Silma sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Allaneelamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Pärast sissehingamist: Tagada värske õhk, sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Pärast nahale sattumist: Pesta koheselt vee ja seebiga ning loputada põhjalikult.

Pärast silma sattumist: Loputada avatud silma jooksva veega mitu minutit (vähemalt 15 minutit).

Pärast allaneelamist: Loputada suud ja seejärel juua rohkelt vett. Koheselt pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Püsivus ja reaktsioonivõime:

Reaktsioonivõime: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada reaktsioonivõimega seotud ohtusid.

Keemiline stabiilsus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada ohtlikke reaktsioone.

Tingimused, mida tuleb vältida: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

Ohtlikud lagusaadused: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud:

Tõkestada ulatuslikumad lekked kogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertsesse materjali ja asetada seejärel sobivasse mahutisse.

Vältida äravoolutorudesse, kanalisatsiooni või veetorudesse sattumist.

Koguda kõrvaldamiseks suletud ja sobivatesse mahutitesse.

Mitte panna lekkinud materjale tagasi originaalpakendisse.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Tühjad pakendid tuleb kolm korda läbi loputada enne ära viskamist

Looma nisade kuivatamiseks ja nendelt toote eemaldamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tava-/olmeprügina.

Mitte valada lahjendamata toodet kanalisatsiooni.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Ladustada ainult suletud originaalpakendis

Kaitsta külmumise eest

Mitte ladustada temperatuuril üle 30 °C

Säilivusaeg 24 kuud

6. MUU TEAVE

Puudub

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Loa number	EU-0019228-0003 1–2				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Loa number	EU-0019228-0004 1–2				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3

7.3. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Loa number	EU-0019228-0005 1–2				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3

TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3

1. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 HALDUSTEAVE

1.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

2. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 KOOSTISE TEAVE

2.1. **Toote omaduste metakokkuvõtte 3 kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)	
					Minimaalselt	Maksimaalselt
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3	0,32

2.2. **Toote omaduste metakokkuvõtte 3 oleku kirjeldus(ed)**

Kasutusvorm(id)	GW - Vees lahustuv geel

3. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Sisu kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele.. Mahuti kõrvaldada vastavalt siseriiklikele eeskirjadele..

4. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE 3 LUBATUD KASUTUS

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 23. Kasutus # 1 – Lüpsieelne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis geel)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutsvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 24. Kasutus # 2 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis geel)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

2–3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 25. Kasutus # 3 – Lüpsijärgne desinfitseerimine, poolautomatiseeritud sissekastmine (kasutusvalmis geel)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Poolautomatiseeritud sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsijärgselt otse pealekandmiseks Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas. Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda poolautomatiseeritud sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsijärgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas.

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 26. Kasutus # 4 – Lüpsieelne ja -järgne desinfitseerimine, käsitsi sissekastmine (kasutusvalmis geel)

Tooteliik	Tooteliik 03 - Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	—
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Bakterid Pärmseen
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Käsitsi sissekastmine Nisa desinfektsioonivahend lakteerivatele loomadele lüpsieelselt ja -järgselt otse pealekandmiseks Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – 0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist. 3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist) Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1, 5 ja 20 l HDPE või f-HDPE kanister 200 l HDPE või f-HDPE tünn 950 l HDPE või f-HDPE mahtlastikonteiner (IBC)

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kanda käsitsi sissekastmise teel otse looma nisadele lüpsieelselt ja -järgselt.

0,3 % w/w joodi sisaldav kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada enne kasutamist.

3 lüpsieelset ja 3 lüpsijärgset pealekandmist looma kohta päevas (kokku kuni 5 pealekandmist)

Kasutada maksimaalselt 10 ml toodet looma kohta ühel kasutuskorral

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Kanda toote pealekandmisel sissekastmise teel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Vt 5. osa - Kasutuse üldjuhised

5. TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE %S ([3]) ÜLDISED KASUTUSJUHISED

5.1. **Kasutusjuhendid**

Enne kasutamist tuleb toode viia temperatuurile > 20 °C

Lüpsieelselt:

Kanda toode igale nisale kogu ulatuses.

Bakterite ja pärmseene vastaseks efektiivseks kasutamiseks jätta toode nahale vähemalt 30 sekundiks.

Pärast nõutud kontaktaja möödumist eemaldada ühekordse paberrätiku/lapiga põhjalikult toode, et nisad oleksid puhtad ja kuivad.

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([3]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutusjuhised kehtivad toote omaduste metakokkuvõtte 3 iga lubatud kasutuse puhul.

Lüpsijärgselt:

Kanda kohe pärast lüpsmist toode igale nisale kogu ulatuses.

Piisava kontaktaja tagamiseks tuleb jälgida, et toodet ei eemaldata pärast pealekandmist (nt lasta lehmadel vähemalt 5 minutit seista)

Kasutatav joodi kontsentratsioon 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

Toodet võib kasutada kombineeritult lüpsieelseks ja -järgseks desinfitseerimiseks (kokku kuni viis kasutuskorda looma kohta päevas). Seda ei tohiks siiski kasutada koos mõne muu joodipõhise tootega.

Toote lisamisel pealekandmisvahendisse on soovitatav kasutada doseerimispumpa.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

Sissehingamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Nahale sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Silma sattumine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Allaneelamine: Tavapärasel kasutamisel pole teada toimet või sümptomeid.

Pärast sissehingamist: Tagada värske õhk, sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Pärast nahale sattumist: Pesta koheselt vee ja seebiga ning loputada põhjalikult.

Pärast silma sattumist: Loputada avatud silma jooksva veega mitu minutit (vähemalt 15 minutit).

Pärast allaneelamist: Loputada suud ja seejärel juua rohkelt vett. Koheselt pöörduda arsti poole.

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Püsivus ja reaktsioonivõime:

Reaktsioonivõime: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada reaktsioonivõimega seotud ohtusid.

Keemiline stabiilsus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes stabiilne.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada ohtlikke reaktsioone.

Tingimused, mida tuleb vältida: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

Ohtlikud lagusaadused: Tavapärastes ladustamis- ja kasutamistingimustes pole teada.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud:

Tõkestada ulatuslikumad lekked kogumiseks.

Piirata ja/või absorbeerida mahavoolanud toode inertsesse materjali ja asetada seejärel sobivasse mahutisse.

Vältida äravoolutorudesse, kanalisatsiooni või veetorudesse sattumist.

Koguda kõrvaldamiseks suletud ja sobivatesse mahutitesse.

Mitte panna lekkinud materjale tagasi originaalpakendisse.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Tühjad pakendid tuleb kolm korda läbi loputada enne ära viskamist

Looma nisade kuivatamiseks ja nendelt toote eemaldamiseks kasutatud paberrätikud kõrvaldada tava-/olmeprügina.

Mitte valada lahjendamata toodet kanalisatsiooni.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Ladustada ainult suletud originaalpakendis

Kaitsta külmumise eest

Mitte ladustada temperatuuril üle 30 °C

Säilivusaeg 18 kuud

6. MUU TEAVE

Puudub

7. KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKTOOTED TOOTE OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik nimetus	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Loa number	EU-0019228-0006 1–3				
Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Jood		Toimeaine	7553-56–2	231–442-4	0,3