KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/403,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019,

unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Deosan Activate BPF based on Iodine”

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 ([1]) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Diversey Europe Operations B.V. toimitti 7 päivänä heinäkuuta 2015 hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti saadakseen luvan kyseisen asetuksen liitteessä V määriteltyyn valmisteryhmään 3 kuuluvalle biosidivalmisteperheelle ”Deosan Activate BPF based on Iodine”, jäljempänä ”valmisteperhe”. Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen suostui arvioimaan hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hakemus kirjattiin numerolla BC-JN018376-30 biosidivalmisterekisteriin.

(2) Kyseinen biosidivalmisteperhe sisältää tehoaineena jodia, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon. Ottaen huomioon tehoaineen luontaiset ominaisuudet ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 ([2]) vahvistetut hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevat tieteelliset kriteerit komissio harkitsee tarvetta tarkistaa jodin, polyvinyylipyrrolidiinijodi mukaan lukien, hyväksymistä asetuksen (EU) N:o 528/2012 15 artiklan mukaisesti. Tarkistuksen lopputuloksen perusteella komissio harkitsee, onko kyseistä tehoainetta sisältäville valmisteille myönnettyjä unionin lupia tarkistettava asetuksen (EU) N:o 528/2012 48 artiklan mukaisesti.

(3) Arvioinnista vastaava toimivaltainen viranomainen lähetti 20 päivänä joulukuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti arviointiraportin ja arviointinsa päätelmät Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ”kemikaalivirasto”.

(4) Kemikaalivirasto toimitti 6 päivänä heinäkuuta 2018 komissiolle valmisteperhettä koskevan lausunnon ([3]), mukaan luettuna biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenvetoluonnos, jäljempänä ”valmisteyhteenveto”, ja lopullisen arviointiraportin valmisteperheestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Lausunnossa todetaan, että valmisteperhe kuuluu asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan s alakohdassa vahvistetun ”biosidivalmisteperheen” määritelmän piiriin, että sille voidaan myöntää unionin lupa kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – valmisteperhe täyttää kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(5) Kemikaalivirasto toimitti 17 päivänä syyskuuta 2018 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6) Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että kyseiselle biosidivalmisteperheelle on aiheellista myöntää unionin lupa.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

([1]) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2100, annettu 4 päivänä syyskuuta 2017, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevien tieteellisten kriteerien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla (EUVL L 301, 17.11.2017, s. 1).
([3]) Kemikaaliviraston lausunto, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Deosan Activate BPF based on Iodine” (ECHA/BPC/207/2018).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään yritykselle Diversey Europe Operations B.V. biosidivalmisteperhettä ”Deosan Activate BPF based on Iodine” koskeva unionin lupa lupanumerolla EU-0019228-0000.

Unionin lupa on voimassa 3 päivästä .huhtikuuta 2019 31 päivään maaliskuuta 2029.

Unionin lupa edellyttää, että liitteessä esitettyä biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevaa yhteenvetoa noudatetaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Valmisteyhteenveto biosidivalmisteperhettä varten

Deosan Activate BPF based on Iodine

Valmisteryhmä 3:Eläinten hygienia (desinfiointiaineet)

Lupanumero: EU-0019228-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0019228-0000

I OSA

ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT

1. HALLINNOLLISIA TIETOJA

1.1 **Valmisteperheen nimi**

Nimi	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2 **Tuotetyyppi(-tyypit)**

Tuotetyyppi(-tyypit)	PT03 – Eläinten hygienia

1.3 **Luvan haltija**

Luvan haltijan nimi ja osoite	Nimi	Diversey Europe Operations B.V.
	Osoite	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Alankomaat
Lupanumero	EU-0019228-0000	
Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero	EU-0019228-0000	
Luvan myöntämispäivämäärä	3. huhtikuu 2019	
Luvan voimassaolon päättymispäivämäärä	31. maaliskuu 2029	

1.4 **Biosidituotteiden valmistaja(t)**

Valmistajan nimi	Diversey Europe Operations B.V.
Valmistajan osoite	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Alankomaat
Valmistuspaikkojen sijainti	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Espanja Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Alankomaat Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Yhdistynyt kuningaskunta Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Saksa

1.5 **Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)**

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	ACF Minera SA.
Valmistajan osoite	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Valmistuspaikkojen sijainti	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	Sociedad Quimica y Minera (SQM) SA.
Valmistajan osoite	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Valmistuspaikkojen sijainti	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	Cosayach Nitratos SA.
Valmistajan osoite	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Valmistuspaikkojen sijainti	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Valmistajan osoite	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japani
Valmistuspaikkojen sijainti	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japani

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	ISE Chemicals Corporation
Valmistajan osoite	3–1, Kyobashi 1-Chome, 104–0031 Tokyo Japani
Valmistuspaikkojen sijainti	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299–3201 Chiba Japani

Tehoaine	Jodi
Valmistajan nimi	Atacama Minerals SCM
Valmistajan osoite	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Valmistuspaikkojen sijainti	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULOINTI

2.1 **Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2 **Formulointityyppi(-tyypit)**

Formulointi (formuloinnit)	AL – Kaikki muut nesteet SL – Vesiliukoinen konsentraatti GW – Vesiliukoinen geeli

II OSA

TOISEN TASON TIEDOT – VALMISTEYHTEENVETO (SPC) – META-SPC(T)

META SPC 1

1. META SPC 1 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 1 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 1 – Deosan Activate BPF – Concentrate

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–1

1.3 **Tuotetyyppi(-tyypit)**

Tuotetyyppi(-tyypit)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 1 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 1 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2 **Meta SPC 1 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulointi (formuloinnit)	SL – Vesiliukoinen konsentraatti

3. META SPC 1 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö kansallisten määräysten mukaisesti.. Hävitä pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti..

4. META SPC 1 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 1. Käyttö # 1 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen upotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 2. Käyttö # 2 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti vaahdottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) – 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti vaahdottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 3. Käyttö # 3 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen suihkutus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti suihkuttamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) – 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti suihkuttamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 4. Käyttö # 4 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä (yhteensä 5 käyttökertaa)

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5 **Käytön kuvaus**

Taulukko 5. Käyttö # 5 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.5.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.5.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6 **Käytön kuvaus**

Taulukko 6. Käyttö # 6 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen suihkutus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.6.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.6.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.6.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7 **Käytön kuvaus**

Taulukko 7. Käyttö # 7 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, automaattinen suihkutus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Automaattinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen automaattisesti suihkuttamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 5 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Ei pidä yhdistää lypsyä edeltävään desinfiointiin. Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.7.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen automaattisesti suihkuttamalla.

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

5 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Ei saa yhdistää jodipitoisella valmisteella ennen lypsyä tehtävään desinfiointiin.

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.7.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8 **Käytön kuvaus**

Taulukko 8. Käyttö # 8 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, puoliautomaattinen upotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Puoliautomaattinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.8.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.8.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9 **Käytön kuvaus**

Taulukko 9. Käyttö # 9 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa) Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.9.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa).

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.9.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10 **Käytön kuvaus**

Taulukko 10. Käyttö # 10 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa). Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.10.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa)

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.10.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11 **Käytön kuvaus**

Taulukko 11. Käyttö # 11 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen suihkutus (tiiviste)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - 1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa) Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.11.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

1,5 % jodia sisältävät valmisteet: Laimenna 1 osa valmistetta 4 osaan vettä saavuttaaksesi 0,3 % käyttöpitoisuuden jodille. Tätä ohjetta tulee muokata valmisteille, joilla on eri jodipitoisuus.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa).

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.11.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa)

Käytä sopivia suojajalkineita (EN 13832) valmistetta käsiteltäessä.

Käytettävä suojahaalaria (vähintään tyyppi 6, EN 13034)

4.11.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET [1] – META SPC 1

5.1 **Käyttöohjeet**

Valmisteen on oltava yli 20 °C:n lämpöistä ennen käyttöä.

Ennen lypsämistä:

Levitä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta.

Valmisteen on annettava vaikuttaa iholla vähintään 30 sekuntia, jotta se vaikuttaa tehokkaasti bakteereita ja hiivoja vastaan.

Poista valmiste kokonaan vaikutusajan jälkeen yhdellä talouspaperi-/kangasliinallavarmistaaksesi, että utareet ovat puhtaat ja kuivat.

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

Lypsämisen jälkeen:

Käytä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta heti lypsämisen jälkeen.

On huolehdittava, ettei valmistetta poisteta käytön jälkeen, jotta se ehtii vaikuttaa riittävästi (esim. lehmiä seisotetaan vähintään 5 minuuttia)

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Tätä valmistetta voidaan käyttää desinfiointiin ennen lypsämistä ja lypsämisen jälkeen (enintään viisi annostelukertaa eläintä ja päivää kohden). Sitä ei kuitenkaan saa käyttää yhdessä toisen jodipohjaisen desinfiointiaineen kanssa.

Annostelupumpun käyttöä suositellaan valmisteen lisäämiseksi levitysvälineeseen.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Inhalaatio: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Ihokontakti: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Silmiin joutuminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Nieleminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Inhalaation jälkeen: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan; ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee oireita.

Ihokontaktin jälkeen: Pese heti vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti.

Silmiin joutumisen jälkeen: Huuhtele avointa silmää useita minuutteja juoksevalla vedellä (vähintään 15 minuuttia).

Nielemisen jälkeen: Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä. Soita heti lääkärille.

Jos tarvitaan lääkärin apua, pidä valmisteen pakkaus tai tuoteseloste käsillä

Säilyvyys ja reaktiivisuus:

Reaktiivisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Kemiallinen stabiilisuus: Kemiallisesti stabiili normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

[1] Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 1:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Ympäristönsuojelu:

Kouru runsaiden nestevuotojen varalta.

Säilö ja/tai imeytä vuoto inerttiin materiaaliin ja sijoita sopivaan säilytysastiaan.

Estä aineen pääseminen ojaan, viemäriin tai vesistöön.

Säilö sopivaan astiaan hävittämistä varten.

Älä lisää vuotanutta materiaalia takaisin alkuperäiseen astiaan.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Tyhjät säiliöt pitää huuhdella kolmesti ennen hävittämistä

Utareiden kuivaamiseen ja tuotteen poistamiseen käytetyt paperipyyhkeet voi hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Laimentamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin.

5.5 **Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Valmiste tulee säilyttää alkuperäisessä suljetussa astiassa.

Suojaa pakkaselta

Ei saa säilyttää yli 40 asteen lämpötilassa

Säilyvyys 24 kk

6. MUUT TIEDOT

—

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 1 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Lupanumero	EU-0019228-0001 1–1				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Lupanumero	EU-0019228-0002 1–1				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	1,5

META SPC 2

1. META SPC 2 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 2 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 2 – Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–2

1.3 **Tuotetyyppi(-tyypit)**

Tuotetyyppi(-tyypit)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 2 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 2 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Meta SPC 2 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulointi (formuloinnit)	AL – Kaikki muut nesteet

3. META SPC 2 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö kansallisten määräysten mukaisesti.. Hävitä pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti..

4. META SPC 2 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 12. Käyttö # 1 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos.Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 13. Käyttö # 2 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti vaahdottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä. Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti vaahdottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä.

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 14. Käyttö # 3 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen suihkutus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti suihkuttamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä. Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti suihkuttamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä.

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 15. Käyttö # 4 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5 **Käytön kuvaus**

Taulukko 16. Käyttö # 5 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.5.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.)

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.5.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.5.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6 **Käytön kuvaus**

Taulukko 17. Käyttö # 6 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen suihkutus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.6.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.6.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.6.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.6.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7 **Käytön kuvaus**

Taulukko 18. Käyttö # 7 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, automaattinen suihkutus (ei pidä yhdistää lypsyä edeltävään desinfiointiin, käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Automaattinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen automaattisesti suihkuttamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 5 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Ei saa yhdistää jodipitoisella valmisteella ennen lypsyä tehtävään desinfiointiin. Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.7.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen automaattisesti suihkuttamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

5 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Ei saa yhdistää jodipitoisella valmisteella ennen lypsyä tehtävään desinfiointiin.

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.7.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.7.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8 **Käytön kuvaus**

Taulukko 19. Käyttö # 8 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, puoliautomaattinen upotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Puoliautomaattinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.8.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.8.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.8.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9 **Käytön kuvaus**

Taulukko 20. Käyttö # 9 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa). Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.9.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa).

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.9.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.9.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.9.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10 **Käytön kuvaus**

Taulukko 21. Käyttö # 10 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen vaahdotus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen vaahdotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa). Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.10.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti vaahdottamalla.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa).

Käytä enintään 5 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.10.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.10.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.10.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11 **Käytön kuvaus**

Taulukko 22. Käyttö # 11 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen suihkutus (käyttövalmis liuos)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen suihkutus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) – Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa). Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.11.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti suihkuttamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä liuos. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa).

Käytä enintään 15 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.11.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä tuotteen käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

Käytä sopivia suojajalkineita (EN 13832) valmistetta käsiteltäessä.

Käytettävä suojahaalaria (vähintään tyyppi 6, EN 13034).

4.11.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.11.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET ([2]) – META SPC 2

5.1 **Käyttöohjeet**

Valmisteen on oltava yli 20 °C:n lämpöistä ennen käyttöä.

Ennen lypsämistä:

Levitä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta.

Valmisteen on annettava vaikuttaa iholla vähintään 30 sekuntia, jotta se vaikuttaa tehokkaasti bakteereita ja hiivoja vastaan.

Poista valmiste kokonaan vaikutusajan jälkeen yhdellä talouspaperi-/kangasliinallavarmistaaksesi, että utareet ovat puhtaat ja kuivat.

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

([2]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 2:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

Lypsämisen jälkeen:

Käytä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta heti lypsämisen jälkeen.

On huolehdittava, ettei valmistetta poisteta käytön jälkeen, jotta se ehtii vaikuttaa riittävästi (esim. lehmiä seisotetaan vähintään 5 minuuttia)

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Tätä valmistetta voidaan käyttää desinfiointiin ennen lypsämistä ja lypsämisen jälkeen (enintään viisi annostelukertaa eläintä ja päivää kohden). Sitä ei kuitenkaan saa käyttää yhdessä toisen jodipohjaisen desinfiointiaineen kanssa.

Annostelupumpun käyttöä suositellaan valmisteen lisäämiseksi levitysvälineeseen.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Inhalaatio: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Ihokontakti: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Silmiin joutuminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Nieleminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita

Inhalaation jälkeen: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan; ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee oireita.

Ihokontaktin jälkeen: Pese heti vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti.

Silmiin joutumisen jälkeen: Huuhtele avointa silmää useita minuutteja juoksevalla vedellä (vähintään 15 minuuttia).

Nielemisen jälkeen: Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä. Soita heti lääkärille.

Jos tarvitaan lääkärin apua, pidä valmisteen pakkaus tai tuoteseloste käsillä

Säilyvyys ja reaktiivisuus:

Reaktiivisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Kemiallinen stabiilisuus: Kemiallisesti stabiili normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Ympäristönsuojelu:

Kouru runsaiden nestevuotojen varalta.

Säilö ja/tai imeytä vuoto inerttiin materiaaliin ja sijoita sopivaan säilytysastiaan.

Estä aineen pääseminen ojaan, viemäriin tai vesistöön.

Säilö sopivaan astiaan hävittämistä varten.

Älä lisää vuotanutta materiaalia takaisin alkuperäiseen astiaan.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Tyhjät säiliöt pitää huuhdella kolmesti ennen hävittämistä

Utareiden kuivaamiseen ja tuotteen poistamiseen käytetyt paperipyyhkeet voi hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Laimentamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin.

5.5 **Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Valmiste tulee säilyttää alkuperäisessä suljetussa astiassa.

Suojaa pakkaselta

Ei saa säilyttää yli 30 asteen lämpötilassa

Säilyvyys 24 kk

6. MUUT TIEDOT

—

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 2 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Lupanumero	EU-0019228-0003 1–2				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Lupanumero	EU-0019228-0004 1–2				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Lupanumero	EU-0019228-0005 1–2				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3

META SPC 3

1. META SPC 3 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1 **Meta SPC 3 – tunniste**

Tunniste	Meta SPC 3 – Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2 **Lupanumeron pääte**

Numero	1–3

1.3 **Tuotetyyppi(-tyypit)**

Tuotetyyppi(-tyypit)	PT03 – Eläinten hygienia

2. META SPC 3 – KOOSTUMUS

2.1 **Meta SPC 3 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot**

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)	
					Vähintään	Enintään
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Meta SPC 3 – formuloinnin tyyppi (tyypit)**

Formulointi (formuloinnit)	GW – Vesiliukoinen geeli

3. META SPC 3 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö kansallisten määräysten mukaisesti. Hävitä pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

4. META SPC 3 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1 **Käytön kuvaus**

Taulukko 23. Käyttö # 1 – lypsyä edeltävä desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis geeli)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä. Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä. Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.1.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.1.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.1.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2 **Käytön kuvaus**

Taulukko 24. Käyttö # 2 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis geeli)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.2.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

2–3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.2.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.2.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3 **Käytön kuvaus**

Taulukko 25. Käyttö # 3 – lypsyn jälkeinen desinfiointi, puoliautomaattinen upotus (käyttövalmis geeli)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Puoliautomaattinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen lypsämisen jälkeen. Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä. Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta.
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1,5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.3.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin lypsämisen jälkeen puoliautomaattisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa lypsyn jälkeen per eläin per päivä.

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.3.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.3.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4 **Käytön kuvaus**

Taulukko 26. Käyttö # 4 – lypsyä edeltävä ja lypsyn jälkeinen desinfiointi, manuaalinen upotus (käyttövalmis geeli)

Valmisteryhmä	PT03 – Eläinten hygienia
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	—
Kohdeorganismit (myös kehitysvaihe)	Bakteerit Hiiva
Käyttöalue	sisäkäyttö Sisätilat
Annostelutapa/-tavat	Manuaalinen upotus Utareiden desinfiointiaine, käytetään suoraan lypsyeläimeen ennen lypsämistä ja sen jälkeen. Käytetään suoraan utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia) - Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä. 3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa) Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta
Käyttäjäryhmä(t)	ammattilainen
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	1, 5 & 20 litraa, HDPE- tai f-HDPE-kanisteri 200 litraa, HDPE- tai f-HDPE-tynnyri 950 litraa, HDPE- tai f-HPDE-säiliö (IBC)

4.4.1 *Käyttökohtaiset käyttöohjeet*

Käytetään suoraan eläimen utareisiin ennen lypsämistä ja sen jälkeen manuaalisesti upottamalla.

Käyttövalmis, 0,3 % (painoprosenttia) jodia sisältävä geeli. Ei saa laimentaa ennen käyttöä.

3 käyttökertaa ennen lypsyä ja 3 kertaa sen jälkeen per eläin per päivä (enintään yhteensä 5 käyttökertaa)

Käytä enintään 10 ml valmistetta/eläin/käyttökerta

4.4.2 *Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet*

Käytä kemikaaleja kestäviä suojakäsineitä käsittelyn aikana (luvan haltija määrittää käsineiden materiaalin tuotetiedoissa).

4.4.3 *Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.4 *Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

4.4.5 *Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa*

Katso osa 5 – yleiset käyttöohjeet

5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET ([3]) – META SPC 3

5.1 **Käyttöohjeet**

Valmisteen on oltava yli 20 °C:n lämpöistä ennen käyttöä.

Ennen lypsämistä:

Levitä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta.

Valmisteen on annettava vaikuttaa iholla vähintään 30 sekuntia, jotta se vaikuttaa tehokkaasti bakteereita ja hiivoja vastaan.

Poista valmiste kokonaan vaikutusajan jälkeen yhdellä talouspaperi-/kangasliinallavarmistaaksesi, että utareet ovat puhtaat ja kuivat.

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

([3]) Tässä osiossa annetut käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa meta SPC 3:n mukaisissa sallituissa käytöissä.

Lypsämisen jälkeen:

Käytä valmistetta kuhunkin utareeseen koko pituudelta heti lypsämisen jälkeen.

On huolehdittava, ettei valmistetta poisteta käytön jälkeen, jotta se ehtii vaikuttaa riittävästi (esim. lehmiä seisotetaan vähintään 5 minuuttia)

Jodin käyttöpitoisuus 3 000 mg/kg (0,3 % painoprosenttia)

5.2 **Riskinhallintatoimet**

Tätä valmistetta voidaan käyttää desinfiointiin ennen lypsämistä ja lypsämisen jälkeen (enintään viisi annostelukertaa eläintä ja päivää kohden). Sitä ei kuitenkaan saa käyttää yhdessä toisen jodipohjaisen desinfiointiaineen kanssa.

Annostelupumpun käyttöä suositellaan valmisteen lisäämiseksi levitysvälineeseen.

5.3 **Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Inhalaatio: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Ihokontakti: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Silmiin joutuminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita.

Nieleminen: Normaalikäytössä ei ole havaittu vaikutusta tai oireita

Inhalaation jälkeen: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan; ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee oireita.

Ihokontaktin jälkeen: Pese heti vedellä ja saippualla ja huuhtele huolellisesti.

Silmiin joutumisen jälkeen: Huuhtele avointa silmää useita minuutteja juoksevalla vedellä (vähintään 15 minuuttia).

Nielemisen jälkeen: Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä.

Soita heti lääkärille. Jos tarvitaan lääkärin apua, pidä valmisteen pakkaus tai tuoteseloste käsillä

Säilyvyys ja reaktiivisuus:

Reaktiivisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Kemiallinen stabiilisuus: Kemiallisesti stabiili normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Ei tunnettuja reaktiivisuusuhkia normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vältettävät olosuhteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tiedossa normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

Ympäristönsuojelu:

Kouru runsaiden nestevuotojen varalta.

Säilö ja/tai imeytä vuoto inerttiin materiaaliin ja sijoita sopivaan säilytysastiaan.

Estä aineen pääseminen ojaan, viemäriin tai vesistöön.

Säilö sopivaan astiaan hävittämistä varten.

Älä lisää vuotanutta materiaalia takaisin alkuperäiseen astiaan.

5.4 **Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Tyhjät säiliöt pitää huuhdella kolmesti ennen hävittämistä

Utareiden kuivaamiseen ja tuotteen poistamiseen käytetyt paperipyyhkeet voi hävittää normaalin talousjätteen mukana.

Laimentamatonta valmistetta ei saa päästää viemäriin.

5.5 **Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Valmiste tulee säilyttää alkuperäisessä suljetussa astiassa.

Suojaa pakkaselta

Ei saa säilyttää yli 30 asteen lämpötilassa

Säilyvyys 18 kk

6. MUUT TIEDOT

-

7. KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 3 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1 **Kunkin yksittäisen tuotteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus**

Kauppanimi	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Lupanumero	EU-0019228-0006 1–3				
Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Jodi		Tehoaine	7553-56-2	231-442-4	0,3