PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/403

od 13. ožujka 2019.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Deosan Activate BPF based on Iodine"

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5.,

budući da:

(1) Društvo Diversey Europe Operations B.V. podnijelo je 7. srpnja 2015. zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „Deosan Activate BPF based on Iodine" (dalje u tekstu „skupina proizvoda") koja pripada vrsti proizvoda 3 kako je opisana u Prilogu V. toj uredbi. Nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine pristalo je na ocjenu zahtjeva u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Zahtjev je evidentiran pod brojem predmeta BC-JN018376-30 u registru biocidnih proizvoda.

(2) Skupina biocidnih proizvoda sadržava jod kao aktivnu tvar koja je uvrštena u popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) No 528/2012. Uzimajući u obzir intrinzična svojstva aktivne tvari i znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ([2]), Komisija će razmotriti potrebu za preispitivanjem odobrenja joda, uključujući polivinilpirolidon jod, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovisno o ishodu tog preispitivanja, Komisija će potom razmotriti je li odobrenja Unije za proizvode koji sadržavaju tu aktivnu tvar potrebno preispitati u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 20. prosinca 2017., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjeni i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija").

(4) Agencija je 6. srpnja 2018. Komisiji dostavila mišljenje ([3]), uključujući nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda iz navedene skupine biocidnih proizvoda i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012. U mišljenju se zaključuje da je skupina proizvoda obuhvaćena definicijom „skupine biocidnih proizvoda" iz članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da je prihvatljiva za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.

(5) Agencija je 17. rujna 2018. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije te stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za tu skupinu biocidnih proizvoda.

(7) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1.
([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 od 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 17.11.2017., str. 1.).
([3]) Mišljenje ECHA-a od 6. srpnja 2018. o odobrenju Unije za proizvode pod nazivom „Deosan Activate BPF based on Iodine" (ECHA/BPC/207/2018).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izdaje se odobrenje Unije društvu Diversey Europe Operations B.V. za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Deosan Activate BPF based on Iodine" s brojem odobrenja EU-0019228-0000.

Odobrenje Unije valjano je od 3. travnja 2019. do 31. ožujka 2029.

Odobrenje Unije podliježe sukladnosti sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Deosan Activate BPF based on Iodine

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0019228-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0019228-0000

I. DIO

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1 **Naziv skupine**

Naziv	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

1.3 **Nositelj odobrenja**

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Nizozemska
Broj odobrenja	EU-0019228-0000	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	EU-0019228-0000	
Datum odobrenja	3. travnja 2019.	
Datum isteka odobrenja	31. ožujka 2029.	

1.4 **Proizvođač(i) biocidnih proizvoda**

Naziv proizvođača	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa proizvođača	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht, Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italija Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid), Španjolska Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, Nizozemska Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton, Ujedinjeno Kraljevstvo Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden, Njemačka

1.5 **Proizvođači aktivnih tvari**

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	ACF Minera S.A.
Adresa proizvođača	San Martin No 499, 1100000 Iquique, Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte, Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adresa proizvođača	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago, Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa proizvođača	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago, Čile
Lokacija proizvodnih pogona	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte, Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Adresa proizvođača	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba, Japan
Lokacija proizvodnih pogona	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba, Japan

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	ISE Chemicals Corporation
Adresa proizvođača	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japan
Lokacija proizvodnih pogona	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba, Japan

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	Atacama Minerals SCM
Adresa proizvođača	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago, Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Čile

2. SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA

2.1 **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2 **Vrsta(e) formulacija**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina SL -topivi koncentrat GW - vodotopivi gel

II. DIO

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – META SAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

META SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1.1 **Identifikacijska oznaka iz meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 1**

Identifikator	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. SASTAV U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2 **Vrste formulacija u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno uranjanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje. Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) – Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda može se primijeniti sljedeće: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijenite izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji.

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinja/primjena

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno pjenjenje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijenite izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3 **Opis uporabe**

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno raspršivanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjena
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.3.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijenite izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.3.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.3.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4 **Opis uporabe**

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno uranjanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Baketrije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.4.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (ukupno 5 primjena)

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.4.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5 **Opis uporabe**

Tablica 5. Uporaba br. 5 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno pjenjenje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.5.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.5.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6 **Opis uporabe**

Tablica 6. Uporaba br. 6 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno raspršivanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.6.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.6.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.6.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7 **Opis uporabe**

Tablica 7. Uporaba br. 7 – Dezinfekcija nakon mužnje, automatsko raspršivanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Automatsko raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje. Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.7.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja.

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje na bazi joda.

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.7.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8 **Opis uporabe**

Tablica 8. Uporaba br. 8 – Dezinfekcija nakon mužnje, poluautomatsko uranjanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Poluautomatsko uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinja/primjena
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.8.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.8.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9 **Opis uporabe**

Tablica 9. Uporaba br. 9 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno uranjanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena) Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.9.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijeniti izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena).

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.9.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10 **Opis uporabe**

Tablica 10. Uporaba br. 10 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno pjenjenje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena) Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.10.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijeniti izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena).

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.10.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11 **Opis uporabe**

Tablica 11. Uporaba br. 11 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno raspršivanje (koncentrat)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.
Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena) Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.11.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za proizvode koji sadrže 1,5 % joda: Razrijedite 1 dio proizvoda na 4 dijela vode da biste postigli koncentraciju joda za primjenu od 0,3 %. Ova se uputa treba prilagoditi za proizvode s drugačijim koncentracijama.

Primijeniti izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena).

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.11.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).

Nosite odgovarajuću zaštitnu obuću (EN 13832) prilikom primjene proizvoda.

Potrebno je nositi zaštitno radno odijelo (barem tipa 6, EN 13034)

4.11.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ([1]) META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod je potrebno dovesti do temperature > 20 °C prije uporabe

Prije mužnje:

Nanijeti proizvod cijelom dužinom svake sise.

Za učinkovitu uporabu protiv bakterija i kvasaca proizvod mora ostati u dodiru s kožom najmanje 30 sekundi.

Nakon odgovarajućeg vremena kontakta temeljito uklonite proizvod jednim listom papirnatog ručnika/krpom da biste osigurali da su sise čiste i suhe.

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

Nakon mužnje:

Prekrijte cijelu dužinu svake sise proizvodom odmah nakon mužnje.

Da biste osigurali dostatno vrijeme kontakta, proizvod se ne smije uklanjati odmah nakon primjene (npr. krave trebaju ostati stajati najmanje 5 minuta)

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Ovaj se proizvod može koristiti za kombiniranu dezinfekciju prije i nakon mužnje (najviše pet puta po životinji po danu). Međutim, ne smije se koristiti u kombinaciji s drugim proizvodom na bazi joda.

Preporučuje se upotreba pumpe za doziranje za punjenje proizvoda u opremu za nanošenje

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Udisanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s kožom: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s očima: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Gutanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

U slučaju udisanja: osigurajte dovod svježeg zraka; obratite se liječniku u slučaju pojave simptoma.

U slučaju dodira s kožom: odmah operite vodom i sapunom i temeljito isperite.

U slučaju dodira s očima: ispirite otvoreno oko nekoliko minuta pod tekućom vodom (najmanje 15 minuta).

U slučaju gutanja: ispirite usta i popijte veću količinu vode. Odmah pozovite liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite mu spremnik ili naljepnicu proizvoda

Stabilnost i reaktivnost:

Reaktivnost: nisu poznate opasnosti uslijed reaktivnosti u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Kemijska stabilnost: stabilno u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Mogućnost opasnih reakcija: nisu poznate opasne reakcije u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Uvjeti koje je potrebno izbjegavati: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

([1]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

Opasni produkti razlaganja: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Ekološke mjere opreza:

nasip za sakupljanje većih izljeva.

Zaustavite daljnje izlijevanje i/ili upotrijebite inertni materijal za upijanje izljeva, zatim pohranite u prikladan spremnik.

Spriječite otjecanje u odvode, kanalizaciju ili vodne putove.

Prikupite u prikladne zatvorene spremnike radi odlaganja.

Ne vraćajte izlivene materijale u izvorni spremnik.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Prazni spremnici moraju se isprati tri puta prije odlaganja

Papirnati ručnici koji se upotrijebe za sušenje sisa životinja i uklanjanje proizvoda s njih trebaju se odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Ne izlijevajte nerazrijeđeni proizvod u kanalizaciju.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati isključivo u originalnom, zatvorenom spremniku

Zaštititi od mraza

Ne čuvati pri temperaturama iznad 40 °C

Vijek trajanja 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

Nema

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Broj odobrenja	EU-0019228-0001 1-1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Broj odobrenja	EU-0019228-0002 1-1				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,5

META SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1.1 **Identifikacijska oznaka iz meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 2**

Identifikator	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. SASTAV U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Vrste formulacija u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremniku skladu s nacionalnim propisima.

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 12. Uporaba br. 1 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 13. Uporaba br. 2 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

Primijenite izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3 **Opis uporabe**

Tablica 14. Uporaba br. 3 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.3.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.3.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.3.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4 **Opis uporabe**

Tablica 15. Uporaba br. 4 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Zatvoreni prostor
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.4.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.4.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5 **Opis uporabe**

Tablica 16. Uporaba br. 5 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.5.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda.

Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.5.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.5.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6 **Opis uporabe**

Tablica 17. Uporaba br. 6 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.6.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.6.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.6.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.6.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7 **Opis uporabe**

Tablica 18. Uporaba br. 7 – Dezinfekcija nakon mužnje, automatsko raspršivanje (ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje) (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Automatsko raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. – 5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; Ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje na bazi joda. Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.7.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; Ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje na bazi joda.

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.7.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.7.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8 **Opis uporabe**

Tablica 19. Uporaba br. 8 – Dezinfekcija nakon mužnje, poluautomatsko uranjanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Zatvoreni prostor
Načini primjene	Poluautomatsko uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.8.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda.

Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.8.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.8.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9 **Opis uporabe**

Tablica 20. Uporaba br. 9 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodama ručnog uranjanja

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.9.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodama ručnog uranjanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.9.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.9.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.9.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10 **Opis uporabe**

Tablica 21. Uporaba br. 10 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno pjenjenje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.10.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

Primijeniti izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);

Nanijeti najviše 5 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.10.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

4.10.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.10.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11 **Opis uporabe**

Tablica 22. Uporaba br. 11 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno raspršivanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinji/primjeni.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.11.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);

Nanijeti najviše 15 ml proizvoda/životinja/primjena

4.11.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

Nositi odgovarajuću zaštitnu obuću (EN 13832) prilikom primjene proizvoda.

Potrebno je nositi zaštitno radno odijelo (barem tipa 6, EN 13034).

4.11.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.11.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ([2]) META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod je potrebno dovesti do temperature > 20 °C prije uporabe

Prije mužnje:

Nanijeti proizvod cijelom dužinom svake sise.

Za učinkovitu uporabu protiv bakterija i kvasaca proizvod mora ostati u dodiru s kožom najmanje 30 sekundi.

Nakon odgovarajućeg vremena kontakta temeljito uklonite proizvod jednim listom papirnatog ručnika/krpom da biste osigurali da su sise čiste i suhe.

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([2]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

Nakon mužnje:

Prekrijte cijelu dužinu svake sise proizvodom odmah nakon mužnje.

Da biste osigurali dostatno vrijeme kontakta, proizvod se ne smije uklanjati odmah nakon primjene (npr. krave trebaju ostati stajati najmanje 5 minuta)

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Ovaj se proizvod može koristiti za kombiniranu dezinfekciju prije i nakon mužnje (najviše pet puta po životinji po danu). Međutim, ne smije se koristiti u kombinaciji s drugim proizvodom na bazi joda.

Preporučuje se upotreba pumpe za doziranje za punjenje proizvoda u opremu za nanošenje.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Udisanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s kožom: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s očima: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Gutanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

U slučaju udisanja: osigurajte dovod svježeg zraka; obratite se liječniku u slučaju pojave simptoma.

U slučaju dodira s kožom: odmah operite vodom i sapunom i temeljito isperite.

U slučaju dodira s očima: ispirite otvoreno oko nekoliko minuta pod tekućom vodom (najmanje 15 minuta).

U slučaju gutanja: ispirite usta i popijte veću količinu vode. Odmah pozovite liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite mu spremnik ili naljepnicu proizvoda

Stabilnost i reaktivnost:

Reaktivnost: nisu poznate opasnosti uslijed reaktivnosti u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Kemijska stabilnost: stabilno u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Mogućnost opasnih reakcija: nisu poznate opasne reakcije u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Uvjeti koje je potrebno izbjegavati: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Opasni produkti razlaganja: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Ekološke mjere opreza:

nasip za sakupljanje većih izljeva.

Zaustavite daljnje izlijevanje i/ili upotrijebite inertni materijal za upijanje izljeva, zatim pohranite u prikladan spremnik.

Spriječite otjecanje u odvode, kanalizaciju ili vodne putove.

Prikupite u prikladne zatvorene spremnike radi odlaganja.

Ne vraćajte izlivene materijale u izvorni spremnik.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Prazni spremnici moraju se isprati tri puta prije odlaganja

Papirnati ručnici koji se upotrijebe za sušenje sisa životinja i uklanjanje proizvoda s njih trebaju se odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Ne izlijevati nerazrijeđeni proizvod u kanalizaciju.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati isključivo u originalnom, zatvorenom spremniku

Zaštititi od mraza

Ne čuvati pri temperaturama iznad 30 °C

Vijek trajanja 24 mjeseca.

6. OSTALE INFORMACIJE

Nema

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Broj odobrenja	EU-0019228-0003 1-2				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Broj odobrenja	EU-0019228-0004 1-2				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Broj odobrenja	EU-0019228-0005 1-2				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3

META SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1.1 **Identifikacijska oznaka iz meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 3**

Identifikator	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-3

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. SASTAV U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Vrste formulacija u meta sažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Formulacija(e)	GW - vodotopivi gel

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj/spremniku skladu s nacionalnim propisima.

4. AUTORIZIRANE UPORABE IZ META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 23. Uporaba br. 1 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno uranjanje (RTU gel)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda.

Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije mužnje dnevno po životinji

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinja/primjena

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 24. Uporaba br. 2 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU gel)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji. Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

2 – 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji;

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinja/primjena.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3 **Opis uporabe**

Tablica 25. Uporaba br. 3 – Dezinfekcija nakon mužnje, poluautomatsko uranjanje (RTU gel)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Poluautomatsko uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.3.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji.

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni

4.3.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.3.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4 **Opis uporabe**

Tablica 26. Uporaba br. 4 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU gel)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Bakterije Kvasci
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Ručno uranjanje – Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje. Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.

Količine kod primjene i učestalost	Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena) Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

4.4.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom nanošenja ručnim uranjanjem. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda.

Ne razrjeđivati prije uporabe.

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);

Nanijeti najviše 10 ml proizvoda/životinji/primjeni.

4.4.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije prilikom nanošenja proizvoda uranjanjem (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).

4.4.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

4.4.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

5. OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ([3]) META SAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod je potrebno dovesti do temperature > 20 °C prije uporabe

Prije mužnje:

Nanijeti proizvod cijelom dužinom svake sise.

Za učinkovitu uporabu protiv bakterija i kvasaca proizvod mora ostati u dodiru s kožom najmanje 30 sekundi.

Nakon odgovarajućeg vremena kontakta temeljito uklonite proizvod jednim listom papirnatog ručnika/krpom da biste osigurali da su sise čiste i suhe.

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([3]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu meta sažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

Nakon mužnje:

Prekrijte cijelu dužinu svake sise proizvodom odmah nakon mužnje.

Da biste osigurali dostatno vrijeme kontakta, proizvod se ne smije uklanjati odmah nakon primjene (npr. krave trebaju ostati stajati najmanje 5 minuta)

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Ovaj se proizvod može koristiti za kombiniranu dezinfekciju prije i nakon mužnje (najviše pet puta po životinji po danu). Međutim, ne smije se koristiti u kombinaciji s drugim proizvodom na bazi joda.

Preporučuje se upotreba pumpe za doziranje za punjenje proizvoda u opremu za nanošenje.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Udisanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s kožom: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Dodir s očima: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

Gutanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

U slučaju udisanja: osigurajte dovod svježeg zraka; obratite se liječniku u slučaju pojave simptoma.

U slučaju dodira s kožom: odmah operite vodom i sapunom i temeljito isperite.

U slučaju dodira s očima: ispirite otvoreno oko nekoliko minuta pod tekućom vodom (najmanje 15 minuta).

U slučaju gutanja: ispirite usta i popijte veću količinu vode. Odmah pozovite liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite mu spremnik ili naljepnicu proizvoda

Stabilnost i reaktivnost:

Reaktivnost: nisu poznate opasnosti uslijed reaktivnosti u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Kemijska stabilnost: stabilno u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Mogućnost opasnih reakcija: nisu poznate opasne reakcije u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Uvjeti koje je potrebno izbjegavati: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Opasni produkti razlaganja: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Ekološke mjere opreza:

nasip za sakupljanje većih izljeva.

Zaustavite daljnje izlijevanje i/ili upotrijebite inertni materijal za upijanje izljeva, zatim pohranite u prikladan spremnik.

Spriječite otjecanje u odvode, kanalizaciju ili vodne putove.

Prikupite u prikladne zatvorene spremnike radi odlaganja.

Ne vraćajte izlivene materijale u izvorni spremnik.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Prazni spremnici moraju se isprati tri puta prije odlaganja

Papirnati ručnici koji se upotrijebe za sušenje sisa životinja i uklanjanje proizvoda s njih trebaju se odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.

Ne izlijevati nerazrijeđeni proizvod u kanalizaciju.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati isključivo u originalnom, zatvorenom spremniku

Zaštititi od mraza

Ne čuvati pri temperaturama iznad 30 °C

Vijek trajanja 18 mjeseci

6. OSTALE INFORMACIJE

Nema

7. TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U META SAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Broj odobrenja	EU-0019228-0006 1-3				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3