KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/403

2019 m. kovo 13 d.

kuriuo biocidinių produktų grupei „Deosan Activate BPF based on Iodine“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) 2015 m. liepos 7 d. bendrovė „Diversey Europe Operations B.V.“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupei „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (toliau – produktų grupė) (produktai priskiriami 3-io tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą. Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija sutiko įvertinti tą paraišką, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalyje. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-JN018376–30;

(2) biocidinių produktų grupėje yra jodo kaip veikliosios medžiagos, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą. Atsižvelgdama į šiai veikliajai medžiagai būdingas savybes ir į Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 ([2]) nustatytus mokslinius endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijus, Komisija apsvarstys būtinybę peržiūrėti jodo, įskaitant polivinilpirolidonjodą, patvirtinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 15 straipsnį. Priklausomai nuo tos peržiūros rezultatų, Komisija svarstys, ar produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, Sąjungos autorizacijos liudijimai turi būti peržiūrėti pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 48 straipsnį;

(3) 2017 m. gruodžio 20 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą bei jos atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2018 m. liepos 6 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([3]), įskaitant biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį. Nuomonėje padaryta išvada, kad ši produktų grupė atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte nustatytą biocidinių produktų grupės apibrėžtį, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, produktų grupė atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(5) 2018 m. rugsėjo 17 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidinių produktų grupei;

(7) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.
([2]) 2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (OL L 301, 2017 11 17, p. 1).
([3]) *ECHA opinion of 6 July 2018 on the Union authorisation of „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (ECHA/BPC/207/2018).*

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas bendrovei „Diversey Europe Operations B.V.“ biocidinių produktų grupei „Deosan Activate BPF based on Iodine“, kurios autorizacijos liudijimo numeris yra ES-0019228–0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2029 m. kovo 31 d.

Sąjungos autorizacijos liudijimas suteikiamas pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

Deosan Activate BPF based on Iodine

PT 03 – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0019228–0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0019228–0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresas	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Nyderlandai
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0000	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0019228–0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019 m. balandžio 3 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2029 m. kovo 31 d.	

1.4. **Biocidinio produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Diversey Europe Operations B.V.
Gamintojo adresas	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Nyderlandai
Gamybos vieta	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Ispanija Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Nyderlandai Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Jungtinė Karalystė Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Vokietija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	ACF Minera S.A.
Gamintojo adresas	San Martin No 499, 1100000 Iquique Čilė
Gamybos vieta	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Gamintojo adresas	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Čilė
Gamybos vieta	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Čilė

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Cosayach Nitratos S.A.
Gamintojo adresas	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Čilė
Gamybos vieta	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Gamintojo adresas	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japonija
Gamybos vieta	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japonija

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	ISE Chemicals Corporation
Gamintojo adresas	3–1, Kyobashi 1-Chome, 104–0031 Tokyo Japonija
Gamybos vieta	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299–3201 Chiba Japonija

Veiklioji medžiaga	Jodas
Gamintojo pavadinimas	Atacama Minerals SCM
Gamintojo adresas	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Čilė
Gamybos vieta	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Čilė

2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3	1,6

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis SL - Vandenyje tirpūs koncentratas GW - Vandenyje tirpus gelis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta PCS 1. Deosan Activate BPF - koncentratas

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	1,35	1,6

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius įstatymus.. talpyklą išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius įstatymus..

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Dezinfekcija prieš melžimą. Mirkymas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo, reikia naudoti taip: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudojamas tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu prieš melžimą.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Dezinfekcija prieš melžimą. Apdorojimas putomis rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudojamas tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu prieš melžimą.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Dezinfekcija prieš melžimą. Purškimas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudodami produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 %, praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad gautumėte 0,3 % naudojamą jodo koncentraciją. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudojamas tiesiai ant gyvulių spenių prieš melžimą, užpurškiant rankiniu būdu.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas tiesiai ant gyvulio spenių po melžimo, mirkant rankiniu būdu.

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (5 kartai iš viso).

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 5. Naudojimas # 5 – Dezinfekcija po melžimo. Apdorojimas putomis rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu po melžimo.

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 6. Naudojimas # 6 – Dezinfekcija po melžimo. Purškimas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskieskti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 7. Naudojimas # 7 – Dezinfekcija po melžimo. Purškimas automatiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas automatiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant automatiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskieskti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 5 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Nenaudoti, jei dezinfekuojama prieš melžimą. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant automatiniu būdu.

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

5 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Nenaudoti, jei dezinfekuojama prieš melžimą.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 8. Naudojimas # 8 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas pusiau automatiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas pusiau automatiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.

Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.8.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 9. Naudojimas # 9 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktai, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudoti prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.9.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 10. Naudojimas # 10 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Apdorojimas putomis rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktai, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.10.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 11. Naudojimas # 11 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Purškimas rankiniu būdu (koncentratas)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Naudojant produktus, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktai, kurių sudėtyje yra 1,5 % jodo: praskiesti 1 dalį produkto 4 dalimis vandens, kad susidarytų 0,3 % naudojama jodo koncentracija. Naudojant kitos koncentracijos produktus, šią instrukciją reikia adaptuoti.

Naudoti prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.11.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudodami produktą mūvėkite apsaugines, chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą nurodo leidimo turėtojas produkto informacijoje)

Naudodami produktą, avėkite tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832).

Reikia dėvėti apsauginius darbo drabužius (bent 6 tipo, EN 13034)

4.11.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

5. BENDRIEJI ([1]) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojant produktas turi sušilti iki > 20 °C

Prieš melžimą:

Kiekvieną spenį apdoroti produktu per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti efektyvų naudojimą prieš bakterijas ir mieles, produktas turi kontaktuoti su oda bent 30 sekundžių.

Praėjus reikiamam ekspozicijos laikui, kruopščiai nuvalyti produktą vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu/šluoste, kad speniai būtų švarūs ir sausi.

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

Po melžimo:

Iš karto po melžimo apdorokite produktu kiekvieną spenį per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti pakankamą kontakto laiką, reikia imtis priemonių, kad panaudotas produktas nebūtų pašalintas (pvz., palaikyti karves stovinčias bent 5 minutes)

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Šį produktą galima naudoti dezinfekcijai ir prieš melžimą, ir po jo (iš viso iki 5 kartų vienam gyvūnui per parą). Tačiau jo negalima naudoti kartu su kitomis priemonėmis jodo pagrindu.

Produktui supilti į įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Susilietus su oda: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Patekus į akis: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Prarijus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Įkvėpus: užtikrinti šviežią orą; pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti.

Patekus į akis: plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu (bent 15 minučių).

Prarijus: išskalauti burną, tuomet gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei prireikia gydytojo pagalbos, turėti produkto talpyklą arba etiketę su savimi.

Stabilumas ir reaktingumas:

Reaktingumas: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis reaktingumo pavojus nėra žinomas.

Cheminis stabilumas: stabilus įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

Pavojingų reakcijų galimybės: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nėra žinomos.

Vengtinos sąlygos: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomos.

([1]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.

Pavojingi skilimo produktai: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomi.

Ekologinės atsargumo priemonės:

Užtvenkti didesnius išsiliejusio skysčio kiekius surinkimui.

Sulaikyti ir (arba) absorbuoti išsiliejimą inertinėmis medžiagomis, tuomet surinkti į tinkamą talpyklą.

Neleisti nuotėkio į kanalizaciją, kolektorius, vandentakius.

Surinkti utilizuoti į uždaras ir tinkamas talpyklas.

Išsiliejusios medžiagos negalima grąžinti atgal į originalią talpyklą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas prieš išmetant reikia tris kartus išskalauti.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausinti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

Nepilti neskiesto produkto į kanalizaciją.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti tik originalioje, uždaroje talpykloje

Saugoti nuo užšalimo.

Nelaikyti aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje

Tinkamumo laikas – 24 mėnesiai

6. KITA INFORMACIJA

Nėra

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0001 1–1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	1,5

7.2. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0002 1–1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	1,5

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta PCS 2. Deosan Activate BPF - RTU skystis

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 SUDĖTIS

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3	0,32

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 2 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	AL - Bet koks kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius įstatymus..

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 12. Naudojimas # 1 – Dezinfekcija prieš melžimą. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudoti prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudoti prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 13. Naudojimas # 2 – Dezinfekcija prieš melžimą. apdorojimas putomis rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

Naudojama prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 14. Naudojimas # 3 – Dezinfekcija prieš melžimą. Purškimas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojama prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 15. Naudojimas # 4 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojama po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 16. Naudojimas # 5 – Dezinfekcija po melžimo. Apdorojimas putomis rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojama po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 17. Naudojimas # 6 – Dezinfekcija po melžimo. Purškimas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojama po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 18. Naudojimas # 7 – Dezinfekcija po melžimo. Purškimas automatiniu būdu (nenaudoti, jei dezinfekuojama prieš melžiant (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas automatiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant automatiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 5 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Nenaudoti, jei dezinfekuojama medžiaga jodo pagrindu prieš melžimą. Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojama po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant automatiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

5 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Nenaudoti, jei dezinfekuojama medžiaga jodo pagrindu prieš melžimą.

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.7.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 19. Naudojimas # 8 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas pusiau automatiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas pusiau atomatiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.8.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.8.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 20. Naudojimas # 9 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudoti prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.9.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.9.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.9.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 21. Naudojimas # 10 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Apdorojimas putomis rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Apdorojimas putomis rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

Naudoti prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių apdorojant putomis rankiniu būdu.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 5 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.10.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.10.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.10.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 22. Naudojimas # 11 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Purškimas rankiniu būdu (paruoštas naudoti skystis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Purškimas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių purškiant rankiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 15 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.11.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

Naudojant produktą, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832).

Reikia dėvėti apsauginius darbo drabužius (bent 6 tipo, EN 13034)

4.11.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.11.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

5. BENDRIEJI ([2]) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojant produktas turi sušilti iki > 20 °C

Prieš melžimą:

Kiekvieną spenį apdoroti produktu per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti efektyvų naudojimą prieš bakterijas ir mieles, produktas turi kontaktuoti su oda bent 30 sekundžių.

Praėjus reikiamam ekspozicijos laikui, kruopščiai nuvalyti produktą vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu/šluoste, kad speniai būtų švarūs ir sausi.

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([2]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 2.

Po melžimo:

Iš karto po melžimo apdorokite produktu kiekvieną spenį per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti pakankamą kontakto laiką, reikia imtis priemonių, kad panaudotas produktas nebūtų pašalintas (pvz., palaikyti karves stovinčias bent 5 minutes)

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Šį produktą galima naudoti dezinfekcijai ir prieš melžimą, ir po jo (iš viso iki 5 kartų vienam gyvūnui per parą). Tačiau jo negalima naudoti kartu su kitomis priemonėmis jodo pagrindu.

Produktui supilti į įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Susilietus su oda: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Patekus į akis: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Prarijus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Įkvėpus: užtikrinti šviežią orą; pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti.

Patekus į akis: plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu (bent 15 minučių).

Prarijus: išskalauti burną, tuomet gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei prireikia gydytojo pagalbos, turėti produkto talpyklą arba etiketę su savimi.

Stabilumas ir reaktingumas:

Reaktingumas: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis reaktingumo pavojus nėra žinomas.

Cheminis stabilumas: stabilus įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

Pavojingų reakcijų galimybės: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nėra žinomos.

Vengtinos sąlygos: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomos.

Pavojingi skilimo produktai: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomi.

Ekologinės atsargumo priemonės:

Užtvenkti didesnius išsiliejusio skysčio kiekius surinkimui.

Sulaikyti ir (arba) absorbuoti išsiliejimą inertinėmis medžiagomis, tuomet surinkti į tinkamą talpyklą.

Neleisti nuotėkio į kanalizaciją, kolektorius, vandentakius.

Surinkti utilizuoti į uždaras ir tinkamas talpyklas.

Išsiliejusios medžiagos negalima grąžinti atgal į originalią talpyklą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas prieš išmetant reikia tris kartus išskalauti.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausinti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

Nepilti neskiesto produkto į kanalizaciją.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti tik originalioje, uždaroje talpykloje

Saugoti nuo užšalimo.

Nelaikyti aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje

Tinkamumo laikas – 24 mėnesiai

6. KITA INFORMACIJA

Nėra

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 2

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0003 1–2				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3

7.2. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0004 1–2				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3

7.3. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0005 1–2				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta PCS 3. Deosan Activate BPF - RTU gelis

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1–3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 03 - Veterinarinė higiena

2. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 SUDĖTIS

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3	0,32

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 3 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	GW - Vandenyje tirpus gelis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius įstatymus.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 23. Naudojimas # 1 – Dezinfekcija prieš melžimą. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti gelis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš melžimą. Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas prieš melžimą tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš melžimą gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 24. Naudojimas # 2 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti gelis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

2–3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 25. Naudojimas # 3 – Dezinfekcija po melžimo. Mirkymas pusiau automatiniu būdu (paruoštas naudoti gelis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas pusiau automatiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas po melžimo. Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną. Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių mirkant pusiau automatiniu būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną.

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 26. Naudojimas # 4 – Dezinfekcija prieš ir po melžimo. Mirkymas rankiniu būdu (paruoštas naudoti gelis)

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Mirkymas rankiniu būdu Laktuojančių gyvulių spenių dezinfekantas prieš ir po melžimo. Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant. 3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso) Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1, 5 ir 20 litrų DTPE arba f-DTPE talpykla 200 litrų DTPE arba f-DTPE statinė 950 litrų DTPE arba f-DTPE vidutinės talpos konteineris (IBC)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Naudojamas prieš ir po melžimo tiesiai ant gyvulių spenių rankinio mirkymo būdu.

Paruošta naudoti formuliacija, kurios sudėtyje yra 0,3 % jodo. Neskiesti prieš naudojant.

3 kartai prieš ir 3 kartai po melžimo gyvuliui per dieną (iki 5 kartų iš viso)

Naudoti ne daugiau nei 10 ml produkto/gyvuliui/per kartą

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojant produktą – mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informaciniame lapelyje nurodo autorizacijos turėtojas)

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5 skyrių „Bendrieji naudojimo nurodymai“

5. BENDRIEJI ([3]) PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 NAUDOJIMO NURODYMAI

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Prieš naudojant produktas turi sušilti iki > 20 °C

Prieš melžimą:

Kiekvieną spenį apdoroti produktu per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti efektyvų naudojimą prieš bakterijas ir mieles, produktas turi kontaktuoti su oda bent 30 sekundžių.

Praėjus reikiamam ekspozicijos laikui, kruopščiai nuvalyti produktą vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu/šluoste, kad speniai būtų švarūs ir sausi.

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([3]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 3.

Po melžimo:

Iš karto po melžimo apdorokite produktu kiekvieną spenį per visą jo ilgį.

Siekiant užtikrinti pakankamą kontakto laiką, reikia imtis priemonių, kad panaudotas produktas nebūtų pašalintas (pvz., palaikyti karves stovinčias bent 5 minutes)

Naudojama jodo koncentracija 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Šį produktą galima naudoti dezinfekcijai ir prieš melžimą, ir po jo (iš viso iki 5 kartų vienam gyvūnui per parą). Tačiau jo negalima naudoti kartu su kitomis priemonėmis jodo pagrindu.

Produktui supilti į įrangą rekomenduojama naudoti dozavimo siurblį.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Susilietus su oda: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Patekus į akis: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Prarijus: normaliai naudojant, žinomo poveikio ar simptomų nėra.

Įkvėpus: užtikrinti šviežią orą; pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuplauti vandeniu ir muilu, kruopščiai nuskalauti.

Patekus į akis: plauti atmerktas akis kelias minutes po tekančiu vandeniu (bent 15 minučių).

Prarijus: išskalauti burną, tuomet gerti daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei prireikia gydytojo pagalbos, turėti produkto talpyklą arba etiketę su savimi.

Stabilumas ir reaktingumas:

Reaktingumas: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis reaktingumo pavojus nėra žinomas.

Cheminis stabilumas: stabilus įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

Pavojingų reakcijų galimybės: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nėra žinomos.

Vengtinos sąlygos: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomos.

Pavojingi skilimo produktai: įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis nėra žinomi.

Ekologinės atsargumo priemonės:

Užtvenkti didesnius išsiliejusio skysčio kiekius surinkimui.

Sulaikyti ir (arba) absorbuoti išsiliejimą inertinėmis medžiagomis, tuomet surinkti į tinkamą talpyklą.

Neleisti nuotėkio į kanalizaciją, kolektorius, vandentakius.

Surinkti utilizuoti į uždaras ir tinkamas talpyklas.

Išsiliejusios medžiagos negalima grąžinti atgal į originalią talpyklą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Tuščias talpyklas prieš išmetant reikia tris kartus išskalauti.

Popierinius rankšluosčius, naudotus nuvalyti produkto likučiams nuo spenių bei juos nusausinti, išmesti kartu su įprastinėmis ar buitinėmis atliekomis.

Nepilti neskiesto produkto į kanalizaciją.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti tik originalioje, uždaroje talpykloje

Saugoti nuo užšalimo.

Nelaikyti aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje

Tinkamumo laikas – 18 mėnesių

6. KITA INFORMACIJA

Nėra

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 3

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0019228–0006 1–3				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553–56–2	231–442–4	0,3