REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/403 AL COMISIEI

din 13 martie 2019

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Deosan Activate BPF based on Iodine"

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5),

întrucât:

(1) La 7 iulie 2015, Diversey Europe Operations B.V. a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide cu denumirea de „Deosan Activate BPF based on Iodine" (denumită în continuare „familia de produse"), aparținând tipului de produse 3, astfel cum este descris în anexa V la regulamentul respectiv. Autoritatea competentă din Regatul Unit a fost de acord să evalueze cererea astfel cum se menționează la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-JN018376-30 în Registrul produselor biocide.

(2) Familia de produse biocide conține iodul ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Ținând seama de proprietățile intrinseci ale substanței active și de criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei ([2]), Comisia va examina necesitatea de a revizui aprobarea iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În funcție de rezultatul respectivei revizuiri, Comisia va analiza dacă autorizațiile Uniunii pentru produse care conțin substanța activă trebuie să fie revizuite în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3) La 20 decembrie 2017, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția").

(4) La 6 iulie 2018, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([3]), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP") al familiei de produse și raportul final de evaluare privind familia de produse în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Avizul a concluzionat că familia de produse se încadrează în definiția pentru „familia de produse biocide" prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din acel regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, familia de produse îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

(5) La 17 septembrie 2018, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
([2]) Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 17.11.2017, p. 1).
([3]) Avizul ECHA din 6 iulie 2018 cu privire la acordarea autorizației Uniunii pentru „Deosan Activate BPF based on Iodine" (ECHA/BPC/207/2018).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă o autorizație a Uniunii societății Diversey Europe Operations B.V. pentru familia de produse biocide „Deosan Activate BPF based on Iodine" cu numărul de autorizație EU-0019228-0000.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 3 aprilie 2019 până la 31 martie 2029.

Autorizația Uniunii este condiționată de respectarea rezumatului caracteristicilor produsului biocid care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Deosan Activate BPF based on Iodine

TP 03 - Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0019228-0000

Numărul curent R4BP: EU-0019228-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Nume	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

1.3. **Detinatorul autorizației**

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Țările de Jos
Numărul curent	EU-0019228-0000	
Numărul de referință activ R4BP 3	EU-0019228-0000	
Data autorizației	3 aprilie 2019	
Data de expirare a autorizației	31 martie 2029	

1.4. **Producătorul (Producătorii) produselor biocide**

Denumirea producătorului	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa producătorului	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spania Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Țările de Jos Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Regatul Unit Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Germania

1.5. **Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	ACF Minera S.A.
Adresa producătorului	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Adresa locurilor de producție	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adresa producătorului	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa producătorului	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Adresa producătorului	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japonia
Adresa locurilor de producție	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japonia

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	ISE Chemicals Corporation
Adresa producătorului	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japonia
Adresa locurilor de producție	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japonia

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Atacama Minerals SCM
Adresa producătorului	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Adresa locurilor de producție	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDITIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. **Forma (formele) de conditionare**

Formulare (formulări)	AL - Orice alt lichid E - concentrat solubil GW - gel solubil în apă

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

Identificator	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

Formulare (formulări)	E - concentrat solubil

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați conținutul la în conformitate cu regulamentele nationale.. Aruncați recipientul la în conformitate cu regulamentele naționale. Evitați dispersarea în mediu.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1. Utilizare # 1 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Imersiune manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante. Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod, aceasta poate fi: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2. Utilizare # 2 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Înspumare manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere, în cazul animalelor lactante. Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi Aplicați cel mult 5 ml/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător..

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 3. Utilizare # 3 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Aplicarea manuală a spray-ului (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod, Diluați 1 parte produs cu 4 părți apă pentru a obține 0,3 % concentrație de iod pentru utilizare. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător..

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicaren

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 4. Utilizare # 4 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa muls în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (5 în total)

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5. **Modul de utilizare**

Tabelul 5. Utilizare # 5 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Înspumare manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa muls, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6. **Modul de utilizare**

Tabelul 6. Utilizare # 6 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Aplicarea manuală a spray-ului (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mameloanelor, pentru aplicare directă, dupa muls, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mamelonul animalului după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicaren

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

in timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.6.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7. **Modul de utilizare**

Tabelul 7. Utilizare # 7 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Aplicarea automatizată a spray-ului (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea automatizată a spray-ului Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectarea pre-mulgere. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului.

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectare pre-mulgere pe bază de iod.

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8. **Modul de utilizare**

Tabelul 8. Utilizare # 8 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune semi-automatizată (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Semi-automatic dipping Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9. **Modul de utilizare**

Tabelul 9. Utilizare # 9 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Imersiune manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte si dupa mulgere în cazul animalelor lactante, Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi (până la 5 în total) Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi (până la 5 în total)

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10. **Modul de utilizare**

Tabelul 10. Utilizare # 10 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Înspumare manuală (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă înainte și după mulgere, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda înspumării manuale
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total) Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

Aplicare directă pe ugerul animalului înainte și după mulgere, prin metoda înspumării manuale

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi (până la 5 în total)

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11. **Modul de utilizare**

Tabelul 11. Utilizare # 11 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Aplicarea manuală a spray-ului (concentrat)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mamelon, pentru aplicare directă, înainte și după mulgere in cazul animalelor lactante. Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.
Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total) Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru produse ce conțin 1,5 % iod: Diluați 1 parte produs în 4 părți apă pentru a obține o concentrație de iod pentru utilizare de 0,3 %. Pentru produse cu alte concentrații, această indicație trebuie adaptată corespunzător.

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total)

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

Purtați încălțăminte de protecție adecvată (EN 13832) atunci când aplicați produsul.

Purtarea unei salopete de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034) este obligatorie

4.11.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([1]) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Acest produs trebuie adus la o temperatură de > 20 °C înainte de utilizare

Pre-mulgere:

Aplicați produsul pe întreaga suprafața a fiecarui mamelon.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și a drojdiilor, produsul trebuie mentinut in contact cu pielea cel puțin 30 de secunde.

După timpul de contact adecvat, îndepărtați bine produsul, utilizând un prosop de hârtie/cârpă pentru a vă asigura că mameloanele sunt curate și uscate.

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

Post-mulgere:

Acoperiți toată suprafața fiecarui mamelon cu produs imediat după mulgere.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie asigurat faptul că produsul nu este îndepărtat după aplicare (de exemplu mențineți vaca în picioare cel puțin 5 minute)

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea înainte și după muls în combinație (până la 5 aplicații în total per animal pe zi). Totuși, el nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

Este recomandată utilizarea unei pompe dozatoare pentru introducerea produsul în echipamentul de aplicare.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Inhalare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Ingerare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală

După inhalare: Inspirati aer curat; consultați un medic dacă apar simptome.

După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub apă curgătoare (cel puțin 15 minute).

După ingerare: Clătiți-vă gura și beți foarte multă apă. Sunați imediat un medic.

Dacă este necesar sfatul unui medic, asigurați-vă că aveți recipientul sau eticheta produsului la îndemână

Stabilitate și reactivitate:

Reactivitate: Nu sunt cunoscute riscuri de reactivitate în condiții normale de utilizare și depozitare.

Stabilitate chimică: Stabil în condiții normal de utilizare și depozitare.

Posibilitatea reacțiilor periculoase: Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

Condiții ce trebuie evitate: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

Produși de descompunere periculoși: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Măsuri de precauție de mediu:

Un șanț pentru colectarea scurgerilor mai mari de lichid.

Limitați și/sau ștergeți scurgerile cu un material inert, apoi puneți-l într-un recipient adecvat.

Preveniți scurgerea excesiva de lichid în scurgeri, canale colectoare sau cursuri de apă.

Colectați în recipiente închise și adecvate pentru eliminare.

Nu puneți materialele scurse înapoi în recipientul original.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Recipientele goale trebuie clătite de trei ori înainte de eliminare

Prosoapele de hârtie utilizate pentru ștergerea animalului și pentru îndepărtarea produsului trebuie eliminate ca deșeu casnic/normal.

Nu aruncați produs nediluat în canale colectoare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați produsul numai în recipientul original, închis

Protejați împotriva înghețului

Nu depozitați la temperaturi peste 40 °C

Dată de valabilitate 24 de luni

6. ALTE INFORMAȚII

Niciunul/una

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Numărul curent	EU-0019228-0001 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Numărul curent	EU-0019228-0002 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	1,5

META-RCP 2

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

Identificator	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 2

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

Formulare (formulări)	AL - Orice alt lichid

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2

Fraze de pericol	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. Aruncați conținutul la în conformitate cu regulamentele naționale. Aruncați recipientul la în conformitate cu regulamentele naționale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 12. Utilizare # 1 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere in cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 13. Utilizare # 2 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mamelone, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda înspumării manuale.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 14. Utilizare # 3 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior indoor
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 15. Utilizare # 4 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe ugerul animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5. **Modul de utilizare**

Tabelul 16. Utilizare # 5 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanelel animalului după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.5.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6. **Modul de utilizare**

Tabelul 17. Utilizare # 6 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mameloanelor, pentru aplicare directă dupa mulgere, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicaren

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.6.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.6.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7. **Modul de utilizare**

Tabelul 18. Utilizare # 7 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Aplicarea automatizată a spray-ului (a nu se combina cu dezinfectarea pre-mulgere) (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea automatizată a spray-ului Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectare pre-mulgere pe bază de iod. Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda aplicării automatizate a spray-ului.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

5 aplicări post-mulgere, per animal, per zi. A nu se combina cu dezinfectare pre-mulgere pe bază de iod.

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.7.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8. **Modul de utilizare**

Tabelul 19. Utilizare # 8 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune semi-automatizată (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Semi-automatic dipping Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanle animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate..

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.8.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9. **Modul de utilizare**

Tabelul 20. Utilizare # 9 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Imersiune manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă înainte și după mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total).

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.9.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.9.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10. **Modul de utilizare**

Tabelul 21. Utilizare # 10 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Înspumare manuală (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Înspumare manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte și după mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.10.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda înspumării manuale.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total).

Aplicați cel mult 5 ml produs/animal/aplicare

4.10.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.10.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.10.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11. **Modul de utilizare**

Tabelul 22. Utilizare # 11 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Aplicarea manuală a spray-ului (lichid RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicarea manuală a spray-ului Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă înainte și după mulgere, în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total). Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.11.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda aplicării manuale a spray-ului.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi (până la 5 în total).

Aplicați cel mult 15 ml produs/animal/aplicare

4.11.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

Purtați încălțăminte de protecție adecvată (EN 13832) atunci când aplicați produsul.

Purtarea unei salopete de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034) este obligatorie

4.11.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.11.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([2]) ALE META-RCP-ULUI 2

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Acest produs trebuie adus la o temperatură de > 20 °C înainte de utilizare

Pre-mulgere:

Aplicați produsul pe întreaga suprafața a fiecarui mamelon.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și a drojdiilor, produsul trebuie mentinut in contact cu pielea cel puțin 30 de secunde.

După timpul de contact adecvat, îndepărtați bine produsul, utilizând un prosop de hârtie/cârpă pentru a vă asigura că mameloanele sunt curate și uscate.

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

Post-mulgere:

Acoperiți toată suprafața fiecarui mamelon cu produs imediat după mulgere.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie asigurat faptul că produsul nu este îndepărtat după aplicare (de exemplu mențineți vaca în picioare cel puțin 5 minute)

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea înainte și după muls în combinație (până la 5 aplicații în total per animal pe zi). Totuși, el nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

Este recomandată utilizarea unei pompe dozatoare pentru introducerea produsul în echipamentul de aplicare.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Inhalare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Ingerare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală

După inhalare: Inspirati aer curat; consultați un medic dacă apar simptome.

După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub apă curgătoare (cel puțin 15 minute).

După ingerare: Clătiți-vă gura și beți foarte multă apă. Sunați imediat un medic.

Dacă este necesar sfatul unui medic, asigurați-vă că aveți recipientul sau eticheta produsului la îndemână

Stabilitate și reactivitate:

Reactivitate: Nu sunt cunoscute riscuri de reactivitate în condiții normale de utilizare și depozitare.

Stabilitate chimică: Stabil în condiții normal de utilizare și depozitare.

Posibilitatea reacțiilor periculoase: Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

Condiții ce trebuie evitate: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Produși de descompunere periculoși: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Măsuri de precauție de mediu:

Un șanț pentru colectarea scurgerilor mai mari de lichid.

Limitați și/sau ștergeți scurgerile cu un material inert, apoi puneți-l într-un recipient adecvat.

Preveniți scurgerea excesiva de lichid în scurgeri, canale colectoare sau cursuri de apă.

Colectați în recipiente închise și adecvate pentru eliminare.

Nu puneți materialele scurse înapoi în recipientul original.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Recipientele goale trebuie clătite de trei ori înainte de eliminare

Prosoapele de hârtie utilizate pentru ștergerea animalului și pentru îndepărtarea produsului trebuie eliminate ca deșeu casnic/normal.

Nu aruncați produs nediluat în canale colectoare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați produsul numai în recipientul original, închis

Protejați împotriva înghețului

Nu depozitați la temperaturi peste 30 °C

Dată de valabilitate 24 de luni

6. ALTE INFORMAȚII

Niciunul/una

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Numărul curent	EU-0019228-0003 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Numărul curent	EU-0019228-0004 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Numărul curent	EU-0019228-0005 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3

META-RCP 3

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3

1.1. **Identificator Meta-RCP 3**

Identificator	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 3

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

Formulare (formulări)	GW - gel solubil în apă

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3

Fraze de pericol	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. Aruncați conținutul la în conformitate cu regulamentele naționale. Aruncați recipientul la în conformitate cu regulamentele naționale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 23. Utilizare # 1 – Dezinfectia mameloanelor inainte de muls, Imersiune manuală (gel RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte de mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte de mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere, per animal, pe zi.

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 24. Utilizare # 2 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune manuală (gel RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

2-3 aplicări post-mulgere, per animal, per zi.

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 25. Utilizare # 3 – Dezinfectia mameloanelor dupa muls, Imersiune semi-automatizată (gel RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Semi-automatic dipping Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, dupa mulgere în cazul animalelor lactante Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi. Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului după mulgere, prin metoda imersiunii semi-automatizate.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi.

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 26. Utilizare # 4 – Dezinfectia mameloanelor inainte si dupa muls, Imersiune manuală (gel RTU)

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Drojdie
Domeniul de utilizare	de interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Imersiune manuală Dezinfectant mameloane, pentru aplicare directă, înainte și după mulgere în cazul animalelor lactante. Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Ratele și frecvența de aplicare	În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare. 3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi (până la 5 în total) Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	canistră de 1, 5 și 20 litri de HDPE sau f-HDPE canistră de 200 litri de HDPE sau f-HDPE recipient vrac (IBC) de 950 litri de HDPE sau f-HDPE

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicare directă pe mameloanele animalului înainte și după mulgere, prin metoda imersiunii manuale.

Formulă gata de utilizare ce conține 0,3 % w/w iod. Nu diluați înainte de utilizare.

3 aplicări pre-mulgere și 3 aplicări post-mulgere, per animal, pe zi (până la 5 în total)

Aplicați cel mult 10 ml produs/animal/aplicare

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

In timpul manipularii produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (tipul materialului mănușilor trebuie specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor de produs)

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare.

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați Secțiunea 5 - Indicații generale de utilizare

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([3]) ALE META-RCP-ULUI 3

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Acest produs trebuie adus la o temperatură de > 20 °C înainte de utilizare

Pre-mulgere:

Aplicați produsul pe întreaga suprafața a fiecarui mamelon.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și a drojdiilor, produsul trebuie mentinut in contact cu pielea cel puțin 30 de secunde.

După timpul de contact adecvat, îndepărtați bine produsul, utilizând un prosop de hârtie/cârpă pentru a vă asigura că mameloanele sunt curate și uscate.

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

Post-mulgere:

Acoperiți toată suprafața fiecarui mamelon cu produs imediat după mulgere.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie asigurat faptul că produsul nu este îndepărtat după aplicare (de exemplu mențineți vaca în picioare cel puțin 5 minute)

În cadrul utilizării, concentrație de iod de 3 000 mg/kg (0,3 % w/w)

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfectarea înainte și după muls în combinație (până la 5 aplicații în total per animal pe zi). Totuși, el nu trebuie utilizat în combinație cu un produs diferit pe bază de iod.

Este recomandată utilizarea unei pompe dozatoare pentru introducerea produsul în echipamentul de aplicare.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Inhalare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală.

Ingerare: Nu se cunosc efecte sau simptome în utilizarea normală

După inhalare: Inspirati aer curat; consultați un medic dacă apar simptome.

După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub apă curgătoare (cel puțin 15 minute).

După ingerare: Clătiți-vă gura și beți foarte multă apă. Sunați imediat un medic.

Dacă este necesar sfatul unui medic, asigurați-vă că aveți recipientul sau eticheta produsului la îndemână

Stabilitate și reactivitate:

Reactivitate: Nu sunt cunoscute riscuri de reactivitate în condiții normale de utilizare și depozitare.

Stabilitate chimică: Stabil în condiții normal de utilizare și depozitare.

Posibilitatea reacțiilor periculoase: Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare și depozitare.

Condiții ce trebuie evitate: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Produși de descompunere periculoși: Nu se cunosc în condiții normale de utilizare și depozitare.

Măsuri de precauție de mediu:

Un șanț pentru colectarea scurgerilor mai mari de lichid.

Limitați și/sau ștergeți scurgerile cu un material inert, apoi puneți-l într-un recipient adecvat.

Preveniți scurgerea excesiva de lichid în scurgeri, canale colectoare sau cursuri de apă.

Colectați în recipiente închise și adecvate pentru eliminare.

Nu puneți materialele scurse înapoi în recipientul original.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Recipientele goale trebuie clătite de trei ori înainte de eliminare

Prosoapele de hârtie utilizate pentru ștergerea animalului și pentru îndepărtarea produsului trebuie eliminate ca deșeu casnic/normal.

Nu aruncați produs nediluat în canale colectoare.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Păstrați produsul numai în recipientul original, închis

Protejați împotriva înghețului

Nu depozitați la temperaturi peste 30 °C

Dată de valabilitate 18 de luni

6. ALTE INFORMAȚII

Niciunul/una

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Numărul curent	EU-0019228-0006 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3