KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/403

av den 13 mars 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Deosan Activate BPF based on Iodine

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1) Den 7 juli 2015 lämnade Diversey Europe Operations B.V. in enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Deosan Activate BPF based on Iodine (nedan kallad *produktfamiljen*) i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket gick med på att utvärdera ansökan enligt artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med nummer BC-JN018376-30 i registret över biocidprodukter.

(2) Biocidproduktfamiljen innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 ([2]) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 20 december 2017 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad *kemikaliemyndigheten*).

(4) Den 6 juli 2018 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([3]) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för produktfamiljen och den slutliga bedömningsrapporten om produktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att produktfamiljen omfattas av definitionen av biocidproduktfamilj i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att produktfamiljen, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

(5) Den 17 september 2018 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).
([3]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 6 juli 2018 om unionsgodkännande av Deosan Activate BPF based on Iodine (ECHA/BPC/207/2018).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Diversey Europe Operations B.V. beviljas unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Deosan Activate BPF based on Iodine med godkännandenummer EU-0019228-0000.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 3 april 2019 till och med den 31 mars 2029.

Unionsgodkännandet beviljas under förutsättning att villkoren i sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 mars 2019.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Deosan Activate BPF based on Iodine

PT 03 - Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0019228-0000

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3): EU-0019228-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Familjenamn**

Namn	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

1.3 **Innehavare av produktgodkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Diversey Europe Operations B.V.
	Adress	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Nederländerna
Godkännandenummer	EU-0019228-0000	
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	EU-0019228-0000	
Datum för godkännande	3 april 2019	
Utgångsdatum för godkännande	31 mars 2029	

1.4 **Tillverkare av biocidprodukter**

Tillverkarens namn	Diversey Europe Operations B.V.
Tillverkarens adress	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Nederländerna
Tillverkningsställe(n)	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Nederländerna Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Storbritannien Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Tyskland

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	ACF Minera SA.
Tillverkarens adress	San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile
Tillverkningsställe(n)	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Sociedad Quimica y Minera (SQM) SA.
Tillverkarens adress	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Cosayach Nitratos SA.
Tillverkarens adress	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Tillverkarens adress	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japan
Tillverkningsställe(n)	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299–4205 Chiba Japan

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	ISE Chemicals Corporation
Tillverkarens adress	3–1, Kyobashi 1-Chome, 104–0031 Tokyo Japan
Tillverkningsställe(n)	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299–3201 Chiba Japan

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Atacama Minerals SCM
Tillverkarens adress	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile
Tillverkningsställe(n)	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor SL - Lösligt koncentrat GW - Vattenlöslig gel

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Formulering(ar)	SL - Lösligt koncentrat

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till enligt nationella föreskrifter. behållaren lämnas till enligt nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 1. Användning # 1– Desinfektion före mjölkning, Manuell doppning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning Appliceras direkt på djurspenen före mjölkning via manuell doppning
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt). - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. –

Applicera direkt på djurspenar före mjölkning genom manuell doppning

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag

Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 2. Användning # 2– Desinfektion före mjölkning, Manuell skumning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell skumningsmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt)– För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 5 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

Applicera direkt på djurspenar före mjölkning via manuell skumning.

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag

Applicera högst 5 ml spädd produkt / djur / applicering

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 3. Användning # 3– Desinfektion före mjölkning, Manuell sprejning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

Applicera direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag

Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen)

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4 **Bruksanvisning**

Tabell 4. Användning # 4– Desinfektion efter mjölkning, Manuell doppning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag (totalt 5 appliceringar.)

Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5 **Bruksanvisning**

Tabell 5. Användning # 5– Desinfektion efter mjölkning, Manuell skumning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt– För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 5 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 5ml spädd produkt / djur / applicering.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6 **Bruksanvisning**

Tabell 6. Användning # 6 – Desinfektion efter mjölkning, Manuell sprejning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produktermed annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag

Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / gång

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial skall specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7 **Bruksanvisning**

Tabell 7. Användning # 7– Desinfektion efter mjölkning, Automatisk sprejning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Automatisk sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via automatisk sprejmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt)– För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas 5 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Ej i kombination med jod baserad desinfektion före mjölkning Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djur spenar efter mjölkning via automatisk sprejmetod.

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

5 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Ej i kombination med jod baserad desinfektion före mjölkning.

Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8 **Bruksanvisning**

Tabell 8. Användning # 8– Desinfektion efter mjölkning, halvautomatisk doppning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Halvautomatisk doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt)– För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9 **Bruksanvisning**

Tabell 9. Användning # 9– Desinfektion före och efter mjölkning, manuell doppning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppning
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt)– För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt). Applicera högst 10 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

Applicera direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppning.

Applicera 3 gånger före och 3 gånger efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10 **Bruksanvisning**

Tabell 10. Användning # 10– Desinfektion före och efter mjölkning, Manuell skumning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt). Applicera högst 5 ml spädd produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkters om innehåller1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

Applicera direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 5 ml spädd produkt / djur / applicering

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11 **Bruksanvisning**

Tabell 11. Användning # 11– Desinfektion före och efter mjölkning, Manuell sprejning (koncentrat)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprejmetod.
Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt). Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

För produkter som innehåller 1,5 % jod: Späd 1 del av produkten med 4 delar vatten för att uppnå 0,3 % jod i brukslösning. För produkter med annan koncentration bör denna instruktion anpassas.

Applicera direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprejmetod.

3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 15 ml spädd produkt / djur / applicering

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial skall specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen)

Använd skyddande skor/stövlar (EN 13832) vid appliceringen av produkten.

En skyddande overall (minst typ 6, EN 13034) bör användas.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([1]) FÖR META-SPC 1

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste uppnå en temperatur > 20 °C före användning

Före mjölkning:

Applicera produkten så att varje spene täcks.

För effektiv användning mot bakterier och jäst, måste produkten lämnas i kontakt med huden i minst 30 sekunder.

Efter lämplig kontakttid, ta bort produkten noggrant, med en juverduk för engångsbruk / trasa för att säkerställa att spenarna är rena och torra.

Brukslösningens jod-koncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

Efter mjölkning:

Behandla varje spene i sin helhet med produkten, omedelbart efter mjölkning.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid bör ombesörjas att produkten inte avlägsnas efter applicering (t ex håll korna stående minst 5 minuter).

Brukslösningens jod-koncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination (upp till 5 behandlingar per djur och dag). Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen rekommenderas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Inandning: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Ögonkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Förtäring: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter förtäring: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart till läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktförpackning eller etikett tillhands

Stabilitet och reaktivitet:

Reaktivitet:Inga reaktionsrisker kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förvarings- och användningsförhållanden.

Risk för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända under normala lagrings- och användningsförhållanden.

Förhållanden som ska undvikas: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

([1]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Fördämning för att samla större vätskespill

Bind och / eller absorbera spill med inert material och placera sedan i lämplig behållare.

Förhindra utsläpp från att komma in i avlopp, kloaker eller vattendrag.

Samla in i slutna och lämpliga behållare för bortskaffande.

Placera inte spillt material tillbaka i originalförpackningen.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Tomma behållare måste sköljas tre gånger före bortskaffande

Juverdukar i engångsmaterial / papper som används för att torka djurspenar och avlägsna produkten från dem bör kasseras som vanligt/hushållsavfall.

Förhindra utsläpp av outspädd produkt till avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvara endast i sluten originalbehållare.

Skydda mot frost.

Förvaras inte vid temperaturer över 40 °C.

Hållbarhet 24 månader.

6. ÖVRIG INFORMATION

Ingen

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Godkännandenummer	EU-0019228-0001 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Godkännandenummer	EU-0019228-0002 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,5

META-SPC 2

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till enligt nationella föreskrifter. behållaren lämnas till enligt nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 12. Användning # 1– Desinfektion före mjölkning, manuell doppning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppning.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt). - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 13. Användning # 2– Desinfektion före mjölkning, manuell skumning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell skumningsmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. –

Applicera direkt på djurspenar före mjölkning via manuell skumning.

3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag.

Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 14. Användning # 3– Desinfektion före mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell sprejmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna viillkor för användning

4.4 **Bruksanvisning**

Tabell 15. Användning # 4– Desinfektion efter mjölkning, manuell doppning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5 **Bruksanvisning**

Tabell 16. Användning # 5– Desinfektion efter mjölkning, manuell skumning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6 **Bruksanvisning**

Tabell 17. Användning # 6– Desinfektion efter mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell sprejmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen)

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7 **Bruksanvisning**

Tabell 18. Användning # 7– Desinfektion efter mjölkning, automatisk sprejning (får inte kombineras med desinfektion före mjölkning) (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Automatisk sprejning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via automatisk sprutmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning 5 appliceringar före mjölkning per djur, per dag. Ej i kombination med jodbaserad desinfektion före mjölkning. Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via automatisk sprejmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

5 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Ej kombinerad med jodbaserad desinfektion före mjölkning.

Applicera högst 15 ml produkt / djur / applicering.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8 **Bruksanvisning**

Tabell 19. Användning # 8– Desinfektion efter mjölkning, halvautomatisk doppning (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Halvautomatisk doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar efter mjölkning per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9 **Bruksanvisning**

Tabell 20. Användning # 9– Desinfektion före och efter mjölkning, manuell doppning (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppning.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upptill 5 appliceringar totalt). Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 10 ml produkt/djur/applicering.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkt hanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10 **Bruksanvisning**

Tabell 21. Användning # 10– Desinfektion före och efter mjölkning, manuell skumning (RTU-vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell skumning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt). Applicera högst 5 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

Applicera direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell skumningsmetod.

3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 5 ml produkt/djur/applicering.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11 **Bruksanvisning**

Tabell 22. Användning # 11– Desinfektion före och efter mjölkning, manuell sprejning (RTU vätska)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell sprejning Spendesinfektionsmedel, för direktapplicering på lakterande djur före och efter mjölkning. Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprejmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt). Applicera högst 15 ml produkt/djur/applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell sprutmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte ut före användning.

3 appliceringar före och 3efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt).

Applicera högst 15 ml produkt /djur/applicering.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen.)

Använd lämpliga skyddsskor (EN 13832) vid applicering av produkten.

En skyddsoverall (minst typ 6, EN 13034) ska bäras.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([2]) FÖR META-SPC 2

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste uppnå en temperatur > 20 °C före användning

Före mjölkning:

Applicera produkten så att varje spene täcks.

För effektiv användning mot bakterier och jäst, måste produkten lämnas i kontakt med huden i minst 30 sekunder.

Efter lämplig kontakttid, ta bort produkten noggrant, med en juverduk för engångs bruk / trasa för att säkerställa att spenarna är rena och torra.

Brukslösningens jod-koncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

([2]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

Efter mjölkning:

Behandla varje spene i sin helhet med produkten, omedelbart efter mjölkning.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid bör ombesörjas att produkten inte avlägsnas efter applicering (t ex håll korna stående minst 5 minuter).

Brukslösningens jod-koncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination (upp till 5 behandlingar per djur och dag). Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen rekommenderas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Inandning: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Ögonkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Förtäring: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vidsymptom.

Efter hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst15minuter).

Efter förtäring: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart till läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktförpackning eller etikett till hands

Stabilitet och reaktivitet:

Reaktivitet: Inga reaktionsrisker kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förvarings- och användningsförhållanden.

Risk för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända under normala lagrings- och användningsförhållanden.

Förhållanden som ska undvikas: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Valla in för att samla större vätskespill.

Samla upp och/eller absorbera spill med inert material och placera sedan i lämplig behållare.

Förhindra utsläpp från att komma in i avlopp, kloak eller vattendrag.

Samlas i slutna och lämpliga behållare för bortskaffande.

Placera inte spillt material tillbaka i originalbehållaren.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Tomma behållare måste sköljas tre gånger före bortskaffande.

Juverdukar i engångsmaterial / papper som används för att torka djurspenar och avlägsna produkten från dem bör kasseras som vanligt/hushållsavfall.

Förhindra utsläpp av outspädd produkt till avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvara endast i sluten originalbehållare

Skydda mot frost

Förvaras inte vid temperaturer över 30 °C

Hållbarhet 24 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

Ingen

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Godkännandenummer	EU-0019228-0003 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Godkännandenummer	EU-0019228-0004 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Godkännandenummer	EU-0019228-0005 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3

META-SPC 3

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Formulering(ar)	GW - Vattenlöslig gel

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet lämnas till enligt nationella föreskrifter. behållaren lämnas till enligt nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 23. Användning # 1– Desinfektion före mjölkning, Manuell doppning (RTU gel)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppningsmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDE IBC (Intermediate Bulk Container) behållare

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före mjölkning via manuell doppningsmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt/vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar före mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 24. Användning # 2– Desinfektion efter mjölkning, Manuell doppning (RTU-gel)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDEIBC (Intermediate Bulk Container) behållare.

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via manuell doppning.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

2–3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 25. Användning # 3– Desinfektion efter mjölkning, Halvautomatisk doppning (RTU-gel)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Halvautomatisk doppning Spendesinfektionsmedel för direkt applicering på mjölkproducerande djur efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag. Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDEIBC (Intermediate Bulk Container) behållare.

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar efter mjölkning via halvautomatisk doppmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar efter mjölkning, per djur, per dag.

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4 **Bruksanvisning**

Tabell 26. Användning # 4– Desinfektion före och efter mjölkning, manuell doppning (RTU-gel)

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterie Jäst
Användningsområde	Inomhus Inomhus
Appliceringsmetod	Manuell doppning Spendesinfektionsmedel, för direkt applicering på mjölkproducerande djur före och efter mjölkning Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppningsmetod.

Dosering(ar) och frekvens	Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt) - Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning. 3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt) Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1, 5 och 20 liter HDPE eller F-HDPE behållare 200 liter HDPE eller f-HDPE fat 950 liter HDPE eller f-HPDEIBC (Intermediate Bulk Container) behållare.

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Appliceras direkt på djurspenar före och efter mjölkning via manuell doppningsmetod.

Bruksfärdig formulering innehållande 0,3 % vikt / vikt jod. Späd inte före användning.

3 appliceringar före och 3 efter mjölkning, per djur, per dag (upp till 5 appliceringar totalt)

Applicera högst 10 ml produkt / djur / applicering.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta handskar under produkthanteringsfasen (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se avsnitt 5 - Allmänna villkor för användning

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([3]) FÖR META-SPC 3

5.1 **Bruksanvisning**

Produkten måste uppnå en temperatur > 20 °C före användning

Före mjölkning:

Applicera produkten på hela spenen.

För effektiv användning mot bakterier och jäst, måste produkten lämnas i kontakt med huden i minst 30 sekunder.

Efter lämplig kontakttid, ta bort produkten noggrant, med en juverduk för engångsbruk / trasa för att säkerställa att spenarna är rena och torra.

Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

([3]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 3.

Efter mjölkning:

Täck varje spene i sin helhet med produkten, omedelbart efter mjölkning.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid bör det ombesörjas att produkten inte avlägsnas efter applicering (t ex hålla korna stående minst 5 minuter)

Brukslösningens jodkoncentration 3 000 mg / kg (0,3 % vikt / vikt).

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination (upp till 5 behandlingar per djur och dag). Den ska dock inte användas i kombination med en annan jodbaserad produkt.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i doseringssutrustningen rekommenderas.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Inandning: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Hudkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Ögonkontakt: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning.

Förtäring: Inga kända effekter eller symptom vid normal användning

Efter inandning: Tillför frisk luft; kontakta läkare vid symptom.

Efter hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj noggrant.

Efter ögonkontakt: Skölj öppet öga i flera minuter under rinnande vatten (minst 15 minuter).

Efter förtäring: Skölj munnen och drick sedan mycket vatten. Ring omedelbart till läkare.

Om det behövs medicinsk rådgivning, ha en produktförpackning eller etikett till hands

Stabilitet och reaktivitet:

Reaktivitet: Inga reaktionsrisker kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förvarings- och användningsförhållanden.

Risk för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända under normala lagrings- och användningsförhållanden.

Förhållanden som ska undvikas: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Farliga sönderdelningsprodukter: Inga kända vid normala lagrings- och användningsförhållanden.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder:

Valla in för att samla större vätskespill.

Samla upp och / eller absorbera spill med inert material och placera sedan i lämplig behållare.

Förhindra utsläpp från att komma in i avlopp, kloak eller vattendrag.

Samlas i lämpliga slutna behållare för bortskaffande.

Placera inte spillt material tillbaka i originalbehållaren

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Tomma behållare måste sköljas tre gånger före bortskaffande

Juverdukar i engångsmaterial / papper som används för att torka djurspenar och avlägsna produkten från dem bör kasseras som vanligt/hushållsavfall.

Förhindra utsläpp av outspädd produkt till avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Förvara endast i sluten originalbehållare

Skydda mot frost

Förvaras inte vid temperaturer över 30 °C

Hållbarhet 18 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

Ingen

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Godkännandenummer	EU-0019228-0006 1–3				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3