31999R2293

6.11.1999 *ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV* L 284/1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2293/1999

zo 14. októbra 1999,

ktorým sa predlžujú dočasné povolenia určitých prídavných látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach v krmivách ([1]), naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Komisie (ES) č. 1636/1999 ([2]), a najmä na jej článok 3,

(1) keďže článok 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS stanovuje, že nové prídavné látky alebo nové používanie prídavných látok možno dočasne povoliť, ak ich prípustný obsah v krmivách neovplyvňuje nepriaznivo zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie, ani neuškodí spotrebiteľovi zmenou vlastností živočíšnych produktov, ak ich prítomnosť v krmivách možno kontrolovať, a je odôvodnené predpokladať so zreteľom na dostupné výsledky, že priaznivo ovplyvňujú vlastnosti krmív alebo živočíšnu produkciu po zapracovaní do týchto krmív;

(2) keďže smernica 70/524/EHS stanovuje, že dočasné povolenia sa poskytujú na úrovni spoločenstva od 1. októbra 1999 na obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 4 roky; keďže prídavné látky alebo používanie prídavných látok dočasne povolených po prvý raz medzi 1. aprílom 1998 a 30. septembrom 1999 podliehajú dočasným povoleniam na vnútroštátnej úrovni do 30. septembra 1999; keďže je primerané predĺžiť uvedené dočasné povolenia;

(3) keďže Komisia sa o dočasnom povolení enzýmov a mikroorganizmov zahrnutých do prílohy k tomuto nariadeniu radila s Vedeckým výborom pre výživu zvierat; keďže výbor doručil svoje stanovisko s osobitným zreteľom na bezpečnosť týchto prídavných látok;

(4) keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prídavné látky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sú povolené v súlade so smernicou 70/524/EHS za podmienok ustanovených v tejto prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. októbra 1999

Za Komisiu
David BYRNE
člen Komisie

([1]) Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17.

PRÍLOHA

FARBIACE LÁTKY, VRÁTANE PIGMENTOV

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
1. **Karotenoidy a xantofyly**								
E 160a	Beta karotén	$C_{40}H_{56}$	Kanáriky	-	-	-	-	30. 9. 2000 [a]
E 161g	Kantaxantín	$C_{40}H_{52}O_2$	Spoločenské zvieratá a okrasné vtáky	-	-	-	-	30. 9. 2000 [a]
2. **Iné farbiace látky**								
12	*Phaffia rhodozyma* bohatá na astaxantín (ATCC 74219)	Koncentrovaná biomasa devitalizovaných kvasníc *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219) s obsahom najmenej 4,0 g astaxantínu v jednom kilograme prídavnej látky a najviac 2 000 mg etoxyquinu/kg	Losos	-	-	100	Najvyšší obsah je vyjadrený ako astaxantín Použitie je povolené len od 6 mesiacov veku. Zmes prídavnej látky s kantaxantínom je povolená za predpokladu, že celková koncentrácia astaxantínu a kantaxantínu nepresiahne 100 mg/kg kompletného krmiva. Obsah etoxyquinu sa musí deklarovať.	30. 9. 2000 [a]
			Pstruh	-	-	100	Najvyšší obsah je vyjadrený ako astaxantín. Použitie je povolené len od 6 mesiacov veku. Zmes prídavnej látky s kantaxantínom je povolená za predpokladu, že celková koncentrácia astaxantínu a kantaxantínu nepresiahne 100 mg/kg kompletného krmiva. Obsah etoxyquinu sa musí deklarovať.	30. 9. 2000 [a]

STOPOVÉ PRVKY

ES číslo	Chemický prvok	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Najvyšší obsah prvku v mg/kg kompletného krmiva	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
E 4	Meď - Cu	Síran medi a lyzínu	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2.SO_4$	Výkrm ošípaných: — v členských štátoch, kde priemerná hustota populácie ošípaných sa rovná alebo je vyššia ako 175 ošípaných na 100 ha využiteľnej poľnohospodárskej pôdy: — do 16 týždňov veku: 175 (celkovo) — v členských štátoch, kde priemerná hustota populácie ošípaných je nižšia ako 175 ošípaných na 100 ha využiteľnej poľnohospodárskej pôdy: — do 16 týždňov veku: 175 (celkovo)	Obsah medi zo síranu medi a lyzínu nesmie byť vyšší ako 50 mg/kg kompletného krmiva.	30. 9. 2000 [b]
				Výkrm ošípaných: — v členských štátoch, kde priemerná hustota populácie ošípaných sa rovná alebo je vyššia ako 175 ošípaných na 100 ha využiteľnej poľnohospodárskej pôdy: — od 17. týždňa veku do zabitia: 35 (celkovo) — v členských štátoch, kde priemerná hustota populácie ošípaných je nižšia ako 175 ošípaných na 100 ha využiteľnej poľnohospodárskej pôdy: — od 17. týždňa veku do 6 mesiacov: 100 (celkovo) — nad šesť mesiacov do zabití: 35 (celkovo) Chovné ošípané: 35 (celkovo) Iné druhy alebo kategórie zvierat, s výnimkou teliat pred začatím prežúvania a oviec: 35 (celkovo)	Obsah medi zo síranu medi a lyzínu nesmie byť vyšší ako 50 mg/kg kompletného krmiva.	30. 9. 2000

VIAŽUCE, PROTISPEKAVÉ A ZRÁŽACIE LÁTKY

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
3	Klinoptilolit sopečného pôvodu	Hydratovaný hlinitokremičitan vápenatý sopečného pôvodu s obsahom najmenej 85 % klinoptilolitu a najviac 15 % živca, sľudy a hliny bez vlákien a kremeňa. Najvyšší obsah olova je 80 mg/kg.	Ošípané	-	-	20 000	Všetky krmivá	30. 9. 2000 [c]
			Králiky	-	-	20 000	Všetky krmivá	30. 9. 2000 [c]
			Hydina	-	-	20 000	Všetky krmivá	30. 9. 2000 [c]

ENZÝMY

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
1	3-fytáza EC 3.1.3.8	Prípravok 3-fytázy produkovanej kmeňom *Aspergillus niger* (CBS 114.94) s minimálnou aktivitou fytázy 5 000 FTU [1]/g pre pevné a tekuté prípravky	Morky	-	125 FTU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 200 do 800 FTU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach s obsahom najmenej 0,3 % fytátu, napr. 20 % pšenice	30. 9. 2000 [a]
2	3-fytáza EC 3.1.3.8	Prípravok 3-fytázy produkovanej kmeňom *Aspergillus oryzae* (DSM 10 289) s aktivitou najmenej: Potiahnutá forma: 2 500 FYT [2]/g Tekutá forma: 5 000 FYT/g	Prasiatka	Štyri mesiace	250 FYT	1 000 FYT	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500 FYT 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytát, napr. obsahujúcich viac ako 40 % obilnín (kukurica, jačmeň, ovos, pšenica, raž, tritikale), olejniny a strukoviny	30. 9. 2000 [d]
			Výkrm ošípaných	-	400 FYT	1 000 FYT	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500 FYT 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytát, napr. obsahujúcich viac ako 40 % obilnín (kukurica, jačmeň, ovos, pšenica, raž, tritikale), olejniny a strukoviny	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Výkrm kurčiat	-	200 FYT	1 000 FYT	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500 FYT 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytát, napr. obsahujúcich viac ako 40 % obilnín (kukurica, jačmeň, ovos, pšenica, raž, tritikale), olejniny a strukoviny	30. 9. 2000 ([d])
			Nosnice	-	500 FYT	1 000 FYT	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 750 FYT 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytát, napr. obsahujúcich viac ako 40 % obilnín (kukurica, jačmeň, ovos, pšenica, raž, tritikale), olejniny a strukoviny	30. 9. 2000 ([f])
3	Alfa-galaktozidáza EC 3.2.1.22	Prípravok alfa-galaktozidázy produkovanej kmeňom *Aspergillus oryzae* (DSM 10 286) s aktivitou najmenej: Tekutá forma: 1 000 GALU ([3])/g	Výkrm kurčiat	-	300 GALU	1 000 GALU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 450 GALU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na oligosacharidy, napr. obsahujúcich viac ako 25 % sójového šrotu, bavlníkových výliskov, hrach	30. 9. 2000 ([d])

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
4	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s aktivitou najmenej: Potiahnutá forma: 50 FBG [4]/g Tekutá forma: 120 FBG/g	Prasiatka	Štyri mesiace	25 FBG	40 FBG	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 25 FBG 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % kukurice a jačmeňa	30. 9. 2000 [d]
5	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4)-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) s aktivitou najmenej: Potiahnutá forma: 1 000 FXU [5]/g Tekutá forma: 650 FXU/ml	Výkrm kurčiat	-	80 FXU	200 FXU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 150 FXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000 [d]
			Výkrm moriek	-	225 FXU	600 FXU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 225 do 600 FXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah (mg/kg kompletného krmiva)	Najvyšší obsah (mg/kg kompletného krmiva)	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
			Prasiatka	Štyri mesiace	200 FXU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 200 FXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000 [d]
6	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-betaglukanázy produkovaných kmeňom *Humicola insolens* (DSM 10442) s aktivitou najmenej: Potiahnutá forma: 800 FXU [6]/g 75 FBG [7]/g Mikrogranulovaná forma: 800 FXU/g 75 FBG/g Tekutá forma: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Výkrm kurčiat	-	200 FXU, 19 FBG	1 000 FXU, 94 FBG	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 400 FXU 38 FBG 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa a/alebo ovsa, pšenice	30. 9. 2000 [d]
			Prasiatka	Štyri mesiace	240 FXU, 22 FBG	1 000 FXU, 94 FBG	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 400 FXU 38 FBG 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa a/alebo ovsa, pšenice	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Výkrm ošípaných	-	200 FXU, 19 FBG	800 FXU, 75 FBG	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg krmiva: 400 FXU 38 FBG 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa a/alebo ovsa, pšenice	30. 9. 2000 (g)
7	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných kmeňom *Aspergillus niger* (CBS 600.94) s aktivitou najmenej: Pevná a tekutá forma: 12 000 FXU (8)/g 5 000 BGU (9)/g	Výkrm kurčiat	-	3 600 FXU, 1 500 BGU	12 000 FXU, 5 000 BGU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 3 600 do 6 000 FXU od 15 000 do 2 500 BGU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice, raže, tritikale	30. 9. 2000 (d)

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
8	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy, produkovaných kmeňom *Aspergillus niger* (CBS 600.94) s aktivitou najmenej: Pevná a tekutá forma: 10 000 BGU ([10])/g 4 000 FXU ([11])	Výkrm kurčiat	-	3 000 BGU, 1 200 FXU	10 000 BGU, 4 000 FXU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 3 000 do 10 000 BGU od 1 200 do 4 000 FXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])
			Prasiatka	Štyri mesiace	3 000 BGU, 1 200 FXU	5 000 BGU, 2 000 FXU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 3 000 do 5 000 BGU od 1 200 do 2 000 FXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
9	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus niger* (CBS 270.95) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 28 000 EXU ([12])/g Tekutá forma: 14 000 EXU/ml	Výkrm kurčiat	-	1 400 EXU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 1 400 EXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000 ([d])
10	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Prípravok alfa-amylázy produkovanej kmeňom *Bacillus amyloliquefaciens* (CBS 360.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 45 000 RAU ([13])/g Tekutá forma: 20 000 RAU/ml	Prasiatka	Štyri mesiace	1 800 RAU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 1 800 RAU 3. Určené výlučne na použitie v kŕmnych zmesiach určených na mokré kŕmenie a obsahujúcich kŕmne suroviny bohaté na škrob (napr. obsahujúcich viac ako 35 % pšenice)	30. 9. 2000 ([d])
			Výkrm ošípaných	-	1 800 RAU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 1 800 RAU 3. Určené výlučne na použitie v kŕmnych zmesiach určených na mokré kŕmenie a obsahujúcich kŕmne suroviny bohaté na škrob (napr. obsahujúcich viac ako 35 % pšenice)	30. 9. 2000 ([d])

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Prasnice	-	1 800 RAU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 1 800 RAU 3. Určené výlučne na použitie v kŕmnych zmesiach určených na mokré kŕmenie a obsahujúcich kŕmne suroviny bohaté na škrob (napr. obsahujúcich viac ako 35 % pšenice)	30. 9. 2000 [d]
11	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) s aktivitou najmenej: endo-1,4-beta-glukanázy: 8 000 U [14]/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 18 000 U [15]/ml endo-1,4-beta-glukanáza: 26 000 U [16]/ml	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,4-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: od 400 do 1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: od 900 do 3 600 U endo-1,4-beta-xylanáza: od 1 300 do 5 200 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % pšenice alebo jačmeňa a 10 % raže	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
12	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Trichoderma viride* (FERM BP-4447) s aktivitou najmenej: endo-1,4-beta-glukanázy: 8 000 U [17]/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 18 000 U [18]/g endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 [19]/ml	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,4-beta-glukanáza: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 450 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 650 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: od 800 do 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: od 1 800 do 2 700 U endo-1,4-beta-xylanáza: od 2 600 do 3 900 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 20 % pšenice a 20 % jačmeňa a/alebo 25 % raže	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Nosnice	-	Endo-1,4-beta-glukanáza: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 440 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 080 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: od 640 do 1 280 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: od 1 440 do 2 880 U endo-1,4-beta-xylanáza: od 2 080 do 4 160 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 20 % pšenice a 20 % jačmeňa a/alebo 25 % raže	30. 9. 2000 [d]
			Výkrm moriek	-	Endo-1,4-beta-glukanáza: 1 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 700 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 3 900 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 700 U endo-1,4-beta-xylanáza: 3 900 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 20 % pšenice a 20 % jačmeňa a/alebo 20 % raže	30. 9. 2000 [d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
13	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) s aktivitou najmenej: Prášková forma: 8 000 BGU ([20]) g 11 000 EXU ([21])/g Granulovaná forma: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Tekutá forma: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Výkrm kurčiat	-	100 BGU 130 EXU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 100 BGU 130 EXU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % pšenice a 30 % jačmeňa alebo 20 % raže.	30. 9. 2000 ([d])
14	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus niger* (CBS 520.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 600 U ([22])/g Tekutá forma: 300 U/ml	Výkrm kurčiat	-	300 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 300 do 600 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000 ([d])
15	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma viride* (CBS 517.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 650 U ([23])/g Tekutá forma: 325 U/ml	Výkrm kurčiat	-	325 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 325 do 650 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
16	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Prípravok endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 1 000 CU ([24])/g Tekutá forma: 2 000 CU/ml	Výkrm kurčiat	-	250 CU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 1 000 CU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])
			Nosnice	-	250 CU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 1 000 CU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])
			Prasiatka	Štyri mesiace	250 CU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 1 000 CU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa	30. 9. 2000 ([d])

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Výkrm ošípaných	-	250 CU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 1 000 CU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa	30. 9. 2000 (d)
17	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 3 000 EPU (25)/g Tekutá forma: 6 000 EPU/ml	Výkrm kurčiat	-	750 EPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 1 500 do 3 000 EPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo kukurice	30. 9. 2000[d]
			Nosnice	-	750 EPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 1 500 do 3 000 EPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo kukurice	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Prasiatka	Štyri mesiace	750 EPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 1 500 do 3 000 EPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo kukurice	30. 9. 2000[d]
			Výkrm ošípaných	-	750 EPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 1 500 do 3 000 EPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo kukurice	30. 9. 2000[d]
18	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus niger* (MUCL 39199) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 2 000 AGL ([26])/g Tekutá forma: 500 AGL/ml	Výkrm kurčiat	-	100 AGL	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 100 AGL 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa a 20 % pšenice	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
19	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Aspergillus niger* (MUCL 39199) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 1 500 AGL [27]/g Tekutá forma: 200 AGL/g	Výkrm kurčiat	-	25 AGL	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 25 do 100 AGL 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa	30. 9. 2000[d]
20	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 2 000 AXC [28]/g Tekutá forma: 500 AXC/ml	Výkrm kurčiat	-	100 AXC	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 100 AXC 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo raže	30. 9. 2000[d]
21	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy, produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 1 500 AXC [29]/g Tekutá forma: 200 AXC/ml	Výkrm kurčiat	-	25 AXC	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 25 do 100 AXC 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
22	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 70 000 BGN ([30])/g Tekutá forma: 14 000 BGN/ml	Výkrm kurčiat	-	1 050 BGN	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 2 800 BGN 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa	30. 9. 2000[d]
23	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 70 000 IFP ([31])/g Tekutá forma: 7 000 IFP/ml	Výkrm kurčiat	-	1 050 IFP	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 1 400 IFP 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 56 % pšenice	30. 9. 2000[d]
24	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaných kmeňom *Aspergillus niger* (CNCM 1-1517) s aktivitou najmenej: 28 000 QXU ([32])/g 140 000 QGU ([33])/g	Výkrm kurčiat	-	420 QXU, 2 100 QGU	1 120 QXU, 5 600 QGU	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 560 QXU 2 800 QGU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % pšenice a 30 % jačmeňa	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
25	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Aspergillus niger* (NRRL 25541) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 11 000 U [34]/g endo-1,4-beta-xylanázy: 1 600 U [35]/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa alebo 30 % pšenice a 30 % kukurice	30. 9. 2000[d]
			Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa alebo 30 % pšenice a 30 % kukurice	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
26	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 350 000 BU ([36])/g Tekutá forma: 50 000 BU/g	Výkrm kurčiat	-	23 000 BU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 23 000 do 50 000 BU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä glukány), napr. obsahujúcich viac ako 20 % jačmeňa alebo 30 % raže	30. 9. 2000[e]
			Prasiatka	Štyri mesiace	26 000 BU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 26 000 do 35 000 BU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä glukány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % jačmeňa alebo pšenice	30. 9. 2000[e]
27	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma reesei* (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 200 000 BXU ([37])/g 200 000 BU ([38])/g Tekutá forma: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Výkrm kurčiat	-	2 500 BXU, 2 500 BU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice alebo 30 % raže	30. 9. 2000[e]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
28	3-fytáza EC 3.1.3.8	Prípravok 3-fytázy produkovanej kmeňom *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 5 000 PPU ([39])/g Tekutá forma: 1 000 PPU/g	Prasiatka	Štyri mesiace	250 PPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 750 PPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytáty, napr. obsahujúcich viac ako 50 % obilnín (kukurica, jačmeň, pšenica), tapioky, olejnín a strukovín	30. 9. 2000[e]
			Výkrm ošípaných	-	500 PPU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 750 PPU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na fytáty, napr. obsahujúcich viac ako 50 % obilnín (kukurica, jačmeň, pšenica), tapioky, olejnín a strukovín	30. 9. 2000[e]
29	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Geosmithia emersonii* (IMI SD 133) s aktivitou najmenej: 5 500 U ([40])/g	Výkrm kurčiat	-	250 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 250 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa	30. 9. 2000[f]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
30	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) s aktivitou najmenej: Prášková forma: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 2 000 U ([41])/g endo-1,4-beta-xylanázy: 1 400 U ([42])/g Tekutá forma: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 500 U/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 350 U/ml	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 50 % jačmeňa alebo 60 % pšenice	30. 9. 2000[f]
31	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 614.94) s aktivitou najmenej: Pevná forma : 300 EU ([43])/g Tekutá forma: 1 000 EU/g	Výkrm kurčiat	-	600 EU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 600 EU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % pšenice	30. 9. 2000[f]
			Nosnice	-	300 EU	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 600 EU 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % pšenice	30. 9. 2000[f]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
32	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) s aktivitou najmenej: 200 U [44]/ml	Výkrm kurčiat	-	100 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 100 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 30 % jačmeňa	30. 9. 2000[g]
		1 200 U/ml	Prasiatka	Štyri mesiace	400 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 400 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 55 % jačmeňa	30. 9. 2000[g]
			Výkrm ošípaných	-	500 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 70 % jačmeňa	30. 9. 2000[g]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
33	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) s aktivitou najmenej: Prášková forma: 2 000 U ([45])/g Tekutá forma: 5 000 U/ml	Výkrm kurčiat	-	500 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: od 500 do 2 500 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 55 % pšenice alebo 60 % raže	30. 9. 2000[g]
			Nosnice	-	2 000 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 2 000 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 35 % pšenice	30. 9. 2000[g]
		Prášková forma: 4 000 U/g Tekutá forma: 10 000 U/ml	Prasiatka	Štyri mesiace	5 000 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 5 000 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 45 % pšenice	30. 9. 2000[g]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
		Prášková forma: 4 000 U/g Tekutá forma: 8 000 U/ml	Výkrm ošípaných	-	4 000 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 4 000 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 35 % pšenice	30. 9. 2000[g]
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných kmeňom *Aspergillus niger* (NRRL 25541) a alfa-amylázy produkovanej kmeňom Aspergillus oryzae (ATCC 66222) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 275 U ([46])/g endo-1,4-beta-xylanázy: 400 U ([47])/g alfa-amylázy: 3 100 U ([48])/g	Prasiatka	Štyri mesiace	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 240 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U endo-1,4-beta-xylanáza: 240 U alfa-amyláza: 1 860 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach obsahujúcich obilniny bohaté na škrob a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 45 % jačmeňa alebo 10 % pšenice alebo 10 % kukurice	30. 9. 2000[h]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
35	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 80 U [49]/g endo-1,4-beta-xylanázy: 180 U [50]/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U endo-1,4-beta-xylanáza: 180 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]
36	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 300 U [51]/g endo-1,4-beta-glukanázy: 300 U [52]/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
			Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 35 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]
37	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilizínu produkovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s aktivitou najmenej: endo-1,4-beta-xylanázy: 2 500 U ([53])/g subtilizínu: 800 U ([54])/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,4-beta-xylanáza: 500 U Subtilizín: 160 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: od 500 do 2 500 U subtilizín: 160 do 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 65 % pšenice	30. 9. 2000[h]
			Morky	-	Endo-1,4-beta-xylanáza: 825 U Subtilizín: 265 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: od 825 do 2 500 U subtilizín: 265 do 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 45 % pšenice	30. 9. 2000[h]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
38	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilizínu produkovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s aktivitou najmenej: endo-1,4-beta-xylanázy: 5 000 U ([55])/g subtilizínu : 500 U ([56])/g	Prasiatka	Štyri mesiace	Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U Subtilizín: 500 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U subtilizín: 500 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice	30. 9. 2000[h]
39	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATC 2105) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 400 U ([57])/g endo-1,4-beta-glukanázy: 400 U ([58])/g	Výkrm ošípaných	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 65 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]
40	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATC 2105) a subtilizínu produkovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 100 U ([59])/g endo-1,4-beta-xylanázy: 300 U ([60])/g subtilizínu: 800 U ([61])/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 90 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: od 30 do 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: od 90 do 300 U subtilizín: od 240 do 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 60 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
41	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATC 2105) a subtilizínu produkovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s aktivitou najmenej: endo-1,3(4)-beta-glukanázy: 100 U [62]/g endo-1,4-beta-xylanázy: 2 500 U [63]/g subtilizínu: 800 U [64]/g	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 625 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: od 25 do 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: od 625 do 2 500 U subtilizín: od 200 do 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 30 % pšenice a 10 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]
			Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U subtilizín: 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice a 25 % jačmeňa	30. 9. 2000[h]
42	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) s aktivitou najmenej: Pevná forma: 4 000 U [65]/g Charakteristika povoleného prípravku: endo-1,4-beta-xylanáza: 1,99 % pšenica: 97,7 % propionát vápenatý: 0,3 % lecitín: 0,01 %	Prasiatka	Štyri mesiace	4 000 U	-	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 4 000 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % pšenice	30. 9. 2000[h]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Prípravok *Bacillus cereus* var. *toyoi* s obsahom najmenej 1 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Výkrm kurčiat	-	0,2 x 10^9	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: monenzinát sodný, lasalocid sodný, salinomycinát sodný, amprólium-etopabát, metichlórpindol-metylbenzochát, dekochinát, robenidín, narazín, halofuginon	30. 9. 2000[g]
			Nosnice	-	0,2 x 10^9	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[g]
			Teľatá	Šesť mesiacov	0,5 x 10^9	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[g]
			Výkrm hovädzieho dobytka	-	0,2 x 10^9	0,2 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Bacillus cereus* var. *toyoi*v dennej kŕmnej dávke nesmie presiahnuť 1,0 x 10^9 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte 0,2 x 10^9 živých zárodkov.	30. 9. 2000[g]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
			Chovné samice králikov	-	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: robenidín	30. 9. 2000[g]
			Výkrm králikov	-	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: metichlórpindol, robenidín, salinomycinát sodný	30. 9. 2000[g]
3	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* s obsahom najmenej 5×10^9 živých zárodkov/g prídavnej látky	Výkrm králikov	-	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: metichlórpindol	30. 9. 2000[d]
			Prasnice	-	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Prasiatka	Štyri mesiace	5×10^9	1×10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
4	Bacillus cereus ATCC 14 893	Prípravok *Bacillus cereus* s obsahom najmenej 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	5 x 10^8	1 x 10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Výkrm ošípaných	-	2 x 10^8	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Prasnice	15 dní pred oprasením a počas dojčenia	8,5 x 10^8	1,2 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Teľatá	16 týždňov	1 x 10^9	1,2 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Výkrm kurčiat	-	2 x 10^8	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: amprólium, halofuginon, lasalocid sodný, maduramycín amónny, monenzinát sodný, narazín, salinomycinát sodný, metichlórpindol, diclazuril	30. 9. 2000[d]
			Výkrm moriek	26 týždňov	2 x 10^8	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: amprólium, halofuginon, lasalocid sodný, metichlórpindol/metylbenzochát, diclazuril, nifursol	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* s obsahom najmenej 1 x 10^8 živých zárodkov/g prídavnej látky	Teľatá	Šesť mesiacov	2 x 10^8	2 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Výkrm hovädzieho dobytka	-	1,7 x 10^8	1,7 x 10^8	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej krmnej dávke nesmie presiahnuť 7,5 x 10^8 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte 1 x 10^8 živých zárodkov.	30. 9. 2000[f]
6	Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-1079	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* s obsahom najmenej 2 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasnice	-	2 x 10^9	1 x 10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
			Prasiatka	Štyri mesiace	6 x 10^9	3 x 10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[d]
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-1077	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* o obsahu najmenej 2 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Dojnice	-	5,5 x 10^8	2,1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej krmnej dávke nesmie presiahnuť 8,4 x 10^9 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte 1,8 x 10^9 živých zárodkov.	30. 9. 2000[d]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
			Výkrm hovädzieho dobytka	-	1 x 10^9	1,5 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej krmnej dávke nesmie presiahnuť 4,6 x 10^9 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte 2 x 10^9 živých zárodkov.	30. 9. 2000[d]
8	Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (v pomere 1/1)	Zmes inkapsulovaných baktérií *Enterococcus faecium* ATCC 53519 a inkapsulovaných baktérií Enterococcus faecium ATCC 55593 s obsahom najmenej 2 x 10^8 živých zárodkov/g prídavnej látky (to znamená z každej baktérie najmenej 1 x 10^8živých zárodkov/g)	Výkrm kurčiat	-	1 x 10^8	1 x 10^8	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v krmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: amprólium, dekochinát, halofuginon, lasalocid sodný, maduramycín amónny, monenzinát sodný, narazín, nikarbazín, narazín/nikarbazín, salinomycinát sodný	30. 9. 2000[d]
9	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M	Prípravok *Pediococcus acidilactici* s obsahom najmenej 1 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Výkrm kurčiat	-	1 x 10^9	1 x 10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v krmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: amprólium, metichlórpindol, dekochinát, halofuginon, narazín, salinomycinát sodný, nikarbazín, maduramycín amónny, diclazuril	30. 9. 2000[f]
			Prasiatka	Štyri mesiace	1 x 10^9	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[f]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
			Ošípané	-	1 x 10^9	1 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[f]
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Prípravok *Enterococcus faecium* s obsahom najmenej: Mikrokapsulová forma: 1 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky 1,75 x 10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Výkrm kurčiat	-	0,3 x 10^9	2,8 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: amprólium, amprólium/etopabát, diclazuril, halofuginon, maduramycín amónny, metichlórpindol, metichlórpindol/metylbenzochát, monenzinát sodný, robenidín, salinomycinát sodný	30. 9. 2000[f]
			Ošípané	-	0,35 x 10^9	1,5 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[f]
			Prasnice	-	0,2 x 10^9	1,25 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[f]
			Výkrm hovädzieho dobytka	-	0,25 x 10^9	0,6 x 10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Enterococcus faecium* v dennej kŕmnej dávke nesmie presiahnuť 1 x 10^9 živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte 1 x 10^9 živých zárodkov.	30. 9. 2000[f]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
		Prípravok *Enterococcus faecium* s obsahom najmenej: Mikrokapsulová forma: 1×10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky $1{,}75 \times 10^{10}$ živých zárodkov/g prídavnej látky a granulovaná forma: $3{,}5 \times 10^{10}$ živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	$0{,}3 \times 10^{9}$	$1{,}4 \times 10^{9}$	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní Granulovaná forma sa používa výlučne v náhradkách mlieka	30. 9. 2000[f]
			Teľatá	Šesť mesiacov	$0{,}35 \times 10^{9}$	$6{,}6 \times 10^{9}$	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Granulovaná forma sa používa výlučne v náhradkách mlieka	30. 9. 2000[f]
11	Enterococcus faecium DSM 5464	Prípravok *Enterococcus faecium* s obsahom najmenej 5×10^{10} živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[f]
12	Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R	Prípravok *Lactobacillus farciminis* s obsahom najmenej 1×10^{9} živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	1×10^{9}	1×10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[g]

Číslo	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Platnosť povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
13	Enterococcus faecium DSM 10 663/	Prípravok *Enterococcus faecium* s obsahom najmenej: Prášková a granulovaná forma: $3,5 \times 10^{10}$ živých zárodkov/g prídavnej látky Potiahnutá forme: $2,0 \times 10^{10}$ živých zárodkov/g prídavnej látky Tekutá forma: $1,0 \times 10^{10}$ živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	1×10^9	1×10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[g]
			Teľatá	Šesť mesiacov	1×10^9	1×10^{10}	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[h]
			Výkrm kurčiat	-	1×10^9	1×10^{10}	1. V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní 2. Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: ampról ium, ampról ium/etopabát, dekochinát, diclazuril, halofuginon, lasalocid sodný, maduramycín amónny, metichlórpindol/metylbenzochát, monenzinát sodný, narazín, nikarbazín, robenidín, salinomycinát sodný	30. 9. 2000[h]
14	Saccharomyces cerevisiae	Prípravok *Saccharomyces cerevisiae* s obsahom najmenej: Prášková a granulovaná forma s guľatými a oválnymi granulami: 1×10^9 živých zárodkov/g prídavnej látky	Prasiatka	Štyri mesiace	3×10^9	3×10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní	30. 9. 2000[g]
			Výkrm hovädzieho dobytka	-	9×10^9	9×10^9	V návode na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, použiteľnosť a stabilitu pri granulovaní Množstvo *Saccharomyces cerevisiae* v dennej kŕmnej dávke nesmie presiahnuť $1,6 \times 10^{10}$ živých zárodkov na 100 kg živej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg živej hmotnosti pridajte $3,2 \times 10^9$ živých zárodkov.	30. 9. 2000[g]

([a]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 2316/98 (Ú. v. ES L 289, 28.10.1998, s. 4).
([b]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 639/1999 (Ú. v. ES L 82, 26.3.1999, s. 6).
([c]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 1245/1999 (Ú. v. ES L 150, 17.6.1999, s. 15).
([d]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15).
([e]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 2374/98 (Ú. v. ES L 295, 4.11.1998, s. 3).
([f]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 (Ú. v. ES L 108, 27.4.1999, s. 21).
([g]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 1411/1999 (Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56).
([h]) Prvé povolenie nariadením Komisie (ES) č. 1636/1999 (Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17).
([1]) FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.
([2]) FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.
([3]) 1 GALU je množstvo enzýmu, ktoré zhydrolyzuje 1 mikromól p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za 1 minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([4]) 1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.
([5]) 1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 7,8 mikromólov redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z azo-arabinoxylánu pšenice za minútu pri pH 6,0 a 50 °C.
([6]) 1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 3,1 mikromólov redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z azo-arabinoxylánu pšenice za minútu pri pH 6,0 a 50 °C.
([7]) 1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 6,0 a 50 °C.
([8]) 1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 mikromólov xylózy z azurínom zosieťovaného xylánu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([9]) 1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 mikromólov glukózy z azurínom zosieťovaného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([10]) 1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 mikromólov glukózy z azurínom zosieťovaného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([11]) 1 FXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,15 mikromólov xylózy z azurínom zosieťovaného xylánu za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([12]) 1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z arabinoxylánu za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.
([13]) 1 RAU je množstvo enzýmu, ktoré premení 1 mg rozpustného škrobu na produkt s rovnakou absorpcoiu ako porovnávacia farba pri 620 nm po reakcii s jódom za minútu pri pH 6,6 a 30 °C.
([14]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z karboxymetylcelulózy za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([15]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([16]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([17]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z karboxymetylcelulózy za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([18]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([19]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,1 mikromólu glukózy z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,0 a 40 °C.
([20]) 1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,278 mikromólov redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 3,5 a 40 °C.
([21]) 1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z arabinoxylánu pšenice za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.
([22]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól xylózy zo xylánu brezového dreva za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([23]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([24]) 1 CU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,128 mikromólov redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,5 a 30 °C.
([25]) 1 EPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0083 mikromólov redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 4,7 a 30 °C.
([26]) 1 AGL je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,6 a 30 °C.
([27]) 1 AGL je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,6 a 30 °C.
([28]) 1 AXC je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 17,2 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,7 a 30 °C.
([29]) 1 AXC je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 17,2 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,7 a 30 °C.
([30]) 1 BGN je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.
([31]) 1 IFP je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.
([32]) 1 QXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 5,1 a 50 °C.
([33]) 1 QGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.
([34]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu ovsa za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([35]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([36]) 1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromólov redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.
([37]) 1 BXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromólov redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu brezy za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([38]) 1 BU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,06 mikromólov redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.
([39]) 1 PPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,0 a 37 °C.
([40]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 2,78 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 50 °C.
([41]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 5,55 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 50 °C.
([42]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 4,00 mikromólov redukujúcich cukrov (maltózové ekvivalenty) z xylánu brezy za minútu pri pH 5,5 a 50 °C.
([43]) 1 EU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,5 a 40 °C.
([44]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([45]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([46]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu ovsa za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([47]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z xylánu ovsa za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([48]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z pšeničného škrobu za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([49]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([50]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([51]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
([52]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([53]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
([54]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikrogram fenolických zlúčenín (tyrozínové ekvivalenty) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.
([55]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.

(56) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikrogram fenolických zlúčenín (tyrozínové ekvivalenty) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.
(57) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(58) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
(59) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(60) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
(61) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikrogram fenolických zlúčenín (tyrozínové ekvivalenty) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.
(62) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (glukózové ekvivalenty) z beta-glukánu jačmeňa za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(63) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.
(64) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikrogram fenolických zlúčenín (tyrozínové ekvivalenty) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a 40 °C.
(65) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (xylózové ekvivalenty) z xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a 50 °C.