31999R2293

6.11.1999 *URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI* L 284/1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2293/1999
z dne 14. oktobra 1999
o podaljšanju začasnih dovoljenj za nekatere dodatke v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi ([1]), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 16636/1999 ([2]), in zlasti člena 3 Direktive,

(1) ker člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS predvideva, da je mogoče dati začasno dovoljenje za nove dodatke ali nove vrste uporabe dodatkov, če na ravni, ki je v krmi dovoljena, škodljivo ne vplivajo na zdravje ljudi ali živali ali na okolje, in ne škodijo kupcu zaradi spremenjenih značilnosti proizvodov živalskega izvora, če je mogoče prisotnost dodatka v krmi nadzorovati in če je možno na podlagi razpoložljivih rezultatov sklepati, da ugodno vpliva na lastnosti zadevne krme ali proizvodnjo proizvodov živalskega izvora, kadar je vključen v tako krmo;

(2) ker Direktiva 70/524/EGS predvideva, da se začasna dovoljenja izdajajo od 1. oktobra 1999 dalje na ravni Skupnosti za obdobje, ki ne sme presegati štirih let; ker so dodatki ali vrste uporabe dodatkov, za katere so bila začasna dovoljenja prvič izdana med 1. aprilom 1998 in 30. septembrom 1999, predmet nacionalnih začasnih dovoljenj, ki potečejo 30. septembra 1999; ker je ustrezno, da se navedena začasna dovoljenja podaljšajo;

(3) ker se je Komisija posvetovala z Znanstvenim odborom za prehrano živali o začasnih dovoljenjih za encime in mikroorganizme, vključene v Prilogo k tej uredbi; ker je Odbor podal mnenje zlasti v zvezi z varnostjo teh dodatkov;

(4) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatki iz Priloge k tej uredbi so dovoljeni v skladu z Direktivo 70/524/EGS pod pogoji, določenimi v tej prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. oktobra 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 1999

Za Komisijo
David BYRNE
Član Komisije

([1]) UL L 270, 14.12.1970, str. 1.
([2]) UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

PRILOGA

PRILOGA BARVILA VKLJUČNO S PIGMENTI

Št. (ali ES št.)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
1. **Karotenoidi in ksantofili**								
E160a	Beta-karoten	$C_{40}H_{56}$	Kanarčki	—	—	—	—	30.9.2000 [a]
E161g	Kantaksantin	$C_{40}H_{52}O_2$	Ptiči – hišni in z okrasnim perjem	—	—	—	—	30.9.2000 [a]
2. **Druga barvila**								
12	*Phaffla rhodozyma* (ATCC 74219), obogatena z astaksantinom	Koncentrirana biomasa kvasovk *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219), neaktivna, ki vsebuje najmanj 4,0 g astaksantina in ima najvišjo vsebnost etoksikvina 2 000 mg/kg	Losos	—	—	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin Uporaba dovoljena le pri starosti od šest mesecev dalje Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena, pod pogojem da astaksantin in kantaksantin ne presegata 100 mg/kg v popolni krmni mešanici Vsebnost etoksikvina mora biti navedena	30.9.2000 [a]
			Postrv	—	—	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin Uporaba dovoljena le pri starosti od šest mesecev dalje Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena, pod pogojem da astaksantin in kantaksantin ne presegata 100 mg/kg v popolni krmni mešanici Vsebnost etoksikvina mora biti navedena	30.9.2000 [a]

SLEDI ELEMENTOV

ES št.	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg popolne krmne mešanice	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
E4	Baker-Cu	Bakrov lizin sulfat	$Cu(C_6H_{13}N_20_2)_2.SO_4$	Prašiči za pitanje: — v državah članicah, kjer je srednja gostota prašičje populacije enaka ali višja kakor 175 prašičev na ha uporabne kmetijske površine: — do 16 tednov: 175 (skupaj) — v državah članicah, kjer je srednja gostota prašičje populacije nižja kakor 175 prašičev na 100 ha uporabne kmetijske površine: — do 16 tednov: 175 (skupaj)	Iz bakrovega lizin sulfata ne sme priti več kakor 50 mg/kg bakra v popolni krmni mešanici	30.9.2000 [b]
				Prašiči za pitanje: — v državah članicah, kjer je srednja gostota prašičje populacije enaka ali višja kakor 175 prašičev na ha uporabne kmetijske površine: — od 17. tedna dalje za zakol: 35 (skupaj) — v državah članicah, kjer je srednja gostota prašičje populacije nižja kakor 175 prašičev na 100 ha uporabne kmetijske površine: — od 17. tedna do šestih mesecev: 100 (skupaj) — nad šest mesecev do zakola: 35 (skupaj) Plemenski prašiči. 35 (skupaj) Druge vrste ali kategorije živali, z izjemo telet pred začetkom prežvekovanja in ovac: 35 (skupaj)	Iz bakrovega lizin sulfata ne sme priti več kakor 50 mg/kg bakra v popolni krmni mešanici	30.9.2000

VEZALCI, SREDSTVA PROTI STRJEVANJU IN KOAGULANTI

Št. (ali ES št.)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgonija meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Trajanje dovoljenja
					mg/kg popolne krmne mešanice			
3	Klinoptilolit vulkanskega izvora	Kalcijev hidrirani aluminosilikat vulkanskega izvora, ki vsebuje 85 % klinoptilolita in največ 15 % ortoklaza, sljude in ilovice, brez vlaken in kvarca. Najvišja vsebnost svinca 80 mg/kg	Prašiči	—	—	20 000	Vsa krmila	30.9.2000 [c]
			Kunci	—	—	20 000	Vsa krmila	30.9.2000 [c]
			Perutnina	—	—	20 000	Vsa krmila	30.9.2000 [c]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
1	3-fitaza EC 3. 1.3.8	Pripravek 3-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 114.94) z najnižjim delovanjem fitaze 5 000 FTU [1]/g za trdne in tekoče pripravke	Purani	—	125 FYT	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200 do 800 FTU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z najmanjšo vsebnostjo 0,3 % fitata, npr. 20 % pšenice	30.9.2000 [a]
2	3-fitaza EC 3. 1.3.8	Pripravek 3-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 114.94) z najnižjim delovanjem: za prelito: 2 500 FYT [2]/g za tekočino: 5 000 FYT/g	Pujski	štirje meseci	250 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 40 % žitaric (koruze, ječmena, ovsa, pšenice, rži, tritikala), oljnih semen in zrnja stročnic	30.9.2000 [d]
			Prašiči za pitanje	—	400 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 40 % žitaric (koruze, ječmena, ovsa, pšenice, rži, tritikala), oljnih semen in zrnja stročnic	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Piščanci za pitanje	—	200 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 40 % žitaric (koruze, ječmena, ovsa, pšenice, rži, tritikala), oljnih semen in zrnja stročnic	30.9.2000 ([d])
			Kokoši nesnice	—	500 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 750 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 40 % žitaric (koruze, ječmena, ovsa, pšenice, rži, tritikala), oljnih semen in zrnja stročnic	30.9.2000 ([f])
3	Alfa-galaktosidaza EC 3.2.1.22	Pripravek alfa–galaktosidaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 10 286) z najnižjim delovanjem: Za tekočino: 1 000 GALU ([3])/g	Piščanci za pitanje	—	300 GALU	1 000 GALU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 450 GALU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z oligosaharidi, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 25 % sojine moke, pogačic iz semen bombaža, graha	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
4	Endo–1,3(4)–beta–glukanaza EC 3.2.1.8.	Pripravek endo–1,3(4)–beta–glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oculeatus* (CBS 589.94) z najnižjim delovanjem: Za prelito: 50 FBG ([4])/g Za tekočino: 120 FBG/g	Pujski	štirje meseci	25 FBG	40 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi, npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 50 % koruze ali ječmena	30.9.2000 ([d])
5	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravek endo–1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 10 286) z najnižjim delovanjem: Za prelito: 1 000 FXU ([5])/g Za tekočino: 650 FXU/ml	Piščanci za pitanje	—	80 FXU	200 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 15O FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])
			Purani za pitanje	—	225 FXU	600 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 225 do 600 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. mešanicah, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Pujski	Štirje meseci	200 FXU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])
6	Endo-l,4-beta-ksinalaza EC3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-ksinalaze in endo-1,4-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Humicola insolens* (DSM 10442), z najnižjim delovanjem: za prelito: 800 FXU ([6])/g 75 FBG ([7])/g za granulat: 800 FXU/g 75 FBG/g za tekočino: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Piščanci za pitanje	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 FXU 38 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, pšenice	30.9.2000 ([d])
			Pujski	Štirje meseci	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 FXU 38 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, pšenice	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg krme: 400 FXU 38 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, pšenice	30.9.2000 (g)
7	Endo-1,4-beta-ksinalaza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-ksinalaze in endo-1,4-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 600.94), z najnižjim delovanjem: v trdnem in tekočem stanju: 12 000 FXU (8)/g 5 000 BGU (9)/g	Piščanci za pitanje	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 600 do 6 000 FXU 1 500 do 2 500 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. Tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice, rži, tritikala	30.9.2000 (d)

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
8	Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 600.94), z najnižjim delovanjem: v trdnem in tekočem stanju: 10 000 BGU ([10])/g, 4 000 FXU ([11])/g	Piščanci za pitanje	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000 do 10 000 BGU 1 200 do 4 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih meanicah, bogatih z nekrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena	30.9.2000 ([d])
			Pujski	Štirje meseci	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000 do 5 000 BGU 1 200 do 2 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena	30.9.2000 ([f])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
9	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo–1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 270.95) z najnižjim delovanjem: Za trdno stanje: 28 000 EXU ([12])/g Za tekočino: 14 000 EXU/ml	Piščanci za pitanje	—	1 400 EXU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])
10	Alfa-amilaza EC 3.2.1.1	Pripravek alfa–amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyliquefaciens*(CBS 390.94) z najnižjim delovanjem: Za trdno stanje: 45 000 RAU ([13])/g Za tekočino: 20 000 RAU/ml	Pujski	Štirje meseci	1 800 RAU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo, izključno v krmnih mešanicah, ki so namenjeni sistemom krmljenja s tekočino in vsebujejo s škrobom bogate krmne snovi (npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice)	30.9.2000 ([d])
			Prašiči za pitanje	—	1 800 RAU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo, izključno v krmnih mešanicah, ki so namenjeni sistemom krmljenja s tekočino in vsebujejo s škrobom bogate krmne snovi (npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice)	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Svinje	—	1 800 RAU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo, izključno v krmnih mešanicah, ki so namenjene sistemom krmljenja s tekočino in vsebujejo s škrobom bogate krmne snovi (npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice)	30.9.2000 [d]
11	Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74 252), z najnižjim delovanjem: Endo-1,4-beta-glukanaze: 8 000 U [14]/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 18 000 U [15]/ml Endo-1,4-beta-ksilanaze: 26 000 U [16]/ml	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 400 do 1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 do 3 600 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300 do 5 200 U 3. Za uporabo, izključno v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice in 10 % rži	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
12	Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja *Trichoderma viride*(FERM BP-4447), z najnižjim delovanjem: Endo-1,4-beta-glukanaze: 8 000 U [17]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 18 000 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaze: 26 000 U [19]/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 450 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 650 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 800 do 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 800 do 2 700 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 600 do 3 900 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena, in/ali 25 % rži	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 080 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 640 do 1 280 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440 do 2 880 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 080 do 4 160 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena, in/ali 25 % rži	30.9.2000 [d]
			Purani za pitanje	—	Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 700 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 900 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 700 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 900 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena, in/ali 20 % rži	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
13	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), z najnižjim delovanjem kot: Prašek: 8 000 BGU ([20])/g 11 000 EXU ([21])/g Granulat: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Tekočina: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Piščanci za pitanje	—	100 BGU 130 EXU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 BGU 130 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena ali 20 % rži	30.9.2000 ([d])
14	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksinalaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 520.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 600 U ([22])/g Tekočina: 300 U/ml	Piščanci za pitanje	—	300 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 300 do 600 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])
15	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma viride* (CBS 517.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 650 U ([23])/g Tekočina: 325 U/ml	Piščanci za pitanje	—	325 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 325 do 650 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
16	Endo-l,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142), z najnižjim delovanjem: Trdna oblika: 1 000 CU [24]/g Tekočina: 2 000 CU/ml	Piščanci za pitanje	—	250 CU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.9.2000 [d]
			Kokoši nesnice	—	250 CU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.9.2000 [d]
			Pujski	Štirje meseci	250 CU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgomja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	—	250 CU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.9.2000 ([d])
17	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), z najnijim delovanjem: Trdna oblika: 3 000 EPU ([25])/g Tekočina: 6 000 EPU/ml	Piščanci za pitanje	—	750 EPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500 do 3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali koruze	30.9.2000 ([d])
			Kokoši nesnice	—	750 EPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500 do 3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali koruze	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Pujski	Štirje meseci	750 EPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500 do 3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali koruze	30.9.2000 ([d])
			Prašiči za pitanje	—	750 EPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500 do 3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali koruze	30.9.2000 ([d])
18	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (MUCL 39199), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 2 000 AGL ([26])/g Tekočina: 500 AGL/ml	Piščanci za pitanje	—	100 AGL	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 AGL 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena in 20 % pšenice	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
19	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (MUCL 39199), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 1 500 AGL ([27])/g Tekočina: 200 AGL/g	Piščanci za pitanje	—	25 AGL	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25 do 100 AGL 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.9.2000 ([d])
20	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 2 000 AXC ([28])/g Tekočina: 500 AXC/ml	Piščanci za pitanje	—	100 AXC	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 AXC 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali rži	30.9.2000 ([d])
21	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 1 500 AXC ([29])/g Tekočina: 200 AXC/g	Piščanci za pitanje	—	25 AXC	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25 do 100 AXC 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
22	Endo-l,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 70 000 BGN ([30])/g Tekočina: 14 000 BGN/ml	Piščanci za pitanje	—	1 050 BGN	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 800 BGN 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.9.2000 ([d])
23	Endo-l,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 70 000 IFP ([31])/g Tekočina: 7 000 IFP/ml	Piščanci za pitanje	—	1 050 IFP	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 IFP 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 56 % pšenice	30.9.2000 ([d])
24	Endo-l,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (CNCM 1-1517), z najnižjim delovanjem: 28 000 QXU ([32])/g 140 000 QGU ([33])/g	Piščanci za pitanje	—	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 560 QXU 2 800 QGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
25	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (NRRL 25541), z najnižjim delovanjem: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 1 100 U ([34])/g Endo-1,4-beta-ksilanaze: 1 600 U ([35])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze:138 U endo-1,4-beta-ksilanaze:200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 30 % pšenice in	30.9.2000 ([d])
			Kokoši nesnice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze:138 U endo-1,4-beta-ksilanaze:200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 30 % pšenice in 30 % koruze	30.9.2000 ([d])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
26	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 350 000 BU ([36])/g Tekočina: 50 000 BU/g	Piščanci za pitanje	—	23 000 BU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 23 000 do 50 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 20 % ječmena ali 30 % rži	30.9.2000 ([e])
			Pujski	Štirje meseci	26 000 BU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:26 000 do 35 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 20 % ječmena ali 30 % ri	30.9.2000 ([e])
27	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 529.94) in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja*Trichoderma reesei* (CBS 526.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 200 000 BXU ([37])/g 200 000 BU ([38])/g Tekočina: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Piščanci za pitanje	—	2 500 BXU, 2 500 BU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali 30 % rži	30.9.2000 ([e])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
28	3-fitaza EC 3.1.3.8	Pripravek 3-fitaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 5 000 PPU ([39])/g Tekočina: 1 000 PPU/g	Pujski	Štirje meseci	250 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 750 PPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitazami, npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % žitaric (koruza, ječmen, pšenica), tapioke, oljnih semen ali zrnja stročnic	30.9.2000 ([e])
			Prašiči za pitanje	—	500 PPU	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 750 PPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitazami, npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % žitaric (koruza, ječmen, pšenica), tapioke, oljnih semen ali zrnja stročnic	30.9.2000 ([e])
29	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Geosmithia emersonii* (IMI SD 133), z najnižjim delovanjem: 5 500 U ([40])/g	Piščanci za pitanje	—	250 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.9.2000 ([f])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
30	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Penicillium funiculosum*(IMI SD 101), z najnižjim delovanjem kot: Prašek: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 2 000 U ([41])/g Endo-1,4-beta-ksilanaza 1 400 U ([42])/g Tekočina: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksilanaza 350 U/ml	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 70 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 60 % pšenice	30.9.2000 ([f])
31	Endo-l,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 614.94), z najnižjim delovanjem: V trdnem stanju: 300 EU ([43])/g Tekočina: 1 000 EU/g	Piščanci za pitanje	—	600 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 600 EU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 60 % pšenice	30.9.2000 ([f])
			Nesnice	—	300 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 600 EU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 60 % pšenice	30.9.2000 ([f])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
32	Endo-l,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2. 1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), z najnižjim delovanjem: 200 U (44)/ml	Piščanci za pitanje	—	100 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 30 % ječmena	30.9.2000 (g)
		1 200 U/ml	Pujski	Štirje meseci	400 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 55 % ječmena	30.9.2000 (g)
			Prašiči za pitanje	—	500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 70 % ječmena	30.9.2000 (g)

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
33	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), z najnižjim delovanjem: Prašek: 2 000 U [45]/g Tekočina: 5 000 U/ml	Piščanci za pitanje	—	500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 2 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 55 % pšenice ali 60 % rži	30.9.2000 (g)
			Nesnice	—	2 000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice	30.9.2000 (g)
		Prašek: 4 000 U/g Tekočina: 10 000 U/ml	Pujski	Štirje meseci	5 000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 5 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 45 % pšenice	30.9.2000 (g)

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Prašek: 4 000 U/g Tekočina: 8 000 U/ml	Prašiči za pitanje	—	4 000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 4 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % pšenice	30.9.2000 (g)
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Alfa-amilaza EC 3.2.1.1	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (NRRL 25541), in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Aspergillus orysae* (ATCC 66222), z najnižjim delovanjem: Endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 275 U (46)/g Endo-1,4-beta-ksilanaze: 400 U (47)/g Alfa-amilaze: 3 100 U (48)/g	Pujski	Štirje meseci	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 240 U Alfa-amilaza: 1 860 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 165 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 240 U alfa-amilaze: 1 860 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo žitarice, bogate s škrobnimi in neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani in beta-glukani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 45 % ječmena in 10 % pšenice ali 10 % koruze	30.9.2000 (g)

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
35	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), z najnižjim delovanjem: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 80 U ([49])/g endo-1,4-beta-ksilanaze: 180 U ([50])/g	Nesnice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 80 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 180 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 60 % ječmena	30.9.2000 ([h])
36	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), z najnižjim delovanjem: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 300 U ([51])/g endo-1,4-beta-ksilanaze: 300 U ([52])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 300 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 300 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.9.2000 ([h])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 300 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 300 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 35 % ječmena	30.9.2000 [h]
37	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Subtilizin EC 3.2.21.62	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), z najnižjim delovanjem za: endo-1,4-beta-ksilanazo: 2 500 U [53]/g subtilizin: 800 U [54]/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U Subtilizin: 160 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaze: 500 do 2 500 U subtilizina: 160 do 800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 65 % pšenice	30.9.2000 [h]
			Purani	—	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 825 U Subtilizin: 265 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaze: 825 do 2 500 U subtilizina: 265 do 800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 45 % pšenice	30.9.2000 [h]

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
38	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Subtilizin EC 3.2.21.62	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), z najnižjim delovanjem za: endo-1,4-beta-ksilanazo: 5 000 U ([55])/g subtilizin: 500 U ([56])/g	Pujski	Štirje meseci	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U Subtilizin: 500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaze: 5 000 U subtilizina: 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 40 % pšenice	30.9.2000 ([h])
39	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), z najnižjim delovanjem za: endo-1,3(4)-beta-glukanazo: 400 U ([57])/g endo-1,4-beta-ksilanazo: 400 U ([58])/g	Prašiči za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 400 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 400 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem beta-glukani in arabinoksilani), npr. tistimi, ki vsebujejo več kakor 65 % ječmena	30.9.2000 ([h])
40	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Subtilizin EC 3.2.21.62	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), z najnižjim delovanjem za: endo-1,3(4)-beta-glukanazo: 100 U ([59])/g endo-1,4-beta-ksilanazo: 300 U ([60])/g subtilizin: 800 U ([61])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 90 U Subtilizin: 240 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 30 do 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 90 do 300 U subtilizina: 240 do 800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 60 % ječmena	30.9.2000 ([h])

Št.	Dodatek	Kemijska fonnula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
41	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8 Subtilizin EC 3.2.21.62	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), z najnižjim delovanjem za: endo-1,3(4)-beta-glukanazo: 100 U ([62])/g endo-1,4-beta-ksilanazo: 2 500 U ([63])/g subtilizin: 800 U ([64])/g	Piščanci za pitanje	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 625 U Subtilizin: 200 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 25 do 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 625 do 2 500 U subtilizina: 200 do 800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 10 % ječmena	30.9.2000 ([h])
			Nesnice	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U Subtilizin: 800 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaze: 2 500 U subtilizina: 800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 50 % pšenice in 25 % ječmena	30.9.2000 ([h])
42	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), z najnižjim delovanjem v: Trdnem stanju: 4 000 U ([65])/g Lastnosti dovoljenega pripravka: endo-1,4-beta-ksilanaza: 1,99 % pšenica: 97,7 % kalcijev propionat: 0,3 % lecitin: 0,01 %	Pujski	Štirje meseci	4 000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 4 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani), npr. tistih, ki vsebujejo več kakor 60 % pšenice	30.9.2000 ([h])

MIKROORGANIZMI

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
1	*Bacillus cereus* različice *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Pripravek iz bacila *Bacillus cereus* različice *toyoi*, ki vsebuje najmanj 1×10^{10} CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	—	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: monenzin natrij, lasolacit natrij, salinomicin natrij, amprolium-etopabat, metilklorpindol-metilni nenzokvat, dekokvinat, robenidin, narasin, halofuginon	30.9.2000 (g)
			Kokoši nesnice	—	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (g)
			Teleta	Šest mesecev	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (g)
			Teleta za pitanje	—	$0{,}2 \times 10^9$	$0{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina bacila *Bacillus cereus* različice *toyoi* v dnevnem odmerku ne sme presegati $1{,}0 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte $0{,}2 \times 10^9$ CFU	30.9.2000 (g)

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
			Plemenske svinje	—	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: robenidin	30.9.2000 (g)
			Kunci za pitanje	—	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: metilklorpindol, robenidin, salinomicin natrij	30.9.2000 (g)
3	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Pripravek *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj 5 x 10^9 CFU/g dodatka	Kunci za pitanje	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: metilklorpindol	30.9.2000 (d)
			Svinje	—	5×10^9	$2{,}5 \times 10^{10}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (d)
			Pujski	Štirje meseci	5×10^9	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (d)

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
4	*Bacillus cereus* ATCC 14 893	Pripravek iz bacila *Bacillus cereus*, ki vsebuje najmanj 10^{10} CFU/g dodatka	Pujski	Štirje meseci	5×10^8	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 [d]
			Prašiči za pitanje	—	2×10^8	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 [d]
			Svinje	15 dni pred brejostjo in med dojenjem	$8{,}5 \times 10^8$	$1{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 [d]
			Teleta	16 tednov	1×10^9	$1{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 [d]
			Piščanci za pitanje	—	2×10^8	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, halofuginon, lasalocid natrij, maduramicin amonij, monenzin natrij, narasin, salinomicin natrij, metilklorpindol, diklazuril	30.9.2000 [d]
			Purani za pitanje	26 tednov	2×10^8	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, halofuginon, metilklorpindol/metilbenzokvat, diklazuril, nifursol	30.9.2000 [d]

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
5	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	Pripravek s *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj 1 x 10^8 CFU/g dodatka	Teleta	Šest mesecev	2×10^8	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (d)
			Teleta za pitanje	—	$1{,}7 \times 10^8$	$1{,}7 \times 10^8$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina *Saccharomice cerevisiae* v dnevnem odmerku ne sme presegati 7,5 x 10^8 CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte 1 x 10^8 CFU	30.9.2000 (f)
6	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Pripravek s *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj 2 x 10^{10} CFU/g dodatka	Svinje	—	2×10^9	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (d)
			Pujski	Štirje meseci	6×10^9	3×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (d)
7	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Pripravek s *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj 2 x 10^{10} CFU/g dodatka	Krave molznice	—	$5{,}5 \times 10^8$	$2{,}1 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina *Saccharomice cerevisiae* v dnevnem odmerku ne sme presegati 8,4 x 10^9 CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte 1,8 x 10^9 CFU	30.9.2000 (d)

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
			Teleta za pitanje	—	1×10^9	$1{,}5 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina *Saccharomice cerevisiae* v dnevnem odmerku ne sme presegati 4,6 x 10^9 CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte 2 x 10^9 CFU	30.9.2000 ([d])
8	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (v razmerju 1:1)	Mešanica *Enterococcus faecium*v kapsulah ATCC 53519 in *Enterococcus faecium*v kapsulah ATCC 55593, ki vsebuje najmanj 2 x 10^8 CFU/g dodatka (to je najmanj 1 x 10^8 CFU/g vsake bakterije)	Piščanci za pitanje	—	1×10^8	1×10^8	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, dekokvinat, halofuginon, lasalocid natrij, maduramicin amonij, monensin natrij, narasin, nikarbazin, narasin/nikarbazin, salinomicin natrij	30.9.2000 ([d])
9	*Pedicoccus acidilactici* CNCM MA 18/5M	Pripravek s *Pedicoccus acidilactici*, ki vsebuje najmanj 1 x 10^{10} CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	—	1×10^9	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, metilklorpindol, dekokvinat, halofuginon, narasin, salinomicin natrij, nikarbazin, maduramicin amonij, diklazuril	30.9.2000 ([f])
			Pujski	Štirje meseci	1×10^9	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 ([f])

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči	—	1×10^9	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (f)
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Pripravek z *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: V mikrokapsulah: $1{,}0 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka $1{,}75 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	—	$0{,}3 \times 10^9$	$2{,}8 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, amprolium/etopabat, diklazuril, halofuginon, maduramicin amonij, metilklorpindol, metilklorpindol/metilbenzokvat, monensin natrij, robenidin, salinomicin natrij	30.9.2000 (f)
			Prašiči	—	$0{,}35 \times 10^9$	$1{,}5 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (f)
			Svinje	—	$0{,}2 \times 10^9$	$1{,}25 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (f)
			Teleta za pitanje	—	$0{,}25 \times 10^9$	$0{,}6 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina *Enterococcus faecium* v dnevnem odmerku ne sme presegati 1×10^9 CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte 1×10^9 CFU	30.9.2000 (f)

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek z *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: V mikrokapsulah: 1,0 x 10^{10} CFU/g dodatka 1,75 x 10^{10} CFU/g dodatka in V granulat: 3,5 x 10^{10} CFU/g dodatka	Pujski	Štirje meseci	0,3 × 10^9	1,4 × 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Granulat je treba uporabljati izključno v nadomestkih za mleko	30.9.2000 (f)
			Teleta	Šest mesecev	0,35 × 10^9	6,6 × 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Granulat je treba uporabljati izključno v nadomestkih za mleko	30.9.2000 (f)
11	*Enterococcus faecium* DSM 5464	Pripravek z *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj:	Pujski	Štirje meseci	0,5 × 10^9	1 × 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (f)
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	Pripravek z *Lactobacillus farciminis*, ki vsebuje najmanj:	Pujski	Štirje meseci	1 × 10^9	1 × 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (g)

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
13	*Enterococcus faecium* DSM 10 663/NCIMB 10 415	Pripravek z *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: V obliki praška in granulata: 3,5 x 10^{10} CFU/g dodatka V preliti obliki: 2,0 x 10^{10} CFU/g dodatka Tekočina: 1 x 10^{10} CFU/g dodatka	Pujski	Štirje meseci	1 × 10^{9}	1 × 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (g)
			Teleta	Šest mesecev	1 × 10^{9}	1 × 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (h)
			Piščanci za pitanje	—	1 × 10^{9}	1 × 10^{10}	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju 2. Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolium, amprolium/etopabat, dekokvinat, diklazuril, halofuginon, lasalocid natrij, maduramicin amonij, metilklorpindol/metilbenzokvat, monensin natrij, narasin, nikarbazin, robenidin, salinomicin natrij	30.9.2000 (h)
14	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39 885	Pripravek s *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj: V obliki praška, granulata okrogle in ovalne oblike: 1 x 10^{9} CFU/g dodatka	Pujski	Štirje meseci	3 × 10^{9}	3 × 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju	30.9.2000 (g)
			Teleta za pitanje	—	9 × 10^{9}	9 × 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri paletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem odmerku ne sme presegati 1,6 x 10^{10} CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže dodajte 3,2 x 10^{9} CFU	30.9.2000 (g)

(a) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 2316/98 (UL L 285, 28.10.1998, str. 4).
(b) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 639/1999 (UL L 82, 26.3.1999, str. 6).
(c) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 1245/1999 (UL L 150, 17.6.1999, str. 15).
(d) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 1436/98 (UL L 191, 7.7.1998, str. 15).
(e) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 2316/98 (UL L 295, 4.11.1998, str. 3).
(f) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 2316/98 (UL L 108, 27.4.1999, str. 21).
(g) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 2316/98 (UL L 164, 30.6.1999, str. 56).
(h) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) Št. 2316/98 (UL L 194, 27.7.1999, str. 17).
(1) 1 FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata na minuto iz natrijevega fitata pri pH 5,5 in 37° C.
(2) 1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata na minuto iz natrijevega fitata pri pH 5,5 in 37° C.
(3) 1 GALU je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol p-nitrofenil-alfa-galaktopiranozida na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(4) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,5 in 37° C.
(5) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 7,8 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz azo-pšeničnega arabinoksilana na minuto pri pH 6,0 in 50° C.
(6) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 3,1 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz azo-pšeničnega arabinoksilana na minuto pri pH 6,0 in 50° C.
(7) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 6,0 in 50° C.
(8) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola ksiloze iz azurin-navzkrižno-vezanega ksilana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(9) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola glukoze iz azurin-navzkrižno-vezanega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(10) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola glukoze iz azurin-navzkrižno-vezanega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(11) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola ksiloze iz azurin-navzkrižno vezanega ksilana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(12) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana na minuto pri pH 3,5 in 55° C.
(13) 1 RAU je količina encima, ki konvertira 1mg topljivega škroba v izdelek z enako absorbcijo v referenčno barvo pri 620 nm po reakciji z jodinom na minuto pri pH 6,6 in 30° C.
(14) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(15) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(16) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(17) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(18) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(19) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,0 in 40° C.
(20) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0, 278 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 3,5 in 40° C.
(21) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz pšeničnega arabinoksilana na minuto pri pH 3,5 in 55° C.
(22) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol ksiloze iz ksilana brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(23) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(24) 1 CU je količina encima, ki sprosti 0,128 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,5 in 30!!! error character !!! B!!! error character !!! 'I C.
(25) 1 EPU je količina encima, ki sprosti 0,0083 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 4,7 in 30° C.
(26) 1 AGL je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,6 in 30° C.
(27) 1 AGL je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,6 in 30° C.
(28) 1 AXC je količina encima, ki sprosti 17,2 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,7 in 30° C.
(29) 1 AXC je količina encima, ki sprosti 17,2 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,7 in 30° C.
(30) 1 BNG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,8 in 50° C.
(31) 1 IFP je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,8 in 50° C.
(32) 1 QXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 5,1 in 50° C.
(33) 1 QGU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,8 in 50° C.
(34) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30° C.
(35) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30° C.
(36) 1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,8 in 50° C.
(37) 1 BXU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz brezovega ksilana na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(38) 1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 4,8 in 50° C.
(39) 1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskih fosfatov iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5,0 in 37° C.
(40) 1 U je količina encima, ki sprosti 2,78 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 50° C.
(41) 1 U je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 50° C.
(42) 1 U je količina encima, ki sprosti 4,00 mikromole redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz brezovega ksilana na minuto pri pH 5,5 in 50° C.
(43) 1 EU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,5 in 40° C.
(44) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(45) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(46) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30!!! error character !!! B!!! error character !!! 'I C.
(47) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ksilana ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30° C.
(48) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz pšeničnega škroba na minuto pri pH 4,0 in 30° C.
(49) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(50) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(51) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(52) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(53) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(54) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz kazeinskega substrata na minuto pri pH 7,5 in 40° C.
(55) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.

(56) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz kazeinskega substrata na minuto pri pH 7,5 in 40° C.
(57) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(58) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(59) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(60) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(61) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz kazeinskega substrata na minuto pri pH 7,5 in 40° C.
(62) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30° C.
(63) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.
(64) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz kazeinskega substrata na minuto pri pH 7,5 in 40° C.
(65) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50° C.