KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2439/1999,

annettu 17 päivänä marraskuuta 1999,

sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY [1], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1636/1999 [2], ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Joistakin Saksan liittotasavallassa sijaitsevista kaivoksista peräisin olevan kaoliinipitoisen saven on todettu sisältävän hyvin korkeita dioksiinipitoisuuksia. Käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseessä saattaisi olla geologista alkuperää oleva saastuminen.

2) Direktiivin 70/524/ETY 11 artiklan mukaisesti jäsenvaltio voi väliaikaisesti keskeyttää jonkin direktiivissä hyväksytyn lisäaineen käytön hyväksymisen, jos jäsenvaltio uusien tietojen tai kyseisten säännösten voimaantulon jälkeen tapahtuneen aiempien tietojen uudelleenarvioinnin nojalla toteaa, että kyseinen lisäaine on eläinten tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle vaarallinen.

3) Useat jäsenvaltiot ovat kieltäneet dioksiinin saastuttaman kaoliinipitoisen saven käytön esiseoksissa ja rehussa.

4) Direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklan b kohdan nojalla lisäaine hyväksytään ainoastaan, jos se ei sen käyttöolosuhteet huomioon ottaen vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen eikä ympäristöön.

5) Dioksiinien saastuttaman rehun käyttö saattaa saastuttaa eläinperäiset elintarvikkeet. Tunnustetut kansainväliset organisaatiot luokittelevat dioksiinit ihmisille syöpää aiheuttaviksi. Nämä kansainväliset organisaatiot suosittelevat toteutettavaksi toimenpiteitä, joilla dioksiinien määrä ravinnossa saataisiin niin alhaiseksi kuin mahdollista.

6) Saastuneita lisäaineita olisi vältettävä kaikin mahdollisin keinoin.

7) Täydellinen riskinarviointi on riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen vuoksi mahdotonta. Ottaen huomioon rehun liiallisen saastumisen estämiseksi toteutettavien toimenpiteiden kiireellisyys ja odotettaessa saven valvontaohjelman sekä riskinarvioinnin tuloksia kaoliinipitoisen saven dioksiinipitoisuus olisi varotoimenpiteenä rajoitettava samaksi kuin dioksiinin analyysiherkkyyden alaraja. Toteutettavien tutkimusten ja käyttöön otettavan valvontaohjelman perusteella raja-arvo voitaisiin arvioida uudelleen.

8) Saksassa todettu kaoliinisaastuminen saattaa koskea muuta direktiivin 70/524/ETY nojalla sidonta-aineeksi, paakkuuntumisenestoaineeksi ja sakeuttamisaineeksi hyväksyttyä savea, mihin viittaa se, että Yhdysvalloissa eräästä kaivoksesta peräisin oleva plastinen savi eli kaoliniitin lisäksi myös muita mineraaleja sisältävä sedimenttisavi osoittautui myös geologista alkuperää olevan dioksiinin luonnostaan voimakkaasti saastuttamaksi. Kaiken sallitun saven mahdollisen dioksiinipitoisuuden tutkiminen on aiheellista sisällyttää valvontaohjelmaan. Toistaiseksi tarkoituksena on soveltaa väliaikaista ylärajaa ainoastaan kaoliinipitoiseen saveen, ja analyysiherkkyyden alarajaa sovelletaan ylärajana tarkkaan määritellyn ajan jälkeen muuhun kuin kaoliinipitoiseen saveen niin kauan kuin mahdollisesti vaadittavaa erityistä, riittäviin tietoihin perustuvaa dioksiinipitoisuuden ylärajaa ei ole vahvistettu.

9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytykset korvataan direktiivin 70/524/ETY mukaisesti tämän asetuksen liitteessä olevilla edellytyksillä.

Komissio tarkastelee toteutettavien tutkimusten ja valvontaohjelman perusteella uudelleen tämän asetuksen säännöksiä ennen 1 päivää maaliskuuta 2000.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

[1] EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] EYVL L 194, 27.7.1999, s. 17.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 1999.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
Sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet								
E 330	Sitruunahappo	$C_6H_8O_7$	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut 16 artiklan 1 kohdan g alakohdan säännöksiä noudattaen	Ei määräaikaa
E 470	Natrium-, kalium- ja kalsiumstearaatit	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ ja $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 516	Kalsiumsulfaatti, dihydraatti	$CaSO_4 . 2H_2O$ Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	30 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551a	Piihappo, saostettu ja kuivattu	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551b	Kolloidinen silikaatti	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 551c	Piimaa (piilevämaa, puhdistettu)	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 552	Kalsiumsilikaatti, synteettinen	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 554	Natriumalumiinisilikaatti, synteettinen	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 558	Bentoniitti/montmorilloniitti	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut Sekoittaminen ”antibiootit”, ”kasvunedistäjät”, ”kokkidiostaatit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet” -ryhmiin kuuluvien aineiden kanssa on kielletty lukuun ottamatta seuraavia aineita: monensiininatrium, narasiini, lasalosidinatrium, flavofosfolipoli, salinomysiininatrium, nikarbatsiini ja robenidiini. Tuoteselosteeseen on merkittävä lisäaineen nimi.	Ei määräaikaa

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
E 559	Kaoliinit, asbestivapaat	Luonnossa esiintyvät kivennäisseokset, jotka sisältävät vähintään 65 % kompleksisia, vesipitoisia alumiinisilikaatteja, joiden pääkomponenttina on kaoliniitti Dioksiinien enimmäispitoisuus: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 560	Steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvät seokset	Steatiitin ja kloriitin luonnossa esiintyvät asbestivapaat seokset, joiden vähimmäispuhtaus on 85 % Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 561	Vermikuliitti	Magnesiumin, alumiinin ja raudan luonnossa esiintyvä asbestivapaa silikaatti, joka on paisutettu lämpökäsittelyllä Fluorin enimmäispitoisuus: 0,3 % Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 562	Sepioliitti	Vähintään 60 % sepioliittia ja enintään 30 % montmorilloniittiä sisältävä, sedimenttialkuperää oleva, hydratoitu asbestivapaa magnesiumsilikaatti Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 563	Sepioliittisavi	Vähintään 40 % sepioliittia ja 25 % illiittiä sisältävä, sedimenttialkuperää oleva, hydratoitu asbestivapaa magnesiumsilikaatti Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 565	Lignosulfonaatit	— Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 566	Natroliittifonoliitti	Luonnosta peräisin oleva seos, joka sisältää alumiinisilikaatteja, alkaali- ja maa-alkaalimetallien sekä alumiinin hydrosilikaatteja, natroliittia (43—46,5 %) ja muita natriumalumiinisilikaatteja Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	25 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa

EY N:o	Lisäaine	Kemiallinen kaava tai kuvaus	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Määräaika
					mg/kg täysrehua			
E 598	Synteettiset kalsiumaluminaatit	Kalsiumaluminaattien seos, joka sisältää 35—51 % Al_2O_3 Molybdeenin enimmäispitoisuus: 20 mg/kg Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Siipikarja	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Kaniinit	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Siat	—	—	20 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Lypsylehmät	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Lihanaudat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Vasikat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Karitsat	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
			Kilit	—	—	8 000	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
E 599	Perliitti	Luonnossa esiintyvä asbestivapaa natrium- ja alumiinisilikaatti, jota on paisutettu lämpökäsittelyllä Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Kaikki eläinlajit ja -ryhmät	—	—	—	Kaikki rehut	Ei määräaikaa
Sidonta-aineet, paakkuuntumisenestoaineet ja sakeuttamisaineet								
3	Tuliperäinen klinoptiloliitti	Tuliperäisen alumiinisilikaatin kalsiumhydraatti, josta vähintään 85 % on klinoptiloliittia ja enintään 15 % maasälpää, kiillettä ja savea Lyijyn enimmäispitoisuus: 80 mg/kg Dioksiinien enimmäispitoisuus (1):	Siat	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000
			Kaniinit	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000
			Siipikarja	—	—	20 000	Kaikki rehut	30.9.2000

(1) Niin kauan kuin mahdollisesti vaadittavaa erityistä, riittäviin tietoihin perustuvaa dioksiinipitoisuuden ylärajaa ei ole vahvistettu, ylärajana sovelletaan 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg 1 päivästä maaliskuuta 2000.

(2) Dioksiinipitoisuus on polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF) summa ilmaistuna maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 1997).

Pitoisuus on ilmoitettava korkeimpana mahdollisena pitoisuutena, toisin sanoen pitoisuudet on laskettava olettaen, että kaikkien eri aineiden analyysiherkkyyden alarajan alapuolella olevat arvot ovat yhtä suuria kuin analyysiherkkyyden alaraja.