31994L0030

23.7.1994 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 189/70

DYREKTYWA RADY 94/30/WE
z dnia 23 czerwca 1994 r.
zmieniająca załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, i przewidująca ustanowienie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni ([1]), w szczególności jej art. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

w ramach dyrektywy 90/642/EWG Komisja została upoważniona do przygotowania wykazu pozostałości pestycydów i ich najwyższych dopuszczalnych poziomów, do zatwierdzenia przez Radę;

pozostałości pestycydów mogą się pojawiać w produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, jako wynik praktyk rolnych; do ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów dla tych pierwszych konieczne jest uwzględnienie odpowiednich danych dotyczących zarówno dozwolonego stosowania pestycydów, jak i nadzorowanych testów; jednakże dostępne dane często są niewystarczające w świetle obecnych norm do ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów;

w celu lepszego oszacowania spożycia pozostałości pestycydów właściwe jest ustalenie równocześnie, w miarę możliwości, najwyższych dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych pestycydów we wszystkich głównych składnikach pokarmu; poziomy te odzwierciedlają użycie minimalnych ilości pestycydów w celu osiągnięcia odpowiedniej kontroli, stosowanych w taki sposób, że ilość pozostałości jest najmniejsza z praktycznego i z toksykologicznego punktu widzenia;

teraz jest właściwe, aby najwyższe dopuszczalne poziomy zostały ustalone dla niektórych pestycydów, a mianowicie: daminozydu, lambda-cyhalotryny, propikonazolu, karbofuranu, karbosulfanu, benfurakarbu, furatiokarbu, cyflutryny, metalaksylu, benalaksylu, fenarymolu oraz etefonu w produktach pochodzenia roślinnego; jednakże nie jest możliwe ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów dla wszystkich kombinacji produktów zawierających pozostałości pestycydów z powodu braku wystarczających danych;

w przypadkach braku wystarczających danych wyznacza się okres w celu uzyskania niezbędnych danych; okres nie przekraczający czterech lat wydaje się być odpowiedni do tego celu; dlatego najwyższe dopuszczalne poziomy powinny być ustanowione na podstawie takich danych nie później niż do dnia 30 czerwca 1999 r.; niedostarczenie zadowalających danych zazwyczaj prowadzi do ustanowienia poziomów na właściwym poziomie oznaczenia;

najwyższe dopuszczalne poziomy ustanowione w niniejszej dyrektywie będą musiały być poddane przeglądowi w ramach ponownej oceny substancji czynnych, przewidzianej w programie prac ustanowionym w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin ([2]),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG dodaje się następujące pozostałości pestycydów:

([1]) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/58/EWG (Dz.U. L 211 z 23.8.1993, str. 6).

([2]) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 93/71/EWG (Dz.U. L 221 z 31.8.1993, str. 27).

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg		
	Daminozyd (suma daminozydu oraz 1,1-dimetylohydrazyny, wyrażona jako daminozyd)	Lambda-cyhalotryna	Propikonazol
1. **Owoce, świeże, suszone lub niegotowane i zakonserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**			
i) OWOCE CYTRUSOWE	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
grejpfruty			
cytryny			
limy			
mandarynki (włączając klementynki i podobne mieszańce)			
pomarańcze			
pomele			
inne			
ii) *ORZECHY (łuskane lub niełuskane)*	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
migdały			
orzechy brazylijskie			
orzechy nerkowca,			
kasztany jadalne			
orzechy kokosowe			
orzechy laskowe			
orzechy makadamia			
orzeszki pekan			
orzeszki sosnowe			
pistacje			
orzechy włoskie			
pozostałe			
iii) OWOCE ZIARNKOWE		0,1	0,05 (*)
jabłka	0,02 (*) (×)		
gruszki			
pigwy			
pozostałe	0,02 (*)		
iv) OWOCE PESTKOWE	0,02 (*)		
morele		0,2	0,2
wiśnie			(b)
brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne mieszańce)		0,2	0,2
śliwki			(b)
pozostałe		0,1	0,05 (*)
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE	0,02 (*)		
a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*		0,2	0,5
winogrona stołowe			
winogrona do produkcji wina			
b) *Truskawki (poza dziko rosnącymi)*		(a)	0,05 (*)

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg		
	Daminozyd (suma daminozydu oraz 1,1-dimetylohydrazyny, wyrażona jako daminozyd)	Lambda-cyhalotryna	Propikonazol
c) *Owoce roślin z rodziny różowatych* (poza dziko rosnącymi):		0,02	0,05 (*)
jeżyny			
jeżyny popielice			
owoce mieszańców jeżyn z malinami			
maliny			
pozostałe			
d) *Pozostałe drobne owoce i owoce jagodowe* (poza dziko rosnącymi)			0,05
borówka czarna (owoce z gatunku *Vaccinum myrtyllus*)			
żurawiny			
porzeczki (czerwone, czarne i białe)		0,1	
agrest		0,1	
pozostałe		0,02 (*)	
e) *dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce*		0,02 (*)	0,05 (*)
vi) RÓŻNE	0,02 (*)	0,02 (*)	
awokado			
banany			
daktyle			
figi			
kumkwat			
liczi			
mango			
oliwki			
owoce męczennicy			
ananasy			
granaty			
pozostałe			0,05 (*)
2. **Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone**			
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
buraki			
marchew			
seler			
chrzan			
karczoch jerozolimski			
pasternak			
korzeń pietruszki			
rzodkiewki			
salsefia			
słodkie ziemniaki			
brukiew			
rzepa			
pochrzyn			
pozostałe			

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg		
	Daminozyd (suma daminozydu oraz 1,1-dimetylohydrazyny, wyrażona jako daminozyd)	Lambda-cyhalotryna	Propikonazol
ii) WARZYWA CEBULOWE	0,02 (*)		0,05 (*)
czosnek			
cebula			
cebula szalotka			
cebula dymka		(a)	
pozostałe		0,02 (*)	
iii) WARZYWA OWOCOWE	0,02 (*)		
a) *psiankowate*		(a)	
pomidory			
papryka			
oberżyny			(b)
pozostałe			0,05 (*)
b) *dyniowate — z jadalną skórką*		0,1	(b)
ogórki			
korniszony			
cukinie			
pozostałe			
c) *dyniowate — z niejadalną skórką*		*(a)*	*(b)*
melony			
dynie			
arbuzy			
pozostałe			
d) *kukurydza słodka*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *kwiatostanowe*:		(a)	
brokuły			
kalafiory			
pozostałe			
b) *głowiaste*			
kapusta brukselska		0,05	
kapusta głowiasta		0,2	
pozostałe		0,02 (*)	
c) *liściaste*.		(a)	
kapusta pekińska			
jarmuż			
pozostałe			
d) *kalarepa*		(a)	
v) WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *sałata i podobne*		1	
rzeżucha			
roszponka jadalna			
sałata			
skarolia			
pozostałe			
b) *szpinak i podobne*		*(a)*	
boćwina (burak pastewny)			
c) *rukiew wodna*		0,02 (*)	

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg		
	Daminozyd (suma daminozydu oraz 1,1-dimetylohydrazyny, wyrażona jako daminozyd)	Lambda-cyhalotryna	Propikonazol
d). *cykoria*		(a)	
e). *zioła*		1	
trybula			
szczypiorek			
pietruszka			
seler liściasty			
pozostałe			
vi). *WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)*	0,02 (*)		0,05 (*)
fasola (ze strąkami)		0,2	
fasola (bez strąków)			
groch (ze strąkami)		0,2	
groch (bez strąków)		0,2	
pozostałe		0,02 (*)	
vii). *WARZYWA ŁODYGOWE*	0,02 (*)		
szparagi		0,02 (*)	
karczochy hiszpańskie			(b)
seler zwyczajny			
koper włoski			(b)
karczochy			
pory			
rabarbar			
pozostałe		(a)	0,05 (*)
viii). GRZYBY	0,02 (*)		0,05 (*)
grzyby hodowlane		(a)	
grzyby dziko rosnące		0,02 (*)	
3. **Rośliny strączkowe**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
fasolka			
soczewica			
groch			
pozostałe			
4. **Nasiona roślin oleistych**	0,05 (*)	0,02	
siemię lniane			(b)
orzeszki ziemne			
ziarna maku			
ziarna sezamu			
ziarna słonecznika (w łuskach)			
nasiona rzepaku			
ziarna soi			
ziarna gorczycy			
nasiona bawełny			
pozostałe			0,05 (*)
5. **Ziemniaki**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
wczesne i towarowe			
ziemniaki			
6. **Herbata (czarna herbata uzyskiwana z liści c *amellia sinensis)***	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Chmiel (suszony) łącznie z granulatem chmielu i nieskoncentrowanym proszkiem**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg			
	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażone jako karbofuran)	Karbofuran	Benfurokarb	Furatiokarb
1. **Owoce, świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez zamrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**				
i) OWOCE CYTRUSOWE	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
grejpfruty				
cytryny				
limy				
mandarynki (włączając klementynki i podobne mieszańce)				
pomarańcze				
pomele				
pozostałe				
ii) *ORZECHY (łuskane lub niełuskane)*		0,05 (*)		0,05 (*)
migdały				
orzechy brazylijskie				
orzechy nerkowca				
kasztany jadalne				
orzechy kokosowe				
orzechy laskowe	(c)		(b)	
orzechy makadamia				
orzeszki pekan				
orzechy sosnowe				
pistacje				
orzechy włoskie				
pozostałe	0,01 (*)		0,05 (*)	
iii) OWOCE ZIARNKOWE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
jabłka				
gruszki				
pigwy				
pozostałe				
iv) OWOCE PESTKOWE	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
morele				
wiśnie				
brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne mieszańce)				
śliwki				
pozostałe				
v). OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Winogrona stołowe i do produkcji wina*	0,01 (*)			
winogrona stołowe				
winogrona do produkcji wina				
b) *Truskawki* (poza dziko rosnącymi)	(c)			
c) *Owoce roślin z rodziny różowatych(poza dziko rosnącymi)*	0,1 (*)			
jeżyny				
jeżyny popielice				
owoce mieszańców jeżyn z malinami				
maliny				
pozostałe				

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg			
	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażone jako karbofuran)	Karbofuran	Benfurokarb	Furatiokarb
d) *Pozostałe drobne owoce i owoce jagodowe* (poza dziko rosnącymi)	0,1 (*)			
borówka czarna (owoce zgatunku *Vaccinum myrtyllus)*				
żurawiny				
porzeczki (czerwone, czarne i białe)				
agrest				
pozostałe				
e) *Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce*	0,1 (*)			
vi) RÓŻNE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
awokado				
banany				
daktyle				
figi				
kiwi				
kumkwat				
liczi				
mango				
oliwki stołowe				
oliwki do produkcji oliwy				
owoce męczennicy				
ananasy				
granaty				
pozostałe				
2. **Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone**				
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE			0,05 (*)	0,05 (*)
buraki				
marchew	0,3	0,1		
seler	(c)			
chrzan				
karczoch jerozolimski				
pasternak	0,3	0,1		
korzeń pietruszki				
rzodkiewki	0,5			
salsefia				
słodkie ziemniaki				
brukiew	(c)	(b)		
rzepa	(c)	(b)		
pochrzyn				
pozostałe	0,1 (*)	0,05 (*)		
ii) WARZYWA CEBULOWE			0,05 (*)	0,05 (*)
czosnek	0,3			
cebula	0,3	*(b)*		
cebula szalotka	0,3			
cebula dymka				
pozostałe	0,1 (*)	0,05 (*)		

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg			
	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażone jako karbofuran)	Karbofuran	Benfurokarb	Furatiokarb
iii) WARZYWA OWOCOWE				
a) *Psiankowate*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
pomidory				
papryka				
oberżyny				
pozostałe				
b) *dyniowate — z jadalną skórką*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
ogórki				
korniszony				
cukinie				
pozostałe				
c) *dyniowate — z niejadalną skórką*		(b)	(b)	0,05 (*)
melony	(c)			
dynie				
arbuzy				
pozostałe	0,1 (*)			
d) *kukurydza słodka*	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE				
a) *kwiatostanowe*	0,2	(b)	(b)	0,1
brokuły				
kalafiory				
pozostałe				
b) *głowiaste*	(c)	(b)	(b)	0,05
kapusta brukselska				
kapusta głowiasta				
pozostałe				
c) *liściaste*	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
kapusta pekińska				
jarmuż				
pozostałe				
d) *kalarepa*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *sałata i podobne*				
rzeżucha				
roszponka jadalna				
sałata				
skarolia				
pozostałe				
b) *szpinak i podobne*				
boćwina (burak pastewny)				
c) *rukiew wodna*				
d) *cykoria*				

Gupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg			
	Karbofuran (suma karbofuranu i 3-hydroksykarbofuranu wyrażone jako karbofuran)	Karbofuran	Benfurokarb	Furatiokarb
e) *zioła*				
trybula				
szczypiorek				
pietruszka				
seler liściasty				
pozostałe				
vi) *WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)*		0,05 (*)	0,05 (*)	
fasola (ze strąkami)	*(c)*			*(b)*
fasola (bez strąków)	*(c)*			*(b)*
groch (ze strąkami)				
groch (bez strąków)				
pozostałe	0,1 (*)			0,05 (*)
vii) *WARZYWA ŁODYGOWE*			0,05 (*)	
szparagi				
karczochy hiszpańskie				
seler zwyczajny	*(c)*	*(b)*		*(b)*
koper włoski				
karczochy				
pory	*(c)*	*(b)*		
rabarbar				
pozostałe	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) GRZYBY	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
grzyby hodowlane				
grzyby dziko rosnące				
3. **Rośliny strączkowe**		0,05 (*)	0,05 (*)	
fasolka	(c)			(b)
soczewica				
groch				
pozostałe	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Nasiona roślin oleistych**		0,05 (*)		
siemię lniane	(c)			
orzeszki ziemne	(c)			
ziarna maku				
ziarna sezamu	(c)			
ziarna słonecznika	(c)	(b)		
nasiona rzepaku	(c)	(b)		(b)
ziarna soi	(c)			(b)
ziarna gorczycy				
nasiona bawełny	(c)	(b)	(b)	(b)
pozostałe	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Ziemniaki**	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
wczesne i towarowe ziemniaki				
6. **Herbata (czarna herbata uzyskana z liści *camellia sinensis*)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Chmiel (suszony, łącznie z granulatem chmielu i niekoncentrowanym proszkiem)**	10	(b)	5	5

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy (mg/kg)				
	Cyflutryna, łącznie z pozostałymi składnikami izomerycznymi (suma izomerów)	Metalaksyl	Benelazyl	Fenarymol	Etefon
1. **Owoce, świeże, suszone albo niegotowane i zakonserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy**					
i) OWOCE CYTRUSOWE	0,02 (*)	*(b)*	0,05 (*)	0,02 (*)	*(b)*
grejpfruty					
cytryny					
limy					
mandarynki (włączając klementynki i podobne mieszańce)					
pomarańcze					
pomelo					
pozostałe					
ii) *ORZECHY (łuskane lub niełuskane)*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
migdały					
orzechy brazylijskie					
orzechy nerkowca					
kasztany jadalne					
orzechy kokosowe					
orzechy laskowe					
orzechy makadamia					
orzeszki pekan					
orzeszki sosnowe					
pistacje					
orzechy włoskie					
pozostałe					
iii) OWOCE ZIARNKOWE	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
jabłka					
gruszki					
pigwy					
pozostałe					
iv) OWOCE PESTKOWE			0,05 (*)	(a)	
morele					
wiśnie	0,2	(b)			3
brzoskwinie (włączając nektaryny i podobne mieszańce)		(b)			
śliwki	0,2				
pozostałe	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE					
a) *winogrona stołowe i do produkcji wina*	0,3		0,2	0,3	(b)
winogrona stołowe		2			
winogrona do produkcji wina		1			
b) *truskawki* (poza dziko rosnącymi)	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) *Owoce roślin z rodziny różowatych*(poza dziko rosnącymi)	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
jeżyny					
jeżyny popielice					
owoce mieszańców jeżyn z malinami					
maliny				(a)	
pozostałe				0,02 (*)	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy (mg/kg)				
	Cyflutryna, łącznie z pozostałymi składnikami izomerycznymi (suma izomerów)	Metalaksyl	Benelazyl	Fenarymol	Etefon
d) *pozostałe drobne owoce i owoce jagodowe*(poza dziko rosnącymi		0,05 (*)	0,05 (*)		
borówka czarna (owoce z *gatunku Vaccinum myrtyllus)*					
żurawiny					
porzeczki (czerwone, czarne i białe)	(a)			1	5
agrest	(a)			1	
pozostałe	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *dzikie owoce jagodowe i dzikie i owoce*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) RÓŻNE	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
awokado		(b)			
banany					
daktyle					
figi					(b)
kiwi		(b)			
kumkwat					
liczi					
mango					
oliwki stołowe					(b)
oliwki do produkcji oliwy					(b)
owoce męczennicy					
ananasy					(b)
granaty					
pozostałe		0,05 (*)			0,05 (*)
2. **Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone**					
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
buraki					
marchew		0,1			
seler					
chrzan					
karczochy jerozolimskie					
pasternak		0,1			
korzeń pietruszki					
rzodkiewki					
salsefia			(b)		
słodkie ziemniaki					
brukiew					
rzepa					
pochrzyn					
pozostałe		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) WARZYWA CEBULOWE	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
czosnek					
cebula			0,2		(b)
cebula szalotka					
cebula dymka					
pozostałe			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) WARZYWA OWOCOWE					
a) *psiankowate*				(a)	
pomidory	0,05 (*)	(b)	0,2		3
papryka	(a)	(b)	0,2		3
oberżyny					
pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy (mg/kg)				
	Cyflutryna, łącznie z pozostałymi składnikami izomerycznymi (suma izomerów)	Metalaksyl	Benelazyl	Fenarymol	Etefon
b) *dyniowate — z jadalną skórką*	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
ogórki					
korniszony					
cukinia					
pozostałe					
c) *dyniowate z niejadalną skórką*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
melony		(b)	(b)		
dynie					
arbuzy		(b)	(b)		
pozostałe		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *kukurydza słodka*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
iv) WARZYWA KAPUSTNE			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *kwiatostanowe*		(b)			
brokuły	(a)				
kalafiory	0,05				
pozostałe	0,02 (*)				
b) *głowiaste*	0,2				
kapusta brukselska					
kapusta głowiasta		1			
pozostałe		0,05 (*)			
c) *liściaste*	(a)				
kapusta pekińska		(b)			
jarmuż		(b)			
pozostałe		0,05 (*)			
d) *kalarepa*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) WARZYWA LIŚCIASTE I ŚWIEŻE ZIOŁA			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *sałata i podobne*	0,5	(b)			
rzeżucha					
roszponka jadalna					
sałata			(b)		
skarolia					
pozostałe			0,05 (*)		
b) *szpinak i podobne*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
boćwina (burak pastewny)					
c) *rukiew wodna*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
d) *cykoria*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
e) *zioła*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
trybula					
szczypiorek					
pietruszka					
seler liściasty					
pozostałe					

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których ma zastosowanie MRL	Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy (mg/kg)				
	Cyflutryna, łącznie z pozostałymi składnikami izomerycznymi (suma izomerów)	Metalaksyl	Benelazyl	Fenarymol	Etefon
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
fasola (ze strąkami)					
fasola (bez strąków)					
groch (ze strąkami)				(a)	
groch (bez strąków)				(a)	
pozostałe				0,02 (*)	
vii) WARZYWA ŁODYGOWE			0,05 (*)		0,05 (*)
szparagi					
karczochy hiszpańskie					
seler zwyczajny					
koper włoski					
karczochy		(b)		(a)	
pory	(a)	(b)			
rabarbar					
pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) GRZYBY	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
grzyby hodowlane					
grzyby dziko rosnące					
3. **Rośliny strączkowe**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
fasolka					
soczewica					
groch					
pozostałe					
4. **Nasiona roślin oleistych**				0,02 (*)	0,05 (*)
siemię lniane		(b)			
orzeszki ziemne					
ziarna maku					
ziarna sezamu					
ziarna słonecznika					
nasiona rzepaku	0,05		(b)		
ziarna soi			(b)		
ziarna gorczycy					
nasiona bawełny					
pozostałe	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Ziemniaki**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
wczesne i towarowe ziemniaki					
6. **Herbata (czarna herbata uzyskana z liści c *amellia sinensis*)**	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Chmiel (suszony, łącznie z granulatem chmielu i niekoncentrowanym proszkiem)**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(*) od dnia 1 stycznia 1996 r.
(*) Wskazuje poziom oznaczenia analitycznego.
(a)(b)(c) od dnia 30 czerwca 1999 r. aż do czasu ustalenia nowych poziomów mają zastosowanie następujące najwyższe dopuszczalne poziomy:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 30 czerwca 1995 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 czerwca 1994 r.

W imieniu Rady

G. MORAITIS

Przewodniczący