Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/1410

2026 7 17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/1410

2026 m. birželio 26 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „Prisman Händedesinfektion“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2016 m. birželio 27 d. bendrovė „Schuelke & Mayr GmbH“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4 straipsnį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą tokiai pačiai biocidinių produktų grupei „Prisman Händedesinfektion“, kaip nurodytoji Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 1 straipsnyje, būtent 1-o tipo produktams, apibūdintiems Reglamento (ES) Nr. 528/2012 V priede. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-QG025240-55. Paraiškoje nurodyta biocidinių produktų grupė „desmanol pure“, autorizuota Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2025/1905 ([3]) (autorizacijos liudijimas Nr. EU-0033833-0000);

(2) biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ sudėtyje yra veikliosios medžiagos propan-2-olio, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą ir skirta naudoti 1-o tipo produktams gaminti;

(3) 2025 m. vasario 24 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([4]) ir biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ charakteristikų santraukos projektą pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 414/2013 6 straipsnį;

(4) savo nuomonėje Tarnyba padarė išvadą, kad siūlomi biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ ir susijusios referencinės biocidinių produktų grupės „desmanol pure“ skirtumai yra susiję tik su informacija, kuri gali keistis dėl administracinio pakeitimo pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 354/2013 ([5]), ir kad, remiantis susijusios referencinės biocidinių produktų grupės „desmanol pure“ vertinimu, jei laikomasi biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projekto, tokia pati biocidinių produktų grupė „Prisman Händedesinfektion“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 19 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka (OL L 125, 2013 5 7, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) 2025 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2025/1905, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „desmanol pure“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas (OL L, 2025/1905, 2025 10 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) 2025 m. vasario 24 d. Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonė dėl tokios pačios biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ Sąjungos autorizacijos liudijimo, UBP-C-1804198-07-00/F, https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) 2013 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 (OL L 109, 2013 4 19, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2025 m. lapkričio 13 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai peržiūrėtą biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(6) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir todėl mano, kad tokiai pačiai biocidinių produktų grupei „Prisman Händedesinfektion“ turėtų būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas;

(7) šio autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data turėtų būti suderinta su susijusios referencinės biocidinių produktų grupės „desmanol pure“ autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Schuelke & Mayr GmbH“ suteikiamas tokios pačios biocidinių produktų grupės „Prisman Händedesinfektion“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0034420-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2026 m. rugpjūčio 6 d. iki 2035 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Prisman Händedesinfektion

Produkto tipas (-ai)

PT01: Asmens higiena

Autorizacijos liudijimo numeris EU-0034420-0000

R4BP objekto numeris EU-0034420-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Prisman Händedesinfektion

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Schuelke & Mayr GmbH
	Adresas	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Autorizacijos numeris		EU-0034420-0000
R4BP objekto numeris		EU-0034420-0000
Autorizacijos liudijimo data		2026 m. rugpjūčio 6 d.
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		2035 m. rugsėjo 30 d.

1.4. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Prisman Chemie GmbH
Gamintojo adresas	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Vokietija
Gamybos vieta	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Vokietija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Propan-2-olis
Gamintojo pavadinimas	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Gamintojo adresas	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Vokietija
Gamybos vieta	INEOS Solvents Germany GmbH Römerstraße 733 47443 Moers Vokietija

2. PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (masės dalis)

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC1

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 1

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #1 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #2 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #3 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu

	Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 5 ml (saują) į delną (2–4 pumpavimo judesiais). Trinti rankas ir dilbius mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą (įpylimą, įtrynimą) dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #4 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos

	Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #5 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #6 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #7 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #7.1: (profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #7.2: (profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #7.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #7.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #7.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #7.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant riboto spektro virucidinį aktyvumą) Į delną įsipilti 5 ml (saują) (2–4 pumpavimo judesiais) produkto arba papumpuoti jo 5 ml (saują) į delną. Trinti rankas ir dilbius mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą (įpylimą, įtrynimą) dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #8 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #8.1: (Profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje, kosmetikos studijose, pagyvenusių žmonių priežiūroje ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #8.2: (Profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #8.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #8.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #8.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #8.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant riboto spektro virucidinį aktyvumą) Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #9 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas – bakterijos, mielės – įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys;

	Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #10 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #10.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #10.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #10.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #10.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #10.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #10.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant riboto spektro virucidinį aktyvumą) Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			Schülke® 21		
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0034420-0001 1-1		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,5 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC2

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 2

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #11 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #12 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto (1–2 pumpavimo judesiais) arba papumpuoti jo į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobakteri-cidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #13 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #14 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #15 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #16 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobakteri-cidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #17 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimo srities aprašymas: #Naudojimas #17.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) arba pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #17.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius ir t. t.), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #17.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #17.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #17.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #17.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #18 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #18.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #18.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #18.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #18.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: #Naudojimas #18.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) #Naudojimas #18.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #19 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas – bakterijos, mielės – įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #20 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #20.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #20.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #20.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #20.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #20.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #20.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

11 lentelė

Naudojimas #21 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (ypatingais atvejais, pvz., susirgus konjunktyvitu)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

12 lentelė

Naudojimas #22 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

13 lentelė

Naudojimas #23 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

14 lentelė

Naudojimas #24 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 22			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0002 1-2			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,5 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 3 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC3

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 3

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 3**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 3

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #25 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #26 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #27 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #28 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #29 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #30 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #31 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #31.1: (profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #31.2: (profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #31.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #31.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #31.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #31.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE

	Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #32 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #32.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #32.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #32.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #32.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso)

	Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #32.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #32.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #33 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #34 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #34.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #34.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #34.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #34.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #34.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #34.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 3

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			Schülke® 23		
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0034420-0003 1-3		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 4 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC4

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-4

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 4

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 4**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 4

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #35 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #36 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #37 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #38 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #39 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #40 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #41 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #41.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #41.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #41.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #41.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #41.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) #Naudojimas #41.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #42 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #42.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #42.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #42.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #42.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #42.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #42.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #43 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE

	Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #44 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #44.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #44.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #44.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #44.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #44.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #44.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

11 lentelė

Naudojimas #45 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus / ypatingais atvejais: susirgus konjunktyvitu)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

12 lentelė

Naudojimas #46 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

13 lentelė

Naudojimas #47 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas:
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

14 lentelė

Naudojimas #48 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus / ypatingais atvejais: susirgus konjunktyvitu).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 4

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m³, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 4

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 24			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0004 1-4			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 5 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 5 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC5

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-5

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 5

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 5**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 5**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 5

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją.

	P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #49 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #50 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE

	Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #51 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE

	Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #52 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinį ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #53 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #54 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE): 36 mėnesiai

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #55 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #55.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #55.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #55.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #55.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #55.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #55.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #56 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #56.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #56.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #56.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #56.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #56.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #56.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #57 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas – bakterijos, mielės, grybai – įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidas, mielicidas, grybuscidas: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #58 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas – bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #58.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #58.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #58.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #58.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #58.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #58.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (HDPE), kanistras (HDPE), statinė (HDPE), nepakuotų krovinių vidutinis konteineris (IBC) (HDPE su plieniniu rėmu): 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 5

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 5

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Händedesinfektion	
	Hand Disinfection	
	Désinfection Des Mains	
	Rankos Dezinfekuojamos	
	Disinfezione Delle Mani	
	Roku Dezinfekcija	
	Käte Desinfektsioon	
	Dezynfekcja Rąk	
	Dezinfectarea Mâinilor	
	дезинфекция на ръцете	
	Hånddesinfektion	
	Käsidesinfektio	
	αντισηψία των χεριών	
	Dezinfekciju Ruku	
	Rankų Dezinfekcija	
	Handdesinfektion	
	Dezinfekcia Rúk	

	Desinfección De Las Manos	
	Dezinfekce Rukou	
	Kézfertőtlenítés	
	PRISMAN Händedesinfektion	
	PRISMAN Hand Disinfection	
	PRISMAN Désinfection Des Mains	
	PRISMAN Rankos Dezinfekuojamos	
	PRISMAN Disinfezione Delle Mani	
	PRISMAN Roku Dezinfekcija	
	PRISMAN Käte Desinfektsioon	
	PRISMAN Dezynfekcja Rąk	
	PRISMAN Dezinfectarea Mâinilor	
	PRISMAN дезинфекция на ръцете	
	PRISMAN Hånddesinfektion	
	PRISMAN Käsidesinfektio	
	PRISMAN αντισηψία των χεριών	
	PRISMAN Dezinfekciju Ruku	
	PRISMAN Rankų Dezinfekcija	

	PRISMAN Handdesinfektion	
	PRISMAN Dezinfekcia Rúk	
	PRISMAN Desinfección De Las Manos	
	PRISMAN Dezinfekce Rukou	
	PRISMAN Kézfertőtlenítés	
	Innocid Händedesinfektion HD-i50	
	Innocid HD-i50 Hand Disinfection	
	Innocid HD-i50 Désinfection Des Mains	
	Innocid HD-i50 Rankos Dezinfekuojamos	
	Innocid HD-i50 Disinfezione Delle Mani	
	Innocid HD-i50 Roku Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Käte Desinfektsioon	
	Innocid HD-i50 Dezynfekcja Rąk	
	Innocid HD-i50 Dezinfectarea Mâinilor	
	Innocid HD-i50 дезинфекция на ръцете	
	Innocid HD-i50 Hånddesinfektion	
	Innocid HD-i50 Käsidesinfektio	

	Innocid HD-i50 αντισηψία των χεριών	
	Innocid HD-i50 Dezinfekciju Ruku	
	Innocid HD-i50 Rankų Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Handdesinfektion	
	Innocid HD-i50 Dezinfekcia Rúk	
	Innocid HD-i50 Desinfección De Las Manos	
	Innocid HD-i50 Dezinfekce Rukou	
	Innocid HD-i50 Kézfertőtlenítés	
	SunSept Händedesinfektion	
	SunSept Hand Disinfection	
	• SunSept Désinfection Des Mains	
	SunSept Rankos Dezinfekuojamos	
	SunSept Disinfezione Delle Mani	
	SunSept Roku Dezinfekcija	
	SunSept Käte Desinfektsioon	
	SunSept Dezynfekcja Rąk	
	SunSept Dezinfectarea Mâinilor	

	SunSept дезинфекция на ръцете	
	SunSept Händdesinfektion	
	SunSept Käsidesinfektio	
	SunSept αντισηψία των χεριών	
	SunSept Dezinfekciju Ruku	
	SunSept Rankų Dezinfekcija	
	SunSept Handdesinfektion	
	SunSept Dezinfekcia Rúk	
	SunSept Desinfección De Las Manos	
	SunSept Dezinfekce Rukou	
	SunSept Kézfertőtlenítés	
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0034420-0005 1-5	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 6 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 6 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC6

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-6

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 6

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 6**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 6**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 6

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. EUH208: Sudėtyje yra Izoeugenolis. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #59 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #60 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #61 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #61.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #61.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #61.1: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #61.2: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #61.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #61.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #62 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 6

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m³, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 6

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		HD1			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0006 1-6			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,14 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 7 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 7 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC7

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-7

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 7

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 7**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 7**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 7

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą.

	P501: turinys (talpykla) šalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus. P501: konteineris (talpykla) šalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #63 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys

	Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #64 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #65 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #65.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #65.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #65.1: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #65.2: prieš bakterijas, mieles, tuberkuliozės bakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #65.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #65.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

5–30 l kanistras, 220 l statinė, 1 000 l konteineris: Prireikus papildyti arba perkelti į kitas talpyklas / prietaisus.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

Visos medžiagos turi būti visiškai suderinamos su produktu. Ant pakartotinai pripildomo dozatoriaus arba talpyklos turi būti pateikta ši minimali ženklinimo informacija:

— Autorizacijos numeris;

— Biocidinio produkto prekinis pavadinimas;

— Kiekvienos veikliosios medžiagos tapatybė ir kiekis;

— Naudojimo instrukcijos, įskaitant laikotarpį, kurio reikia biocidiniam poveikiui pasireikšti;

— Informacija pagal CLP.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #66 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas – viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 125, 500 1 000 ml Pakuotė: HDPE Dangtelis: Dangtelis: PP arba pumpavimo įtaisas: sudėtinga sistema (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūdijantis plienas) Kanistras: 5, 10, 20, 30 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Statinė: 220 l Pakuotė: HDPE Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys IBC: 1 000 l Pakuotė: HDPE su plieniniu rėmu Dangtelis: HDPE, LDPE, PP arba šių medžiagų derinys Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), LDPE, PE-LD (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: 36 mėnesiai

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 7

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 7

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	HD2	
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0034420-0007 1-7	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,14 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 8 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 8 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC8

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-8

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 8

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 8**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 8**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 8

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #67 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas: Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #68 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #69 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 5 ml (saują) į delną (2–4 pumpavimo judesiais). Trinti rankas ir dilbius mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą (įpylimą, įtrynimą) dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #70 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #71 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #72 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #73 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #73.1: (profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #73.2: (profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #73.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #73.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Dažnumas: Naudojimas #73.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #73.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #73.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #73.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo 3 ml (saują) į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) (2–4 pumpavimo judesiais) produkto arba papumpuoti jo 5 ml (saują) į delną. Trinti rankas ir dilbius mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą (įpylimą, įtrynimą) dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #74 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #74.1: (Profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje, kosmetikos studijose, pagyvenusių žmonių priežiūroje ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #74.2: (Profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #74.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #74.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #74.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #74.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #75 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #76 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #76.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #76.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: ---
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #76.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #76.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #76.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #76.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 8

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m³, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 8

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 21			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0008 1-8			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,5 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 9 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 9 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC9

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-9

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 9

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 9**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 9**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 9

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #77 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės

	Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #78 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto (1–2 pumpavimo judesiais) arba papumpuoti jo į delną. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #79 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #80 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobakteri-cidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #81 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #82 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės

	Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #83 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #83.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) arba pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #83.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai medicinos srityse, pvz., ligoninėse (įskaitant intensyviosios terapijos skyrius, vaikų ligų skyrius ir t. t.), medicinos ar odontologijos praktikoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: #Naudojimas #83.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #83.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #83.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #83.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija: Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija: Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #84 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #84.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #84.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #84.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #84.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #84.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #84.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (2–4 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas ir dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

--

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #85 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #86 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #86.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #86.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #86.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #86.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #86.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #86.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais). Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį aktyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

11 lentelė

Naudojimas #87 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (ypatingais atvejais, pvz., susirgus konjunktyvitu)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

12 lentelė

Naudojimas #88 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

13 lentelė

Naudojimas #89 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

14 lentelė

Naudojimas #90 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 9

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m³, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 9

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Schülke® 22	
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0034420-0009 1-9	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Kita sudedamoji dalis	112-72-1	204-000-3	0,5 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 10 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 10 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC10

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-10

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 10

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 10**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 10**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 10

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją.

	P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #91 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #92 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #93 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #94 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #95 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #96 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu): Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #97 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės

	Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #97.1: (profesionalus, pramoninis): Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #97.2: (profesionalus): Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #97.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #97.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #97.1 pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #97.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE

	Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #98 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #98.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #98.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #98.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #98.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #98.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #98.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #99 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #100 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #100.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #100.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #100.1: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Naudojimas #100.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas, virusus su apvalkalu ir virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #100.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #100.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (įsk. aktyvumą prieš virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių.

Chirurginė rankų dezinfekcija (įskaitant aktyvumą prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas)): Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 10

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 10

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 23			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0010 1-10			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 11 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 11 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC11

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-11

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 11

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 11**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 11**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 11

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #101 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #102 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #103 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #104 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #105 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #106 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #107 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #107.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #107.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #107.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #107.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #107.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #107.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #108 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #108.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #108.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #108.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #108.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #108.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #108.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #109 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš bakterijas ir mieles: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #110 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, mikobakterijos, virusai su apvalkalu - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mikobakterijos Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #110.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #110.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #110.1: prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. prieš mikobakterijas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,9 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #110.2: prieš bakterijas, mieles, mikobakterijas ir virusus su apvalkalu: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 90 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #110.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #110.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą mikobaktericidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 45 sekundes. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.11. **Naudojimo būdo aprašymas**

11 lentelė

Naudojimas #111 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus / ypatingais atvejais: susirgus konjunktyvitu)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.11.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.11.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.11.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.11.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.11.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.12. **Naudojimo būdo aprašymas**

12 lentelė

Naudojimas #112 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.12.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.12.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.12.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.12.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

--

4.12.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.13. **Naudojimo būdo aprašymas**

13 lentelė

Naudojimas #113 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse, pvz., medicinos praktikoje (tik ypatingais atvejais, pvz., konjunktyvito atveju)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.13.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.13.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.13.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.13.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.13.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.14. **Naudojimo būdo aprašymas**

14 lentelė

Naudojimas #114 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus / ypatingais atvejais: susirgus konjunktyvitu)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: prieš virusus (riboto spektro virucidinis aktyvumas): 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 3,16 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 120 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.14.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 60 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.14.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Vengti dezinfekavimo, kai yra vaikų, jaunesnių nei 6 metų amžiaus.

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.14.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.14.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.14.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 11

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m^3, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 11

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 24			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0011 1-11			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	75 % (masės dalis)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 12 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 12 identifikatorius**

Identifikatorius	meta SPC12

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-12

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT01: Asmens higiena

2. META SPC SUDĖTIS 12

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 12**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 12**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 12

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103: Atidžiai skaityti ir vykdyti visas instrukcijas. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P261: Stengtis neįkvėpti aerozolio. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P312: Pasijutus blogai, skambinti į gydytoją. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P405: Laikyti užrakintą. P501: turinį pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti. P501: talpyklą pašalinti pagal vietos ir nacionalinius reikalavimus šalinti.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #115 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu:

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #116 Higieninė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #117 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Naudojimas #118 Higieninė rankų dezinfekcija - pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Efektyvumas prieš bakterijas, mieles ir virusus su apvalkalu: Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Naudojimas #119 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai buityje / sveikatos priežiūroje buityje (pvz., susirgus)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Užtikrinti tinkamą vėdinimą produkto naudojimo metu ir po jo, atidarant langus arba įjungiant mechaninį vėdinimą vonios / virtuvės patalpose.

Nenaudoti šalia augintinių

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

Naudoti gali tik suaugusieji.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Naudojimas #120 Higieninė rankų dezinfekcija - neprofesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 3 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Produktą leidžiama naudoti tik suaugusiesiems.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Išsausėjus odai, naudoti tinkamą odos priežiūros losjoną.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Naudojimas #121 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #121.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #121.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #121.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #121.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #121.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #121.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys.

	maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.8. **Naudojimo būdo aprašymas**

8 lentelė

Naudojimas #122 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus, pramoninis naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #122.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose) ir pramonės srityse, pvz., farmacijos ar maisto gamybos pramonėje. Naudojimas #122.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #122.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #122.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #122.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #122.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)

Naudotojų kategorija (-os)	pramoninis profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.8.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.8.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.8.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.8.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.9. **Naudojimo būdo aprašymas**

9 lentelė

Naudojimas #123 Chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Baktericidas, mielicidas, grybuscidas: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.9.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.9.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.9.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.9.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

4.10. **Naudojimo būdo aprašymas**

10 lentelė

Naudojimas #124 Higieninė / chirurginė rankų dezinfekcija - profesionalus naudotojas - bakterijos, mielės, grybai, tuberkuliozės bakterijos, virusai su apvalkalu, virusai (riboto spektro virucidinis aktyvumas) - įpylimas arba pumpavimas - viduje

Produkto tipas	PT01: Asmens higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Nesvarbu
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Grybus Bendras pavadinimas: Grybus Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Bendras pavadinimas: Tuberkuliozės bakterijos Vystymosi stadija: vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Virusai su apvalkalu Bendras pavadinimas: Virusai su apvalkalu Vystymosi stadija: netaikoma. Mokslinis pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Bendras pavadinimas: Virusai (riboto spektro virusinis aktyvumas) Vystymosi stadija: netaikoma.

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Naudojimas #124.1: Paruoštas naudoti produktas, skirtas higieninei rankų dezinfekcijai su sveikatos priežiūra susijusiose srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje, pagyvenusių žmonių priežiūroje, kosmetikos studijose). Naudojimas #124.2: Paruoštas naudoti produktas, skirtas chirurginei rankų dezinfekcijai sveikatos priežiūros srityse (pvz., ligoninėse, intensyviosios terapijos skyriuose, vaikų ligų skyriuose, medicinos praktikoje)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Įpylimas arba pumpavimas (dozatoriaus specifikacija: lašelinė pompa / išėjimas: lašai) Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimas #124.1: Baktericidinis, mielicidinis, virucidinis aktyvumas prieš virusus su apvalkalu: 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 30 sek. Riboto spektro virucidinis aktyvumas, grybuscidinis ir tuberkuliocidinis efektyvumas: 2 × 3 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 1,65 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 60 sek. (iš viso) Naudojimas #124.2: 2 × 5 ml vienai dezinfekcijai, kas atitinka 2 × 2,76 g veikliosios medžiagos Sąlyčio laikas: 180 sek. (iš viso) Taikymo skaičiaus ir laikas: Dažnumas: Naudojimas #124.1: pagal poreikį (paprastai 25 kartus per dieną) Naudojimas #124.2: pagal poreikį (paprastai 4 kartus per dieną)
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Butelis: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. maišelis / paketėlis: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Pakuotė: PET/ALU/PE, PET/PE arba PET-SiO/PE Dangtelis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE arba šių medžiagų derinys ; Pumpavimo įtaisas: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūdijantis plienas, silikonas, silikagelis, NBR, TPE, stiklas arba šių medžiagų derinys. Santrumpos: HDPE (didelio tankio polietilenas), PP (polipropilenas), PC (polikarbonatas), PE (polietilenas), LDPE (mažo tankio polietilenas), EVA (etileno vinilacetatas), POM (polioksimetilenas), PBT (polibutileno tereftalatas), PET (polietileno tereftalatas), NBR (nitrilbutadieno kaučiukas), TPE (termoplastinis elastomeras), ALU (aliuminis).

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Produktas paruoštas naudoti. Produktą tepti tik ant nepažeisto žmogaus odos paviršiaus. Prieš naudojant produktą, nusiplauti ir nusausinti rankas.

Higieninė rankų dezinfekcija (efektyvumas prieš bakterijas, mieles, virusus su apvalkalu):

Į delną įsipilti 3 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo į delną (1–2 pumpavimo judesiais) ir įtrinti plaštakas. Įtrinti mažiausiai 30 sekundžių. Norint užtikrinti papildomą riboto spektro virucidinį aktyvumą, grybuscidinį ir tuberkulicidinį efektyvumą, pakartoti šį veiksmą dar kartą.

Chirurginė rankų dezinfekcija:

Į delną įsipilti 5 ml (saują) produkto arba papumpuoti jo (2–4 pumpavimo judesiais) į delną ir įtrinti plaštakas bei dilbius. Įtrinti mažiausiai 90 sekundžių. Pakartoti šį veiksmą dar kartą. Įsitikinti, kad plaštakos ir dilbiai visą tepimo laiką būtų drėgni.

Chirurginei rankų dezinfekcijai skirtą biocidinį produktą galima dekantuoti / pakartotiniai pripildyti tik aseptinėmis sąlygomis.

4.10.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

4.10.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

4.10.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.10.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos.

Laikyti kambario temperatūroje, originalioje talpykloje.

Laikymo terminas:

Butelis (PE) ir maišelis / paketėlis (PE): 6 dienos

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 12

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Naudojimo metodas:

1 žingsnis: Užtepti dezinfekanto ir įtrinti į delną. Trinti delnais, kad dezinfekantas pasiskirstytų po visas rankas ir pirštus.

2 žingsnis: Patrinti kairės plaštakos viršutinę pusę dešinės plaštakos delnu. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

3 žingsnis: Išskėsti pirštus ir patrinti tarpupirščius. Sukeisti plaštakas ir pakartoti veiksmus.

4 žingsnis: Trinti delnais sunėrus pirštus (5 kartus)

5 žingsnis: Sukamaisiais judesiais trinti abiejų plaštakų nykščius.

6 žingsnis: Pirštų galiukus sukamaisiais judesiais trinti į priešingą delną. Trinti riešą abejomis rankomis. Leisti rankoms visiškai išdžiūti.

Nenaudoti produkto kartu su kitais produktais.

Prieš naudojant, visada perskaityti etiketę ar naudojimo instrukciją ir laikytis visų nurodymų.

Laikyti vaikams ir netiksliniams / naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Vengti sąlyčio su akimis.

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš įeinant į patalpą ar teritoriją, kurioje ilgesnį laiką bus žmonių, užtikrinti, kad užteptas produktas visiškai išdžiūvo.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtino tiesioginio ar netiesioginio poveikio aprašas:

Nėra.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

Bendroji informacija

Nuvesti asmenis į saugią vietą. Laikytis savisaugos reikalavimų, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Nedelsiant nusivilti užterštus drabužius ir avalynę. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

PATEKUS ANT ODOS: Jei dirgina, nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Netyčia patekus ant odos: nuplauti vandeniu.

PATEKUS Į AKIS: Išskalauti vandeniu. Išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie dėvimi ir tai lengva padaryti. Toliau skalauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

PRARIJUS: Išskalauti burną.

Pasireiškus simptomams: Skambinti 112 / greitajai dėl medicininės pagalbos.

Nepasireiškus simptomams: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui: Jei reikia, pradėti taikyti gyvybės palaikymo priemones.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis)

Simptomai gali būti dilgčiojimas, ašarojimas, paraudimas, patinimas ir neryškus regėjimas. Garai turi narkotinį poveikį ir gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, svaigulį ir pykinimą. Kosėjimas. Atsiradus dusuliui skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Neatidėliotinos aplinkos apsaugos priemonės:

Vengti koncentratų išsiliejimo į dirvožemį, paviršinį ar požeminį vandenį, pvz., naudojant surinkimo talpyklas.

Surinkti išbėgusį produktą tinkama medžiaga (pvz., žeme, smėliu, diatomitu, vermikulitu, universaliomis rišamosiomis medžiagomis).

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Jei buvo užterštas dirvožemis arba vandens telkiniai, apie tai praneškite kompetentingoms institucijoms.

Saugotis sprogimo pavojaus.

Garai yra sunkesni už orą, todėl sklinda palei žemę ir kaupiasi žemose arba uždarose vietose (kanalizacijose, rūsiuose, rezervuaruose).

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

Imtis atsargumo priemonių nuo statinės iškrovos.

Užtikrinti elektrinį tolydumą sujungiant ir įžeminant visą įrangą.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Išmesti turinį / talpyklą į specialų atliekų surinkimo punktą pagal vietos, nacionalinius / tarptautinius reikalavimus.

Produkto likučius reikia surinkti ir pašalinti pagal nacionalinius atliekų šalinimo įstatymus ir bet kokius regioninės / vietos valdžios institucijų reikalavimus.

Venkite (tiesioginio) (neskiesto produkto) išleidimo į aplinką ir (arba) nuotekų surinkimo sistemą.

Neišpilti į kanalizacijas.

Išsiliejusį produktą atskieskite vandeniu ir išvalykite šluoste.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

---

6. KITA INFORMACIJA

Rekomendacija profesionaliam naudojimui:

P280 Dėvėti akių apsaugos priemones.

Atkreipti dėmesį į veikliosios medžiagos propan-2-olio (CAS Nr.: 67-63-0) Europos pamatinę vertę 129,2 mg/m³, kuri buvo naudojama atliekant biocidinių produktų grupės rizikos vertinimą.

Dėl pastabos „Naudotojų kategorija (-os)“: Profesionalai (įskaitant pramoninius naudotojus) – tai apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

7. TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 12

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas		Schülke® 25			
Autorizacijos liudijimo numeris		EU-0034420-0012 1-12			
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	63,1 % (masės dalis)