Jornal Oficial
da União Europeia

PT
Série L

2026/1410

17.7.2026

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2026/1410 DA COMISSÃO

de 26 de junho de 2026

que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «Prisman Händedesinfektion» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 44.º, n.º 5, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) Em 27 de junho de 2016, a empresa Schuelke & Mayr GmbH apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 e com o artigo 4.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 414/2013 da Comissão ([2]), um pedido de autorização da União para a família de produtos biocidas idênticos, tal como referido no artigo 1.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 414/2013, denominada «Prisman Händedesinfektion», do tipo de produtos 1, tal como descrito no anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012. O pedido foi registado com o número de processo BC-QG025240-55 no Registo de Produtos Biocidas. O pedido referia-se à família de produtos biocidas «desmanol pure», autorizada pelo Regulamento de Execução (UE) 2025/1905 da Comissão ([3]), com o número de autorização EU-0033833-0000.

(2) A família de produtos biocidas «Prisman Händedesinfektion» contém propan-2-ol como substância ativa, o qual está incluído na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 para o tipo de produtos 1.

(3) Em 24 de fevereiro de 2025, a Agência apresentou à Comissão um parecer ([4]) e o projeto de resumo das características do produto («RCP») da «Prisman Händedesinfektion», em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 414/2013.

(4) No parecer, a Agência conclui que as diferenças propostas entre a família de produtos biocidas «Prisman Händedesinfektion» e a família de produtos biocidas de referência afim «desmanol pure» se limitam às informações que podem ser objeto de alterações administrativas em conformidade com o Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão ([5]) e que, com base na avaliação da família de produtos biocidas de referência afim «desmanol pure» e sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, a família de produtos biocidas idênticos «Prisman Händedesinfektion» satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 6, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamento de Execução (UE) n.º 414/2013 da Comissão, de 6 de maio de 2013, que especifica um procedimento de autorização de produtos biocidas idênticos em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 125 de 7.5.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Regulamento de Execução (UE) 2025/1905 da Comissão, de 11 de setembro de 2025, que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas desmanol pure em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L, 2025/1905, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) Parecer da Agência Europeia dos Produtos Químicos, de 24 de fevereiro de 2025, sobre a autorização da União para a família de produtos biocidas idênticos «Prisman Händedesinfektion», UBP-C-1804198-07-00/F, https://echa.europa.eu/pt/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão, de 18 de abril de 2013, relativo a alterações a produtos biocidas autorizados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Em 13 de novembro de 2025, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RPC da família de produtos biocidas «Prisman Händedesinfektion» revisto, em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento de Execução (UE) n.º 528/2012.

(6) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União à família de produtos biocidas idênticos «Prisman Händedesinfektion».

(7) A data de caducidade da autorização deve ser alinhada com a data de caducidade da autorização da família de produtos biocidas de referência afim «desmanol pure».

(8) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União, com o número de autorização EU-0034420-0000, à empresa Schuelke & Mayr GmbH para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas idênticos «Prisman Händedesinfektion», em conformidade com o resumo das características do produto que consta do anexo.

A autorização da União é válida de 6 de agosto de 2026 a 30 de setembro de 2035.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de junho de 2026.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

Prisman Händedesinfektion

Tipo(s) de produto

PT01: Higiene humana

Número de autorização EU-0034420-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0034420-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	Prisman Händedesinfektion

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Schuelke & Mayr GmbH
	Endereço	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Número de autorização		EU-0034420-0000
Número da decisão de autorização R4BP		EU-0034420-0000
Data da autorização		6 de agosto2026
Data de caducidade da autorização		30 de setembro 2035

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Prisman Chemie GmbH
Endereço do fabricante	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemanha

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Endereço do fabricante	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Alemanha
Localização das instalações de fabrico	INEOS Solvents Germany GmbH Römerstraße 733 47443 Moers Alemanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	meta SPC1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 1 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 2 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 3 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma (2-4 jatos da bomba). Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir o passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 4 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias

	Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 5 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 6 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 7 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 7.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 7.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 7.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 7.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 7.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 7.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) (2-4 jatos da bomba) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma. Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 8 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 8.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde como hospitais (incluindo UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), consultórios médicos ou odontológicos, gabinetes de cosmética, cuidados de idosos e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 8.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 8.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 8.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 8.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 8.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 9 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais;

	Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 10 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 10.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 10,2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 10.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 10.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 10.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 10.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 21			
Número de autorização		EU-0034420-0001 1-1			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	meta SPC2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 11 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 12 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma (1-2 jatos da bomba) ou bombear na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 13 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 14 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 15 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 16 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 17 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Descrição do campo de utilização: #Utilização n.º 17.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) ou em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar #Utilização n.º 17.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, etc.), consultórios médicos ou odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: #Utilização n.º 17.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) #Utilização n.º 17.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 17.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 17.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 18 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 18.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 18.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 18.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 18.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 18.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 18.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 19 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 20 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 20.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 20.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 20.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 20.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 20.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 20.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11

Utilização n.º 21 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (em casos especiais: por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12

Utilização n.º 22 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13

Utilização n.º 23 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14

Utilização n.º 24 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 22			
Número de autorização		EU-0034420-0002 1-2			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	meta SPC3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 25 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 26 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 27 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 28 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 29 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 30 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 31 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 31.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 31.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 31.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 31.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 31.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 31.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 32 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 32.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 32.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 32.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 32.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total)

	Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 32.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 32.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 33 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 34 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 34.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética). Utilização n.º 34.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 34.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 34.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 34.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 34.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			Schülke® 23		
Número de autorização			EU-0034420-0003 1-3		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	meta SPC4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.

Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 35 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 36 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 37 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 38 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 39 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 40 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 41 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 41.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 41.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 41.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 41.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 41.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 41.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 42 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 42.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 42.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 42.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 42.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 42.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 42.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 43 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 44 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 44.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 44,2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 44.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 44.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 44.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 44.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11

Utilização n.º 45 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12

Utilização n.º 46 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13

Utilização n.º 47 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14

Utilização n.º 48 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não esvaziar para os esgotosNão vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 24			
Número de autorização		EU-0034420-0004 1-4			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 5 identificador**

Identificador	meta SPC5

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-5

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico

	P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 49 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 50 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 51 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 52 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 53 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 54 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 55 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 55.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 55.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 55.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 55.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 55.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 55.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 56 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 56.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 56,2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 56.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 56.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 56.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 56.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 57 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras, fungos – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Bactericida, leveduricida, fungoscida: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 58 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 58.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 58.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 58.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 58.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 58.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 58.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Händedesinfektion	
	Hand Disinfection	
	Désinfection Des Mains	
	Rankos Dezinfekuojamos	
	Disinfezione Delle Mani	
	Roku Dezinfekcija	
	Käte Desinfektsioon	
	Dezynfekcja Rąk	
	Dezinfectarea Mâinilor	
	дезинфекция на ръцете	
	Hånddesinfektion	
	Käsidesinfektio	
	αντισηψία των χεριών	
	Dezinfekciju Ruku	
	Rankų Dezinfekcija	
	Handdesinfektion	
	Dezinfekcia Rúk	

	Desinfección De Las Manos	
	Dezinfekce Rukou	
	Kézfertőtlenítés	
	PRISMAN Händedesinfektion	
	PRISMAN Hand Disinfection	
	PRISMAN Désinfection Des Mains	
	PRISMAN Rankos Dezinfekuojamos	
	PRISMAN Disinfezione Delle Mani	
	PRISMAN Roku Dezinfekcija	
	PRISMAN Käte Desinfektsioon	
	PRISMAN Dezynfekcja Rąk	
	PRISMAN Dezinfectarea Mâinilor	
	PRISMAN дезинфекция на ръцете	
	PRISMAN Hånddesinfektion	
	PRISMAN Käsidesinfektio	
	PRISMAN αντισηψία των χεριών	
	PRISMAN Dezinfekciju Ruku	
	PRISMAN Rankų Dezinfekcija	

	PRISMAN Handdesinfektion	
	PRISMAN Dezinfekcia Rúk	
	PRISMAN Desinfección De Las Manos	
	PRISMAN Dezinfekce Rukou	
	PRISMAN Kézfertőtlenítés	
	Innocid Händedesinfektion HD-i50	
	Innocid HD-i50 Hand Disinfection	
	Innocid HD-i50 Désinfection Des Mains	
	Innocid HD-i50 Rankos Dezinfekuojamos	
	Innocid HD-i50 Disinfezione Delle Mani	
	Innocid HD-i50 Roku Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Käte Desinfektsioon	
	Innocid HD-i50 Dezynfekcja Rąk	
	Innocid HD-i50 Dezinfectarea Mâinilor	
	Innocid HD-i50 дезинфекция на ръцете	
	Innocid HD-i50 Hånddesinfektion	
	Innocid HD-i50 Käsidesinfektio	

	Innocid HD-i50 αντισηψία των χεριών	
	Innocid HD-i50 Dezinfekciju Ruku	
	Innocid HD-i50 Rankų Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Handdesinfektion	
	Innocid HD-i50 Dezinfekcia Rúk	
	Innocid HD-i50 Desinfección De Las Manos	
	Innocid HD-i50 Dezinfekce Rukou	
	Innocid HD-i50 Kézfertőtlenítés	
	SunSept Händedesinfektion	
	SunSept Hand Disinfection	
	• SunSept Désinfection Des Mains	
	SunSept Rankos Dezinfekuojamos	
	SunSept Disinfezione Delle Mani	
	SunSept Roku Dezinfekcija	
	SunSept Käte Desinfektsioon	
	SunSept Dezynfekcja Rąk	
	SunSept Dezinfectarea Mâinilor	

	SunSept дезинфекция на ръцете	
	SunSept Händdesinfektion	
	SunSept Käsidesinfektio	
	SunSept αντισηψία των χεριών	
	SunSept Dezinfekciju Ruku	
	SunSept Rankų Dezinfekcija	
	SunSept Handdesinfektion	
	SunSept Dezinfekcia Rúk	
	SunSept Desinfección De Las Manos	
	SunSept Dezinfekce Rukou	
	SunSept Kézfertőtlenítés	
Número de autorização	EU-0034420-0005 1-5	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 6 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 6 identificador**

Identificador	meta SPC6

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-6

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 6

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 6**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 6**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 6

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida. EUH208: Contém Isoeugenol. Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 59 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 60 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa . Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 61 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 61.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 61.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 61.1: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 61.2: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 61.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 61.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo "clack": PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Preparação pré-cirúrgica das mãos: Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 62 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia)) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 6

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 6

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		HD1			
Número de autorização		EU-0034420-0006 1-6			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 7 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 7 identificador**

Identificador	meta SPC7

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-7

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 7

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 7**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 7**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 7

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave.

	P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 63 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 64 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 65 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 65.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 65.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 65.1: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 65.2: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 65.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 65.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Preparação pré-cirúrgica das mãos: Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

— O número de autorização;

— O nome comercial do produto biocida;

— A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

— As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

— As informações de acordo com o CRE.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 66 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear – interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo "clack": PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 7

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 7

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		HD2			
Número de autorização		EU-0034420-0007 1-7			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 8 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 8 identificador**

Identificador	meta SPC8

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-8

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 8

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 8**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan--1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 8**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 8

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.

Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 67 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 68 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 69 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma (2-4 jatos da bomba). Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir o passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 70 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 71 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 72 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 73 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 73.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 73.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 73.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 73.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Frequência: Utilização n.º 73.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 73.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 73.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 73.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha em forma de concha) (2-4 jatos da bomba) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma. Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 74 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 74.1: (Profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde como hospitais (incluindo UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), consultórios médicos ou odontológicos, gabinetes de cosmética, cuidados de idosos e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 74.2: (Profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 74.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 74.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 74.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 74.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 75 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 76 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 76,1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 76.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 76.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 76.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 76.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 76.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 8

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 8

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 21			
Número de autorização		EU-0034420-0008 1-8			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan--1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 9 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 9 identificador**

Identificador	meta SPC9

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-9

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 9

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 9**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 9**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 9

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 77 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 78 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) no produto na palma (1-2 jatos da bomba) ou bombear na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 79 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 80 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 81 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 82 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 83 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores #Utilização n.º 83.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) ou em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar #Utilização n.º 83.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, etc.), consultórios médicos ou odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: #Utilização n.º 83.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) #Utilização n.º 83.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 83.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 83.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 84 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 84,.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 84,.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 84.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 84.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 84.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 84.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

--

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 85 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 86 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 86.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 86,2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 86.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 86.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 86.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 86.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11

Utilização n.º 87 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (em casos especiais: por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12

Utilização n.º 88 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13

Utilização n.º 89 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14

Utilização n.º 90 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 9

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 9

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 22			
Número de autorização		EU-0034420-0009 1-9			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan--1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 10 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 10 identificador**

Identificador	meta SPC10

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-10

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 10

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 10**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 10**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 10

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico

	P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 91 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Vertererter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 92 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 93 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 94 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 95 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 96 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 97 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 97.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 97.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 97.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 97.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 97.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 97.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE

	Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 98 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 98.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 98.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 98.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 98.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 98.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 98.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 99 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 100 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 100.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética). Utilização n.º 100.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 100.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 100.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 100.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 100.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 10

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 10

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 23			
Número de autorização		EU-0034420-0010 1-10			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 11 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 11 identificador**

Identificador	meta SPC11

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-11

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 11

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 11**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 11**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 11

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 101 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 102 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 103 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 104 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 105 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 106 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 107 Higienizador para mãos/preparação pré-preparação cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 107.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar U tilização n.º 107.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 107.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 107.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 107.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 107.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 108 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 108.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 108.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 108.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 108.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 108.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 108.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 109 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 110 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: Micobactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 110.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 110.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 110.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 110.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 110.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 110.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11

Utilização n.º 111 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12

Utilização n.º 112 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

--

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13

Utilização n.º 113 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14

Utilização n.º 114 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 11

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 11

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 24			
Número de autorização		EU-0034420-0011 1-11			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 12 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 12 identificador**

Identificador	meta SPC12

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-12

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 12

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 12**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 12**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 12

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 115 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Utilização n.º 116 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3

Utilização n.º 117 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4

Utilização n.º 118 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5

Utilização n.º 119 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6

Utilização n.º 120 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7

Utilização n.º 121 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 121.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 121.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 121,1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 121.2: : 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 121.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 121.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8

Utilização n.º 122 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 122.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 122.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 122.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 122.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 122.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 122.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9

Utilização n.º 123 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Bactericida, leveduricida, fungoscida: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10

Utilização n.º 124 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: Fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Bactérias da tuberculose Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 124.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 124.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 124.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 124.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 124.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 124.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 12

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 12

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Schülke® 25			
Número de autorização		EU-0034420-0012 1-12			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)