РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/54 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2016 година

за разрешаване на употребата на 2-метилпропан-1-ол, изопентанол, 3,7-диметилоктан-1-ол, 2-етил-хексан-1-ол, 2-метилпропанал, 3-метилбутанал, 2-метилбутиралдехид, 3-метилмаслена киселина, 2-метилвалерианова киселина, 2-етилмаслена киселина, 2-метилмаслена киселина, 2-метилхептанова киселина, 4-метилнонанова киселина, 4-метилоктанова киселина, изобутилацетат, изобутилбутират, 3-метилбутилхексаноат, 3-метилбутилдодеканоат, 3-метилбутилоктаноат, 3-метилбутилпропионат, 3-метилбутилформат, глицерилтрибутират, изобутилизобутират, изопентилизобутират, изобутилизовалерат, изопентил-2-метилбутират, 2-метилбутилизовалерат и 2-метилбутилбутират като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ([2]).

(2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на 2-метилпропан-1-ол, изопентанол, 3,7-диметилоктан-1-ол, 2-етил-хексан-1-ол, 2-метилпропанал, 3-метилбутанал, 2-метилбутиралдехид, 3-метилмаслена киселина, 2-метилвалерианова киселина, 2-етилмаслена киселина, 2-метилмаслена киселина, 2-метилхептанова киселина, 4-метилнонанова киселина, 4-метилоктанова киселина, изобутилацетат, изобутилбутират, 3-метилбутилхексаноат, 3-метилбутилдодеканоат, 3-метилбутилоктаноат, 3-метилбутилпропионат, 3-метилбутилформат, глицерилтрибутират, изобутилизобутират, изопентилизобутират, изобутилизовалерат, изопентил-2-метилбутират, 2-метилбутилизовалерат и 2-метилбутилбутират, наричани по-долу „разглежданите вещества“, като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие посочените продукти бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на разглежданите вещества като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителят подаде искане добавките да се класифицират в категорията „сензорни добавки“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4) В становището си от 17 октомври 2012 г. ([3]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи разглежданите вещества не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Освен това Органът заключи, че посочените вещества са ароматизиращи вещества, чиято употреба се разрешава в храни, за които ефикасността е доказана, тъй като функциите на добавката за употреба като фураж са сходни с описаните функции за употреба като храна.

(5) Съгласно заключението на Органа няма да възникнат опасения във връзка с безопасността на потребителите, ако се вземат съответните предпазни мерки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
([2]) Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).
([3]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(10):2927.

(6) При оценката на разглежданите вещества беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Следва да се определи максимално препоръчително съдържание за посочените вещества. Посочените вещества може да бъдат използвани в комбинирани фуражи, които впоследствие се приемат с водата.

(7) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които спадат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 6 август 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 февруари 2017 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 6 февруари 2018 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 февруари 2017 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 6 февруари 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 6 февруари 2017 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Категория: сензорни добавки Функционална група: ароматизиращи вещества									
2b02001	—	2-метилпропан-1-ол	*Състав на добавката* 2-метилпропан-1-ол *Характеристика на активното вещество* 2-метилпропан-1-ол Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_4H_{10}O$ CAS №: 78-83-1 FLAVIS 02.001 *Метод за анализ* [1] За определянето на 2-метилпропан-1-ол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b02003	—	Изопентанол	*Състав на добавката* Изопентанол *Характеристика на активното вещество* Изопентанол Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_5H_{12}O$ CAS №: 123-51-3 FLAVIS 02.003 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изопентанол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b02026	—	3,7-диметилоктан-1-ол	*Състав на добавката* 3,7-диметилоктан-1-ол *Характеристика на активното вещество* 3,7-диметилоктан-1-ол Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 90 % Химична формула: $C_{10}H_{22}O$ CAS №: 106-21-8 FLAVIS 02.026 *Метод за анализ* ([1]) За идентификацията на 3,7-диметилоктан-1-ол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е: 1 mg/kg за свинете и домашните птици, а за всички други видове и категории: 1,5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b02082	—	2-етил-хексан-1-ол	*Състав на добавката* 2-етил-хексан-1-ол *Характеристика на активното вещество* 2-етил-хексан-1-ол Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 97 % Химична формула: $C_8H_{18}O$ CAS №: 104-76-7 FLAVIS 02.082 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 2-етил-хексан-1-ол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b05004	—	2-метилпропанал	*Състав на добавката* 2-метилпропанал *Характеристика на активното вещество* 2-метилпропанал Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: C_4H_8O CAS №: 78-84-2 FLAVIS 05.004 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 2-метилпропанал във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b05006	—	3-метилбутаналь	*Състав на добавката* 3-метилбутанал *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутанал Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 95 % Химична формула: $C_5H_{10}O$ CAS №: 590-86-3 FLAVIS 05.006 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 3-метилбутанал във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b05049	—	2-метилбутиралдехид	*Състав на добавката* 2-метилбутиралдехид *Характеристика на активното вещество* 2-метилбутиралдехид Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 97 % Химична формула: $C_5H_{10}O$ CAS №: 96-17-3 FLAVIS 05.049 *Метод за анализ* (1) За определянето на 2-метилбутиралдехид във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи. газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08008	—	3-метилмаслена киселина	*Състав на добавката* 3-метилмаслена киселина *Характеристика на активното вещество* 3-метилмаслена киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 99 % Химична формула: $C_5H_{10}O_2$ CAS №: 503-74-2 FLAVIS 08.008 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 3-метилмаслена киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08031	—	2-метилвалерианова киселина	*Състав на добавката* 2-метилвалерианова киселина *Характеристика на активното вещество* 2-метилвалерианова киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_6H_{12}O_2$ CAS №: 97-61-0 FLAVIS 08.031 *Метод за анализ* [1] За определянето на 2-метилвалерианова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08045	—	2-етилмаслена киселина	*Състав на добавката* 2-етилмаслена киселина *Характеристика на активното вещество* 2-етилмаслена киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_6H_{12}O_2$ CAS №: 88-09-5 FLAVIS 08.045 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 2-етилмаслена киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08046	—	2-метилмаслена киселина	*Състав на добавката* 2-метилмаслена киселина *Характеристика на активното вещество* 2-метилмаслена киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_5H_{10}O_2$ CAS №: 116-53-0 FLAVIS 08.046 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 2-метилмаслена киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08047	—	2-метилхептанова киселина	*Състав на добавката* 2-метилхептанова киселина *Характеристика на активното вещество* 2-метилхептанова киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 97 % Химична формула: $C_8H_{16}O_2$ CAS № 1188-02-9 FLAVIS 08.047 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 2-метилхептанова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08062	—	4-метилнонанова киселина	*Състав на добавката* 4-метилнонанова киселина *Характеристика на активното вещество* 4-метилнонанова киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS №: 45019-28-1 FLAVIS 08.062 *Метод за анализ* [1] За идентификацията на 4-метилнонанова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е: 1 mg/kg за свинете и домашните птици, а за всички други видове и категории: 1,5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b08063	—	4-метилоктанова киселина	*Състав на добавката* 4-метилоктанова киселина *Характеристика на активното вещество* 4-метилоктанова киселина Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 97 % Химична формула: $C_9H_{18}O_2$ CAS №: 54947-74-9 FLAVIS 08.063 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 4-метилоктанова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09005	—	Изобутилацетат	*Състав на добавката* Изобутилацетат *Характеристика на активното вещество* Изобутилацетат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 95 % Химична формула: $C_6H_{12}O_2$ CAS №: 110-19-0 FLAVIS 09.005 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изобутилацетат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09043	—	Изобутилбутират	*Състав на добавката* Изобутилбутират *Характеристика на активното вещество* Изобутилбутират Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_8H_{16}O_2$ CAS №: 539-90-2 FLAVIS 09.043 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изобутилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09070	—	3-метилбутилхексаноат	*Състав на добавката* 3-метилбутилхексаноат *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутилхексаноат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_{11}H_{22}O_2$ CAS №: 2198-61-0 FLAVIS 09.070 *Метод за анализ* [1] За идентификацията на 3-метилбутилхексаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е: 1 mg/kg за свинете и домашните птици, а за всички други видове и категории: 1,5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09103	—	3-метилбутилдодеканоат	*Състав на добавката* 3-метилбутилдодеканоат *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутилдодеканоат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 97 % Химична формула: $C_{17}H_{34}O_2$ CAS №: 6309-51-9 FLAVIS 09.103 *Метод за анализ* [1] За идентификация на 3-метилбутилдодеканоат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е: 1 mg/kg за свинете и домашните птици, а за всички други видове и категории: 1,5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09120	—	3-метилбутилоктаноат	*Състав на добавката* 3-метилбутилоктаноат *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутилоктаноат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_{13}H_{26}O_2$ CAS №: 2035-99-6 FLAVIS 09.120 *Метод за анализ* [1] За идентификацията на 3-метилбутилоктаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е: 1 mg/kg за свинете и домашните птици, а за всички други видове и категории: 1,5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09136	—	3-метилбутилпропионат	*Състав на добавката* 3-метилбутилпропионат *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутилпропионат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_8H_{16}O_2$ CAS №: 105-68-0 FLAVIS 09.136 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 3-метилбутилпропионат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09162	—	3-метилбутилформат	*Състав на добавката* 3-метилбутилформат *Характеристика на активното вещество* 3-метилбутилформат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 92 % Химична формула: $C_6H_{12}O_2$ CAS №: 110-45-2 FLAVIS 09.162 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на 3-метилбутилформат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09211	—	Глицерилтрибутират	*Състав на добавката* Глицерилтрибутират *Характеристика на активното вещество* Глицерилтрибутират Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 99 % Химична формула: $C_{15}H_{26}O_6$ CAS №: 60-01-5 FLAVIS 09.211 *Метод за анализ* (1) За определянето на глицерилтрибутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09417	—	Изобутилизобутират	*Състав на добавката* Изобутилизобутират *Характеристика на активното вещество* Изобутилизобутират Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_8H_{16}O_2$ CAS №: 97-85-8 FLAVIS 09.417 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изобутилизобутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09419	—	Изопентилизобутират	*Състав на добавката* Изопентилизобутират *Характеристика на активното вещество* Изопентилизобутират Полученочрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_9H_{18}O_2$ CAS № 2050-01-3 FLAVIS 09.419 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изопентилизобутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09472	—	Изобутилизовалерат	*Състав на добавката* Изобутилизовалерат *Характеристика на активното вещество* Изобутилизовалерат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_9H_{18}O_2$ CAS №: 589-59-3 FLAVIS 09.472 *Метод за анализ* ([1]) За определянето на изобутилизовалерат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09530	—	Изопентил-2-метилбутират	*Състав на добавката* Изопентил-2-метилбутират *Характеристика на активното вещество* Изопентил-2-метилбутират Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 95 % Химична формула: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS №: 27625-35-0 FLAVIS 09.530 *Метод за анализ* [1] За определянето на изопентил-2-метилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09531	—	2-метилбутилизовалерат	*Състав на добавката* 2-метилбутилизовалерат *Характеристика на активното вещество* 2-метилбутилизовалерат Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 98 % Химична формула: $C_{10}H_{20}O_2$ CAS №: 2445-77-4 FLAVIS 09.531 *Метод за анализ* [1] За определянето на 2-метилбутилизовалерат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	
2b09659	—	2-метилбутилбутират	*Състав на добавката* 2-метилбутилбутират *Характеристика на активното вещество* 2-метилбутилбутират Получено чрез химичен синтез Чистота: минимум 95 % Химична формула: $C_9H_{18}O_2$ CAS №: 51115-64-1 FLAVIS 09.659 *Метод за анализ* (1) За определянето на 2-метилбутилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи: газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.	Всички видове животни	—	—	—	1. Добавката се смесва с фуража под формата на премикс. 2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията за съхранение и устойчивост. 3. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество е 5 mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %. 4. Препоръчителното максимално съдържание на активното вещество в пълноценните фуражи се посочва на етикета на добавката. 5. Когато препоръчителното максимално съдържание е превишено, върху етикетите на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи се посочват наименованието на функционалната група, наименованието на добавката, идентификационният номер и добавеното количество на активното вещество.	6 февруари 2027 г.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти във фуражния сектор установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.	

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.